






XVII. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ



**21-24 HAZİRAN
2004 ADANA**



TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR HASATÇI KARINCA TÜRÜ;
Oxyopomyrmex krueperi Forel, 1911 (Hymenoptera : Formicidae)

Nihat AKTAC, Kadri KIRAN

Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü – EDİRNE

Bu çalışmada gerçek anlamda hasatçı karınca tanımına giren ve beslenme rejimleri bakımından tamamen tohum tanesine bağımlı olan türlerden *Oxyopomyrmex krueperi* Forel, 1911'in Türkiye'den ilk kaydı verilmiştir.

Tip lokalitesi Yunanistan olan ve "Mediterranean" bölgede dağılım gösteren bu türe ait materyal, 1997 yılında Türkiye Trakya'sında yürütülen çalışmalar kapsamında iki lokaliteden (Çanakkale – Eceabat ve Edirne – Keşan) elde edilmiştir.

Batı Palaearktik bölgede 9 tür ve 5 alttür ile temsil edilen ancak Batı Anadolu (İzmir)'dan sadece tek tür (*O. oculatus* André, 1881)'ü bilinen *Oxyopomyrmex* cinsinin araştırmamızla Trakya Bölgesinde de dağılım gösterdiği belirlenmiştir.