

uno del Modenese dal Prof. FIORI, e due altri provenienti dalla Morea comperai dal REITTER.

Sessione del 21 aprile 1895

Genere *Ponera* LATR.

Il numero delle specie mediterranee di questo genere è stato poco per volta accresciuto, e oggi raggiunge la cifra non piccola di 7. Trattandosi di insetti difficili a distinguere senza un accurato esame, credo far cosa grata agli entomologi, dandone qui un quadro analitico.

Operae.

A. Sutura mesometanotale distinta sul dorso.

a. Lo scapo raggiunge l'occipite; palpi mascellari e labiali di un solo articolo: squama più alta e sottile che nelle altre specie. **Eduardi** FOREL.

b. Lo scapo ripiegato indietro non raggiunge l'occipite.

a. Capo relativamente largo e corto; parte anteriore del torace molto più larga del metanoto; questo apparisce, sul profilo, più basso del mesonoto, la sua parte declive è più ripida. Colore costantemente giallo. **ochracea** MAYR.

β. Capo più stretto e allungato; metanoto non più basso o appena più basso del mesonoto.

* Punteggiatura del capo più grossa e con punti separati da ben distinti intervalli; palpi mascellari di due articoli. **coarctata** LATR.

** Punteggiatura del capo fitta, sottilissima.

× Lo scapo ripiegato indietro dista dal margine occipitale non più della sua massima grossezza; i lati del capo alquanto arcuati.

Più grande ($2 \frac{3}{4}$ —3 mm) squama più alta e relativamente meno grossa. **punctatissima** ROG.

Più piccola ($2 \frac{1}{4}$ — $2 \frac{1}{2}$ mm) squama meno alta e molto grossa. **Gleadowi** FOREL (1).

×× Lo scapo ripiegato indietro dista dal margine occipitale circa una volta e mezzo la sua massima grossezza; capo con lati più dritti e paralleli; squama molto bassa e grossa. **Ragusai** EMERY.

B. Sutura mesometanotale indistinta sul dorso; capo molto allungato [secondo ANDRÉ]. **Abellei** ANDRÉ.

(1) Specie ancora inedita. Ne pubblico qui la descrizione favoritami dal Sig. FOREL: *Ponera Gleadowi* n. sp. — ♀ Extrêmement semblable à *P. ergatandria* FOREL dont elle se distingue par les caractères suivants:

Long. $2 \frac{1}{2}$ mm. Mandibules luisantes, lisses, faiblement coriaccées vers la base, armées de 4

Femmine normali (alate o con monconi di ali).

- a.* Più grande, di colore giallo testaceo, squama molto grossa. **ochracea** MAYR.
b. Più piccola; colore bruno.
a. Lo scapo raggiunge l'occipite o l'oltrepassa anche un poco; squama più alta e sottile **Eduardi** FOREL.
β. Lo scapo non raggiunge interamente l'occipite; squama più bassa e grossa.
 1. Punteggiatura più grossa e meno fitta. **coarctata** LATR.
 2. Punteggiatura più fina e molto fitta. **punctatissima** ROG.

NOTA — La ♀ delle altre specie non è conosciuta.

Femmine attere (ergatoidi).

Sono note soltanto nelle *P. coarctata* e *P. Eduardi*. Caratteri delle rispettive ♀, ma gli occhi sono più grandi e la squama più alta.

Maschi.

- a.* Attero, ergatoide con antenne di 12 articoli. **punctatissima** ROG.
b. Alato; antenne di 13 articoli.
a. Pigidio prolungato in spina acuta **coarctata** LATR.
β. Pigidio non prolungato in spina.
 1. Squama più alta che grossa. **Eduardi** FOREL.
 2. Squama più grossa che alta, nodiforme. **ochracea** MAYR.

P. ochracea MAYR. (fig. 4, *a*, *b* e 5).

Formicina Austriaca, in: Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1855, pag. 390.

Pare finora propria dell'Italia e delle isole vicine: ne ho veduto esemplari di Napoli, dell'Emilia e della Liguria, nonché di Corsica e di Sicilia.

dents assez distinctes devant et de quelques dents très-indistinctes derrière. Scapes courts, ils sont loin d'atteindre le bord occipital (un peu plus longs chez *P. ergatandria*). Les yeux sont un peu plus grands, assez distincts. Le pronotum est plus large que long (aussi long que large chez *P. ergatandria*). Le mésonotum est plus plat, en forme de disque. L'écaille est encore plus épaisse et plus basse, arrondie en dessus. Sous le pédicule, une dent placée fort en avant. Abdomen comme chez *P. ergatandria*.

D'un jaune un peu roussâtre; une bande transversale diffuse, souvent très indistincte, assez étroite, près du bord postérieur de chaque segment de l'abdomen.

Inde: Poona (Wroughton), Orissa (Taylor), Thana (Gleadow). — A. FOREL.