

Einige Homonymien in der Familie *Formicidae* (Hymenoptera)

von

CESARE BARONI URBANI

Diacamma rugosum (LE GUILLOU) ssp. *geometrica* (F. SMITH) var.
coincidens nomen novum pro var. *concentrica* KARAWAJEW, 1935,
Treubia, 15 : 65.

nec *Diacamma palawanicum* EMERY var. *concentricum* (sic !) WHEELER,
1925, Philippine J. Sci., 28 : 64.

Diacamma rugosum (LE GUILLOU) ssp. *sculpturata* (F. SMITH) var.
homonyma nomen novum pro var. *papuana* KARAWAJEW, 1935, Treubia,
15 : 67.

nec *Diacamma vagans* (F. SMITH) var. *papuanum* (sic !) STITZ, 1911,
Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 8 : 352.

Leptogenys ferrarii FOREL ssp. **bernardi** nomen novum pro ssp. *sulcinodis*
BERNARD, 1952, Mem. I.F.A.N., 19 : 210.

nec *Leptogenys sulcinoda* ANDRÉ, 1892, Rev. Ent., 11 : 48.

Leptogenys nitida (F. SMITH) ssp. **capensis** nomen novum pro ssp.
brevinodis FOREL, 1915, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50 : 335.

nec *Leptogenys acutangula* EMERY var. *brevinoda* EMERY, 1914, in
F. SARASIN & J. ROUX, Nova Caledonia, Zoologie, vol. I, L. IV, No.
11 : 399.

Anochetus ineditus nomen novum pro *jacobsoni* MENOZZI, 1939,
Tijdschr. Entom., 82 : 178.

nec *Anochetus jacobsoni* FOREL, 1913, Zool. Jahrb., Abt. Syst.,
36 : 18.

Odontomachus assiniensis EMERY var. **oblita** nomen novum pro var.
fuscus (sic !) STITZ, 1916, Erg. Zweitere D. Zentral-Afrika-Exp. 1910-
1911, Bd. I, Zool. : 372.

Odontomachus haematoda (L.) var. **repetita** *nomen novum* pro var. *fuscus* (sic!) STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 115.

nec *Odontomachus ruficeps* F. SMITH ssp. *cephalotes* F. SMITH var. *fusca* EMERY, 1911, Nova Guinea, IX, 2, Zool. : 251.

Phyracaces hewitti WHEELER, 1919, Bull. Mus. Comp. Zool., 43 : 48.

= *Phyracaces hewitti* sp. n. DONISTHORPE, 1931, Ann. Mag. Nat. Hist., S. 10, 8 : 494. *Synonymia nova*. Beide Arten sind ziemlich sicher vom gleichen Material beschrieben.

Pheidole arnoldi FOREL var. **sipapomae** *nomen novum* pro var. *rufescens* ARNOLD, 1920, Ann. South Afr. Mus., 14 : 449.

nec *Pheidole sitarches* WHEELER ssp. *rufescens* WHEELER, 1908, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 24 : 443.

Meranoplus nanus ANDRÉ ssp. **affinis** *nomen novum* pro ssp. *similis* KARAWAJEW, 1931, Zool. Anz., 95 : 44.

nec *Meranoplus similis* VIEHMEYER, 1922, Arch. Naturg., 7 : 208.

Tetramorium ferox Ruzsky var. **aequa** *nomen novum* pro var. *levigata* KARAWAJEW, 1926, Konowia, 5 : 167.

nec *Tetramorium grassii* EMERY var. *laevigatum* (sic!) MAYR, 1901, Ann.k.k.Naturh. Hofmus. Wien, 16 : 25.

Camponotus vitreus (F. SMITH) var. **neocarinata** *nomen novum* pro var. *carinata* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus compressus* (FABRICIUS) ssp. *thoracica* (FABRICIUS) var. *carinata* (BRULLÉ), 1840, in WEBB & BERTHELOT, Hist. Nat. Canaries, 2 : 84 (*Formica*).

Camponotus mutilatus (F. SMITH) var. **albiventris** *nomen novum* pro var. *luteiventris* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus luteiventris* EMERY, 1897, Ann. Mus. St. Nat. Genova, 38 : 574.

Camponotus substitutus EMERY var. **lactea** *nomen novum* pro var. *clara* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus aethiops* (LATREILLE) var. *clara* KARAWAJEW, 1926, Konowia, 5 : 190.

Camponotus quadrisectus (F. SMITH) ssp. *hians* FOREL var. **binaluana** *nomen novum* pro var. *orthocephalus* (sic!) STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 127.

nec *Camponotus orthocephalus* EMERY, 1894, Bull. Soc. Ent. Ital., 26 : 169.

Camponotus reticulatus ROGER ssp. *bedoti* EMERY var. **ombilicata** *nomen novum* pro var. *punctulata* KARAWAJEW, 1929, Mem. Ac. Sci. Ukraine, 13 : 240.

nec *Camponotus punctulatus* MAYR, 1868, Ann. Soc. Nat. Modena, 3 : 161.

Camponotus barbosus *nomen novum* pro *barbatus* MENOZZI, 1926, Atti Soc. Mat. Nat. Modena, 56 : 3.

nec *Camponotus barbatus* ROGER, 1863, Berl. Ent. Zeitschr., 7 : 178.

Camponotus rubrithorax FOREL var. **sympatrica** *nomen novum* pro var. *nigrithorax* STITZ, 1937, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 135.

nec *Camponotus compressus* (FABRICIUS) ssp. *thoracica* (FABRICIUS) var. *nigrithorax* SANTSCHI, 1921, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 12 : 74.

Camponotus maculatus (FABRICIUS) ssp. **proletaria** *nomen novum* pro ssp. *miserabilis* SANTSCHI, 1914, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr., Portici, 8 : 379.

nec *Camponotus miserabilis* FÖRSTER, 1891, Abh. Geol. Spezialk. Els., 13 : 430. Fossile Arten.

Polyrhachis bicolor F. SMITH var. **rubricornis** *nomen novum* pro var. *flavicornis* STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 132.

nec *Polyrhachis flavicornis* F. SMITH, 1857, J. Proc. Linn. Soc. London, Zool., 2 : 63.

Genus **Promyrmicum** *nomen novum* (species typus *Myrmicium boreale* HEER) pro *Myrmicium* HEER, 1870, Svenska Ak. Handl., n. s., 8 : 78. Nur fossile Gattung.

nec *Myrmicium* WESTWOOD, 1854, Quart. J. Geol. Soc., 10 : 396 (Hymenoptera Myrmeciidae).

Dr. CESARE BARONI URBANI
Naturhistorisches Museum
Augustinergasse 2
CH 4051 Basel Schweiz