

Gen. *Cremastogaster*, SUND.

43. *C. senegalensis*, Roger, Verzeich. der Formiciden, Berl. 1863.

Hab. con. Senegal.


Loc. racc. Sauakin, Metemma; Sebderat, Keren, Ain (Confine settentrionale dell' Abissinia).

Osserv. Raccolte di frequente le femmine e le operaje sui tronchi ed a' piedi delle Mimose.

Gen. *Meranoplus*, SMITH.

44. *M. Magrettii*, n. sp. André (in litt.) sic mihi dicavit, descripsit et delineavit:

♀. *Ferruginea*, *antennis pedibusque testaceis, abdomine infuscato, pilis longis pallidis sat dense hirsuta; capite thoraceque supra rude reticulatis; clypeo fere laevi, nitido; area frontali nitidissima; thoracis marginibus (margine antico excepto) (Vide fig. A a) crenulatis, angulis anticis spiniformibus; sutura pro-mesonotali leviter impressa; mesonoto dentibus duobus crassis, haud acutis, postice armato; metanoto fere verticali, spinis duabus longioribus, parallelis et retro directis; petioli nodo primi (Vedi fig. A b) cuneiformi, fere laevi, nitido; secundo rotundato leviter transverso, reticulato; abdomine antice subtiliter coriaceo, postice laevi, nitido.*



A.

Long. corp. $2\frac{1}{2}$ -3 mill.

Per il suo *facies*, la scultura, il numero e la disposizione delle spine del torace, questa specie si avvicina al *M. bicolor*, Guér., ma se ne distingue a prima vista per le sue dimensioni molto minori, per la tinta generale più chiara, per l'addome quasi liscio e lucente, per la pelosità meno lunga, come pure per la forma e la brevità dei denti del suo mesonoto.

È la prima specie del genere che, a quanto crede il signor Edmondo André, si trovi in Africa e venne da lui gentilmente dedicata al mio nome.

Raccolta fra le sabbie nei dintorni di Sauakin.