Imenotteri (Formiche).

per

C. Menozzi

1. **Aphaenogaster (s. str.) testaceo-pilosa** ssp. **simonelli** Em. Due operaie, una di Rodi e l'altra di Nisiro.

Nota anche di Creta.

2. **Aphaenogaster (s. str.) testaceo-pilosa** ssp. **simonelli** var. **balcanica** Em. Unica operaia di Nisiro.

Turchia, Asia Minore e parecchie isole del Dodecaneso.

L' esemplare di Nisiro ha il segmento basale del gastro con le parti lucide più estese, del resto, eguale agli esemplari tipici di Albania, Costantinopoli, Zante, ecc. della Collezione Emery.

A proposito di questa forma fo notare che il Müller nella sua monografia delle Formiche della Venezia Giulia e Dalmazia (Boll. Soc. Adr. di Scienze Natur. Vol. XXVIII, 1913) ascrive ad essa una varietà che si rinviene nella Venezia Giulia, limitatamente nel tratto di costa da Duino a S. Giovanni di Duino e lungo il litorale dalmatico; ritengo che tale identificazione non sia esatta, e cioè che essa non sia la vera *balcanica* Em. la quale ha il capo conformato diversamente, ma che sia una varietà che deve far parte delle forme della subspecie *semipolita* Nyl., forse nuova o molto affine alla var. *ionia* Em., se proprio non si tratta di questa varietà. Posseggo della pretesa varietà *balcanica* del Müller degli esemplari provenienti da S. Giovanni di Duino, regalatemi dal collega Finzi, che non fanno che confermare questa mia asserzione, ma attendo di vedere materiale della Dalmazia per potermi pronunciare in via definitiva, e, se del caso, dare un nuovo nome a tale varietà.

3. **Messor structor** ssp. **rufitarsis** var. **alexandri** Sant. Un soldato e due operaie di Coo.

Nota altresì per la Siria e Cipro.

Questi esemplari hanno il segmento basale del gastro tutto reticolato e opaco; secondo Dr. Santschi, la sua varietà *alexan-*

dri dovrebbe avere tale segmento liscio e gli altri reticolati. Non so quale valore possa avere questo carattere perchè posseggo poco materiale, tuttavia io determino così tale formica perchè corrisponde perfettamente alla descrizione originale fatta dall'autore, eccettuato, naturalmente, tale carattere.

La *var. alexandri* è stata descritta della Siria e poi ritrovata nel Libano, e non era ancora nota del Dodecaneso.

4. **Messor semirufus** var. **concolor** Em. Moltissime operaie e soldati di Scarpanto, Nisiro, Piscopi, Coo, e Monte Profeta Elia di Rodi.
   Creta, Siria e isole del Dodecaneso.

5. **Crematogaster (Acrocelia) scutellaris** ssp. **schimidti** v. **ionia** For. Diverse operarie di Coo e di Rodi.
   Sponde del Mar Egeo e di Marmara, Palestina e isole del Dodecaneso.

6. **Camponotus (Tanaemyrmex) aethiops** var. **concava** For. Diverse operaie di Coo.
   Asia Minore, Balcani, Caucaso, Grecia, Rodi e Coo.

7. **Camponotus (Tanaemyrmex) compressus** ssp. **sancta** var. **cosensis** For Un'operaia massima di Coo.
   Grecia, Sporadi, Rodi e Coo.

8. **Camponotus (Tanaemyrmex) silvaticus** ssp. **baldaccii** Em. Operaie minime di Coo e Jali.
   Asia Minore, Creta, Rodi.

9. **Camponotus (Tanaemyrmex) samius** For. Un'operaia massima di Nisiro.
   Asia Minore, Samo e Rodi.

10. **Camponotus (Myrmentoma) libanicus** var. **aegaeus** Em. Parecchie operaie di Coo.
    Smirne e Rodi.

11. **Camponotus (Myrmentoma) piceus** var. **candiotes** Em. Alcune operaie di Coo.
    Creta e Rodi.

12. **Camponotus myrmentoma gestroi** var. **creticus** For. Due operaie di Coo.
    Asia Minore. Creta e Rodi.

13. **Cataglyphis bicolor** F. Operaie di Nisiro e di Coo.
    Palestina, Egitto e Rodi.

Finito di stampare il 24 Aprile 1929