

HYMÉNOPTÈRES TENTHRÉDINIDES
RÉCOLTÉS AU JAPON PAR M. J. HARMAND,

PAR M. F.-W. KONOW.

(DEUXIÈME MÉMOIRE.)

TENTHREDO FUSCOTERMINATA Marlatt.

RUOGOGASTERA VARIIPES Kirby (*Tenthredo variipes* Kirby 1882).

ALLANTUS PICTUS Motschulsky 1866 (*nec* André 1881, *nec* Klug 1814).

— KOHLI KONOW.

ATHALIA JAPONICA Klug (*Tenthredo* [*Allantus*] *japonica* Klug. 1813).

HYLOTOMA JONASI Kirby.

— SIMILIS Vollenhoven.

XYPHIDRIA BUYSSONI KONOW ♀.

TREMEX LONGICOLLIS KONOW ♀.

SIREX JAPONICUS Smith ♀ ♂.

— ANTENNATUS Marlatt ♀.

Sont restés indéterminables des *Hylotoma*, *Dolerus*, *Emphytus*, *Macrophya* et *Pachyprotasis*.

HYMÉNOPTÈRES FORMICIDES,
RÉCOLTÉS AU JAPON PAR M. J. HARMAND,

PAR M. ERNEST ANDRÉ.

(TROISIÈME MÉMOIRE.)

CAMPONOTUS LIGNIPERDUS Latreille var. OBSCURIPES Mayr. ♀ ♂.

— MARGINATUS Latreille; mâle.

— PENNSYLVANICUS Degeer var. JAPONICUS Mayr. ♀ minor.

FORMICA SANGUINEA Latreille; femelle.

— FUSCA Linné var. NIPPONENSIS Forel; femelle.

— RUFA Linné race TRUNCICOLA Nylander; femelle.

LASIOS NIGER Linné race ALIENUS Förster; femelle et ouvrière.

SOLENOPTIS FUGAX Latreille; ouvrières.

Reste indéterminable une ouvrière de *Pheidole*. Les espèces de ce genre nombreuses et difficiles ne peuvent pas ordinairement être reconnues en l'absence du soldat.
