

EXTRAIT DES ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE  
DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

*Natura maxime miranda in minutis.*

---

VOLUME LXXXV. — ANNÉE 1916

---

**FOURMIS NOUVELLES**  
DE LA COLONIE DU CAP, DU NATAL ET DE RHODESIA  
PAR LE D<sup>r</sup> F. SANTSCHI.

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ  
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES  
28, Rue Serpenté, 28

1917

# FOURMIS NOUVELLES

DE LA COLONIE DU CAP, DU NATAL ET DE RHODESIA

par le Dr F. SANTSCHI.

*Leptogenys Jägerskiöldi* Santschi = *L. (Lobopelta) attenuata* Sm., var. — Cette variété ne diffère de *L. attenuata* s. str. que par sa pruinosité plus abondante, son aspect moins luisant, ses antennes plus densément pubescentes et le pédicule légèrement plus large (par comparaison à des exemplaires du Natal reçus de M. G. ARNOLD).

*Crematogaster Neuvillei* For. stirps **carininotum**, n. stirps.

♂. Long. 3,8-4 mm. Brun rougeâtre. Pattes brun marron plus ou moins clair, gastre noir avec sa base parfois plus ou moins brun rous-sâtre. Occiput et postpétiole rembrunis. Réticulée; thorax distinctement réticulé-punctué. Tête finement striée en long; front plus ou moins lisse. Gastre très finement réticulé, presque lisse. Face déclive de l'épinotum lisse. Presque mate; front et gastre assez luisants. Pilosité rare, pubescence clairsemée comme chez le type. Bords du pronotum arrondis. Le mésonotum a, en avant, une carène distincte qui manque chez le type et les autres races. Échancrure méso-épinotale assez profonde; dents épinotales aussi longues que la largeur de leur base, d'ailleurs un peu variables. Postpétiole aussi fortement sillonné que chez le type, semblable pour le reste.

Rhodesia : Bulawayo (G. ARNOLD legit).

Fait un peu passage au *C. capensis* Mayr.

Voici un tableau analytique des ♂ des races et variétés de *Crematogaster Neuvillei* :

1 (6). Mésonotum non caréné.

2 (3). Mésonotum sans impressions transversales. Plus foncé.

— Éthiopie méridionale..... *C. Neuvillei* For.

Ann. Soc. ent. Fr., LXXXV [1916].

- 3 (2). Mésonotum avec une impression transversale. Couleur plus claire. — Natal.
- 4 (5). Postpétiole peu profondément échancré. Plus clair. Long. 5 mm..... stürps *Cooperi* For.
- 5 (4). Postpétiole profondément échancré, comme chez le type. Plus foncé. Long. 3,4-3,8 mm..... var. *ingravis* For.
- 1 (6). Mésonotum distinctement caréné. Gastre noir. — Rhodesia..... stürps *carininotum* Santschi

*Crematogaster inconspicua* Mayr stürps *incorrecta*, n. stürps.

♂. Long. 3 mm. Jaune brunâtre clair; extrémité du gastre un peu rembrunie. Luisante. Tête lisse, striolée sur son tiers antérieur, à ponctuation partout espacée. Thorax finement réticulé sur le dos, un peu strié sur la face basale de l'épinotum; côtés lisses et luisants vers le pronotum et plus fortement réticulés-ponctués en arrière. Abdomen lisse, microscopiquement réticulé. Quelques rares poils dressés, blanchâtres, sur le devant de la tête et l'abdomen. Partout une pubescence pâle assez clairsemée.

Tête carrée, à côtés légèrement convexes; bord occipital droit; angles brièvement arrondis. Yeux un peu allongés, égalant environ le quart des côtés de la tête, au milieu desquels ils sont placés. Aire frontale assez grande, isocèle. Épistome convexe, non imprimé en avant; avec un bord antérieur largement mais non fortement arqué. Mandibules striées, parsemées de gros points, à bord terminal presque droit, armées de 4 dents noirâtres. Scape atteignant le bord occipital. Articles 2-4 du funicule distinctement plus larges que longs. Thorax court comme chez *impressa* Em., avec le pronotum droit, les bords antéro-latéraux relevés formant en arrière une impression sémilunaire qui indique la suture promésonotale, d'ailleurs indistincte. Cette impression s'avance presque jusqu'au bord antérieur du pronotum et est un peu moins luisante que le reste du dos du thorax. La face postérieure est formée par le tiers antérieur du mésonotum qui s'incline obliquement en avant. Le reste de ce segment est parallèlement bordé, plat en avant, un peu échancré en arrière. La suture métanotale assez peu profonde, rectiligne. Épinotum plus bas que le mésonotum, la face basale est courte et convexe en avant, fortement concave en arrière, se continuant avec la face déclive. Les côtés sont fortement bordés jusqu'aux épines. Celles-ci sont dirigées en arrière et légèrement recourbées en bas, aiguës et aussi longues que le tiers de l'intervalle de leur base. Pédicule en trapèze arrondi en avant et de côté (comme

chez *C. impressa* Em.). Face antérieure plane. Postpétiole fortement bigéminé. Gastre court.

Gabon (F. FAURE, 1914), 1 ♂.

Voisin aussi de *C. impressa* Em., mais ici l'impression du promésotonum est moins prononcée.

***Crematogaster nigronitens*, n. sp.**

♂. Long. 2,8-3,2 mm. Noire; mandibules rouge sombre; funicule et tarses noir brunâtre. Très luisante, lisse. Mandibules, fosses antennaires et parfois côtés de l'épinotum finement striés. Côtés du mésothorax et dessous du pédicule réticulés-punctués. Quelques poils dressés vers la bouche, le pédicule et l'extrémité de l'abdomen. Partout une pubescence blanchâtre fine, assez espacée (poils distants d'une à deux fois leur longueur). Funicules beaucoup plus pubescents.

Tête rectangulaire, environ d'un cinquième plus longue que large; le bord postérieur presque droit, bords latéraux un peu convexes, avec les angles postérieurs arrondis. Les yeux, ovales et de moyenne grosseur (70 à 80 facettes), sont placés vers le milieu des côtés de la tête. Un léger sillon frontal atteint le tiers postérieur. Aire frontale distincte. Épistome convexe, à bord antérieur légèrement relevé et peu arqué. Mandibules étroites, à 4 dents petites et plus ou moins émoussées. Le scape atteint le quart postérieur de la tête. Articles 3 à 7 du funicule plus épais que longs. La massue épaisse, à premier article subglobuleux, le suivant presque du double plus large et plus épais, le dernier encore plus épais et aussi long que les deux précédents réunis. Le promésotonum forme un plateau ovale à profil horizontal, un peu convexe transversalement, les bords arrondis. Le devant du pronotum faiblement aigu, les épaules arrondies. Suture promésotonale imprimée en V; au milieu le mésotonum avance en carène peu saillante. Face déclive du mésotonum presque verticale. Sillon métanotal assez profond. L'épinotum un peu relevé par devant en bourrelet transversal passant immédiatement à la face déclive qui est très oblique, bordée et légèrement concave de droite à gauche entre les dents. Celles-ci sont très courtes; mousses, réduites à de simples tubercules, formant angle chez les plus grands individus (chez ceux-ci la face déclive est beaucoup moins concave transversalement). Pédicule trapézoïdal, plus long que large, à bord et angles antérieurs arrondis, la face supérieure concave. Postpétiole presque aussi large que le nœud, plus étroit au sommet, largement sillonné sur sa face postérieure. Base du gastre tronquée.

Rhodesia Sud : Matopo Hill (G. ARNOLD).

Diffère du *C. Swelli* For. par ses antennes plus courtes, la tête, les stigmates de l'épinotum plus près de l'angle épinothal; de *C. nigriceps* par sa tête plus longue; de *C. Prelli* For. par l'épinotum non épineux ni fortement denté et le postpétiole non entièrement sillonné; de *Welmani* et ses races par son pédicule plus large en avant.

*Monomorium (Paraholcomyrme) australe* Em.

La comparaison de quelques ouvrières, reçues de M. ARNOLD, avec le type de *Monomorium australe* Em. et la var. *laeviceps* Em., aimablement communiqués par M. EMERY, me paraît démontrer que nous sommes en présence d'un cas de polymorphisme qui classe cette espèce dans le sous-genre *Paraholcomyrme*. La description originale a été faite sur une ouvrière media et celle de la var. *laeviceps* sur l'ouvrière minor. L'envoi de M. ARNOLD consistait en une série d'ouvrières major et major-media collées sur le même carton, plus une autre série d'ouvrières minor et media-minor également réunies. Celui de M. EMERY comprenait une ♂ media (type), une ♂ media-minor et une ♀ minor. Tous ces insectes sont collés sur du carton qui paraît de même nature (même qualité, même vétusté, etc.). Tous, tant ceux de M. ARNOLD que ceux de M. EMERY, sont des envois du South African Museum (PÉRINGUEY leg). Je ne crois donc pas me tromper en supposant que tous les exemplaires que j'ai sous les yeux ont été capturés ensemble et proviennent peut-être du même nid, bien qu'ils aient été collés séparément d'après leur taille, les grands exemplaires ensemble, séparés des petits (autant que je puis en juger d'après ceux qui me sont parvenus intacts, la moitié au moins ayant été brisés pendant leur long voyage). C'est peut-être ce qui a incité M. EMERY à décrire à part la ♀ minor. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait moi-même tout d'abord, en considérant la ♀ major comme variété de *M. Havilandi* For., mais les quelques variations et passages que j'ai constatés m'ont mis dans le doute et c'est pourquoi je suis reconnaissant à M. EMERY de m'avoir permis, par son envoi, de résoudre ce petit problème.

Ainsi donc :

*Monomorium australe* var. *laeviceps* Em. = *Monomorium (Paraholcomyrme) australe* Em.

*Monomorium Havilandi* For. = *Monomorium (Paraholcomyrme) australe* Em. stirps *Havilandi* For.

Voici maintenant la description de la ♀ major de *M. australe*, presque entièrement calquée sur celle de *M. Havilandi* For. :

♀ major. Long. 2,5 mm. D'un roux brunâtre, gâstre noir à base un peu brunâtre. Mandibules, épistome, côtés du mésonotum et dessous du pédicule d'un roux plus clair. Joues, arêtes frontales et fossettes antennaires finement striées; reste de la tête lisse, avec une punctuation espacée assez forte. Thorax et pédicule densément ponctués-réticulés comme chez *M. Salomonis* L. (cette sculpture s'efface plus ou moins sur le promésonotum qui peut être lisse et luisant). Gastre et pattes lisses. Une pilosité dressée jaunâtre, assez abondamment dispersée sur l'abdomen, plus clairsemée sur le thorax et la tête. Les pattes et les antennes n'ont qu'une pubescence couchée qui se retrouve aussi sur la tête et plus espacée sur le corps.

Tête un peu plus longue que large, à côtés faiblement convexes et bord postérieur largement concave. La tête est généralement plus large en avant qu'en arrière, mais elle devient rapidement aussi large en avant qu'en arrière chez les individus un peu plus petits et chez lesquels elle paraît relativement plus étroite. Les yeux, situés entre le tiers antérieur et le milieu des côtés de la tête, sont assez plats; leur grand diamètre est aussi long que l'espace qui les sépare de l'angle antérieur. Épistome entier, fortement concave entre ses deux carènes, qui sont écartées et presque contiguës aux arêtes frontales et se continuent de côté dans le bord antérieur. Mandibules striées, tridentées. Le scape n'atteint pas tout à fait le bord postérieur de la tête. Articles 3 à 8 du funicule plus épais que longs. Massue peu épaisse, deuxième article seulement un peu plus épais et presque aussi long que le précédent. Promésonotum convexe, sans sutures distinctes sur le dos. Échancrure un peu plus faible que chez *M. gracillimum* (à peu près comme chez *M. Salomonis subopacum* dont cette espèce imite assez bien le thorax et le pédicule). Épinotum un peu convexe, passant par une courbe insensible de la face basale à la face déclive. Premier nœud cunéiforme, arrondi en dessus, convexe en dessous comme chez *M. minutum*, à pétiole antérieur bien plus court que lui, muni par dessous, en avant et vers l'articulation postérieure, d'une petite dent obtuse. Postpétiole petit, plus bas et un peu plus large que long. Gastre en ovale plus étroit par devant.

♀ media. Long. 2 à 2,1 mm. La tête est en rectangle plus allongé avec les côtés plus parallèles et une réticulation plus ou moins superficielle vers l'occiput et qui peut avancer jusqu'aux stries. Les deux faces de l'épinotum sont plus distinctes et mieux bordées.

♂ minima (= var. *laeviceps* Em.). La tête est aussi lisse et luisante que chez la ♀ major, la tête encore un peu plus étroite que chez la ♀ media, mais légèrement plus large derrière les yeux, concave en arrière, l'épinothorax presque aussi arrondi que chez la ♀ major, la sculpture du thorax à peine plus faible, les articles du funicule un peu plus courts.

♀. Long. 4,5-5 mm. La tête est entièrement mate ainsi que le premier article du gastre qui a la même sculpture que le pédicule; pour le reste comme chez *M. Havilandi* For.

Cap de Bonne-Espérance (PÉRINGUEY, ARNOLD leg.).

Le *M. herero* For. n'a rien de commun avec *M. australe* Em.; c'est une race de *Monomorium* (*Xeromyrmex*) *Salomonis* L.

#### **Oligomyrmex (Aeromyrma) lucidus, n. sp.**

♂. Long. 1,2 mm. Jaune; luisant; lisse avec une fine ponctuation espacée et quelques vagues stries dans le sillon métathoracique. La pubescence, très fine, assez relevée, est assez abondante partout; quelques poils plus longs, clairsemés vers la bouche et l'abdomen. Tête rectangulaire, un peu plus d'un quart plus longue que large, les côtés un peu convexes, le bord postérieur droit. Les yeux, atrophiés ou réduits à une tache pigmentée, sont situés à l'union des deux cinquièmes et trois cinquièmes antérieurs des côtés de la tête. Arêtes frontales sinueuses, très divergentes en arrière. Épistome convexe, le bord antérieur faiblement arqué dans son tiers moyen, séparé des tiers externes par une très légère proéminence à large base. Mandibules à 5 dents brunâtres. Articles 2 à 7 du funicule bien plus épais que longs. Le 8<sup>e</sup> (premier de la massue) presque aussi épais que long. Le dernier aussi long que les 7 articles précédents réunis. Le promésotum forme sur le profil une courbe régulière moins marquée que chez *O. semilaeve* Mayr et *O. nosidambo* For. Le sillon métanotal est moins profond.

Suture promésototale distincte sur les côtés du thorax et obsolète sur le dos. Face basale de l'épinothorax moitié plus large que longue, convexe, passant à la face déclive qui est plus longue. Les côtés ont une bordure qui semble prolonger le profil de la face basale et le fait paraître aussi long que la face déclive. Les angles sont nets, mais inermes. Le pédicule est aussi haut que long, moins haut que chez *semilaeve* Mayr. Le sommet arrondi et ses faces antérieure et postérieure aussi obliques l'une que l'autre. Postpétiole d'un tiers plus

large que long, presque de moitié plus large que le précédent. Gastre presque du double plus long que large, tronqué à la base.

Rhodesia : Bulawoyo, Bunthorne mine (G. ARNOLD). Une seule ♀ au Rhodesia Museum.

C'est peut-être la ♀ de l'*Aeromyrma africana* For., dont on ne connaît que le ♂.

Comme le fait très justement remarquer M. EMERY, *Aeromyrma Traegaardi* Santschi n'est qu'une variété un peu brunâtre de *Solenopsis semilaevis* Mayr, mais ce dernier est un véritable *Aeromyrma*.

*Tetramorium Bequaerti* For. stirps **Bruni**, n. stirps.

♀. Long. 3 mm. Roux testacé. Antennes, pattes et base du gastre jaune roussâtre; moitié postérieure du gastre brunâtre. Luisante. Côtés de la tête, du thorax et les deux nœuds du pédicule ridés-réticulés; ailleurs, cette sculpture est assez effacée, presque lisse par place comme chez *T. montanum* For. Le gastre est lisse, sauf la base qui est très finement striolée en long et subopaque. Pilosité dressée presque aussi abondante que chez *T. Bequaerti*, mais plus fine, pointue et surtout bien plus longue (comme chez la race *bulawayensis* For.). Elle existe aussi, quoique plus courte sur les scapes et les pattes. Pubescence rare, presque nulle, sauf sur le funicule et les tarsi.

La tête est à peine plus longue que large, en rectangle beaucoup plus fortement arrondi aux angles postérieurs que chez le type de l'espèce et bien moins échancré par derrière. Arêtes frontales atteignant la hauteur des yeux. Épistome tricaréné, à bord antérieur largement arqué. Le scape, délié, a un lobule assez distinct à sa base. Tous les articles du funicule plus longs qu'épais. Thorax comme chez *Bequaerti*, mais beaucoup moins robuste. Les épines de l'épinotum aiguës, un peu plus courtes que chez *Bequaerti*. Le nœud du pédicule est un peu plus long que large (bien plus long chez *Bequaerti*); deuxième nœud plus large.

Sud Rhodesia : Hillsixá (ARNOLD, 26 VII 1913). — Une seule ouvrière au Rhodesia Museum.

*Tetramorium pusillum* Em. stirps *mosamedense* For.  
var. **tristis**, n. var.

♀. Long. 2,3-2,5 mm. Tête et thorax d'un jaune brunâtre plus

clair que chez *mosamedense* For. Dessus du promésonotum moins sculpté, plus lisse. Premier nœud du pédicule un peu plus court et relativement plus étroit, le deuxième nœud étant au contraire un peu plus large que chez *mosamedense*. Pour le reste, identiqué au type de la sous-espèce.

Bulawayo (ARNOLD).

*Rhoptrymex Arnoldi* Santschi.

J'ai décrit dans les *Ann. Soc. ent. France*, [1915], p. 503, un *Rhoptrymex Arnoldi* très aberrant, faisant passage au genre *Tetramorium*. La découverte du ♂ tranchera la question. Peut-être cet insecte devra-t-il être transféré dans le genre *Tetramorium*.

*Triglyphothrix pauper*, n. sp.

♂. Long. 1,2-2 mm. Brun jaunâtre. Antennes et pattes jaunes. Presque mate. Tête, thorax et pédicule ridés-réticulés; les mailles forment partout des alvéoles assez régulières, sauf entre les arêtes frontales où elles s'allongent en rides. Gastre et pattes lisses et luisants. La pilosité est courte surtout sur la tête et le thorax, fine, le plus souvent simple, surtout sur le gastre où elle est un peu espacée, mais il y a des touffes trifides sur le thorax et l'arrière de la tête. Les poils des scapes et des tibias ne sont divisés que vers le tiers de leur longueur.

Tête rectangulaire, d'un sixième environ plus longue que large, à côtés parallèles, le bord postérieur presque droit, les angles un peu arrondis. Les yeux ont de 30 à 34 facettes, égalent le quart ou le tiers des côtés de la tête et sont placés un peu en avant de leur milieu. Les arêtes frontales atteignent presque les angles postérieurs de la tête, délimitant un scrobe qui reçoit complètement le scape. Celui-ci, cylindrique et incurvé vers sa base, atteint le cinquième postérieur de la tête. L'épistome paraît tricaréné, parcouru qu'il est par trois rides; son bord antérieur est presque transversal au milieu et convexe sur les côtés. Mandibules lisses, à 5 ou 6 dents. Thorax déprimé, faiblement convexe d'avant en arrière, subbordé en arrière. Les côtés sont légèrement festonnés par trois faibles échancrures. Les épines sont presque aussi longues que l'intervalle de leurs bases et une fois et demie aussi longues que l'épaisseur de leur base. Les deux nœuds du pédicule, en ovale transversal, sont le premier d'un quart, le deuxième d'un tiers plus larges que longs.

Assez voisin de *T. Trimeni* Em., dont il diffère par les rides longitudinales de la tête, l'absence de fossettes sur le gastre, la pilosité plus clairsemée, le thorax plus allongé, le pédicule moins large. Cet insecte a à première vue l'aspect d'un petit *Tetramorium caespitum*.

S. Rhodesia : Umgusa River, Caustow Farm (G. ARNOLD leg.).

*Cataulacus erinaceus* Stütz var. **crassispina**, n. var.

♂. Pilosité plus roussâtre (blanchâtre chez le type). Les épines de l'épinotum plus courtes, obtuses et un peu plus relevées. Le pédicule un peu plus court; du reste semblable.

Congo français : Goda (P. CHALEUF, coll. H. DU BUYSSON).

*Cataulacus intrudens* Sm. stirps **intermedius**, n. stirps.

♀. Long. 4,2-4,5 mm. (tête défléchie). Mate. Sculpture un peu plus forte que chez *C. intrudens* Sm., bien moins prononcée que chez *C. rugosus* For. et *C. Bequaerti* For. Les rides de la tête sont plus espacées (13 environ entre les yeux) et les rides transversales fermant le réticulum plus distinctes. La face déclive de l'épinotum (sauf quelques rides transversales entre les épines) et la face antérieure du premier nœud du pédicule lisses. Les sillons longitudinaux du pédicule plus réguliers. Le gastre, ponctué, est en outre assez fortement strié à la base et légèrement vers l'extrémité. Pilosité blanche, intermédiaire en quantité et longueur entre *C. Bequaerti* For. et *intrudens*. Tête un peu moins rétrécie en avant que chez *intrudens*, un peu plus que chez *Bequaerti*, relativement plus petite que chez ces deux espèces; avec le bord postérieur droit. Thorax aussi allongé que chez *Bequaerti*, mais à côtés dentés comme chez *intrudens*. Les épines sont plus rapprochées, plus distinctement parallèles et aussi aiguës que chez cette dernière espèce. Premier article du pédicule subconique, comme chez *intrudens*, avec la face supérieure lisse et très oblique en avant. Deuxième article aussi large que le précédent, avec un sillon médian assez prononcé sur les faces antérieure et supérieure. Abdomen un peu moins convexe que chez *intrudens*, un peu plus que chez *Bequaerti*. Couleur comme chez ces deux espèces. En somme, plus proche d'*intrudens*, dont il diffère surtout par son thorax plus allongé.

Rhodesia : Bambesi (G. ARNOLD), VI 1914.

Les *Cataulacus* du groupe *intrudens* Sm., *harraricus* For., *rugosior* For., *Baumi* For., etc., forment un dédale de races et variétés

qui se font transitions et qui mériteraient une mise au point spéciale.

*Tapinoma tenue* For. var. *tectum*, n. var.

♀. Long. 4,5 à 4,8 mm. Jaune pâle, un peu terne. Le bord des segments du gastre et les téguments de la dernière paire d'un jaune brunâtre clair. Les articles du funicule un peu plus épais, plus pubescents. Mandibules encore plus courtes et plus finement dentées. Le mésonotum légèrement plus long que le pronotum (sans le cou). Pour le reste comme le type.

Natal : Durban (H. B. MARLEY leg.).

Ressemble à *T. subtile* Santschi, de Madagascar, mais celui-ci a le scape plus court et un profil dorsal différent.

*Tapinoma gracile* For. var. *iugubre*, n. var.

♀. Long. 4,6-4,8 mm. D'un noir jaunâtre terne. Occiput et gastre noirâtres. Tarses jaune grisâtre pâle. Les yeux sont presque aussi grands que le tiers des côtés de la tête et placés au tiers antérieur assez près des crêtes frontales. Le scape dépasse d'un quart à peine de sa longueur le bord postérieur. Tous les articles du funicule plus de deux fois plus longs que larges (articles 1-9 subégaux; 10<sup>e</sup> de moitié ou d'un tiers plus long que les autres).

♂. Long. 4,8 mm. Plus foncé que la ♀. La tête entièrement noire. Pilosité comme chez l'ouvrière. Mandibules triangulaires, allongées, armées d'une seule dent apicale. Le scape est aussi long que les deux articles suivants réunis; le 1<sup>er</sup> du funicule est de moitié plus long que large et d'un tiers plus court que les suivants. Face basale de l'épinothum un peu plus longue que la face déclive et y passant par une courbe brève. Écaille épaisse, arrondie au sommet, une fois aussi haute que longue. Gastre deux fois ou deux fois et demie plus longs que larges, élargi par derrière. Appareil copulateur d'un jaune grisâtre pâle. Stipe formant un lobe allongé et frangé. Volselles plus étroites, mais aussi longues.

Rhodesia : Victoria Falls (ARNOLD).

C'est peut-être une race distincte, mais les exemplaires dont je dispose ne permettent pas une comparaison plus détaillée.

**Plagiolepis (Anoplolepis) nuptialis, n. sp.**

♂. Long. 9,5-11,5 mm. Thorax, écaille et antennes d'un brun terne; tête noirâtre; mandibules, pattes et abdomen d'un jaune pâle plus ou moins grisâtre; une tache brun pâle, plus large au milieu, borde les segments abdominaux. Ailes jaunâtres à nervures et taches brunâtres. Quelques poils dressés jaunes sur la tête et l'extrémité du gastre. Pubescence jaune, dense, dirigée en arrière sur le gastre (ondulee chez *P. custodiens* Sm. ♂). Mat, abdomen presque mat.

Tête rectangulaire, plus longue que large (plus longue que chez *custodiens*), les côtés parallèles, mais plus écartés en arrière des yeux. Ceux-ci sont bombés et un peu plus petits que chez *custodiens*. Épistome subcaréné, à bord antérieur arrondi. Mandibules lisses, pubescentes, fortement arquées vers l'extrémité, armées de 6 dents, la dent apicale beaucoup plus forte, les autres subégales. Le scape, cylindrique et rectiligne, dépasse le bord postérieur de la tête d'un peu plus de la moitié de sa longueur (incurvé au tiers distal chez *P. custodiens*). Thorax un peu moins robuste que chez *custodiens*. Face déclive de l'épinothum faiblement sillonnée de haut en bas. Écaille très amincie et un peu échancrée au sommet, à faces antérieure et postérieure planes, légèrement concave au centre, dépassant un peu le milieu de la hauteur du devant du premier segment du gastre. Abdomen assez fortement déprimé. Armure génitale jaune pâle comme le gastre, avec les volselles rouge brunâtre.

Province du Cap : Willowmore (coll. H. BRAUNS ; G. ARNOLD leg.).

Bien distinct par sa couleur claire de *P. custodiens* et peut-être de *P. Steingröveri*. Pourrait être le ♂ de l'espèce suivante, mais dans le doute je préfère le décrire sous un nom spécial.

**Plagiolepis (Anoplolepis) rufescens, n. sp.**

♀. Long. 3,3 à 6 mm.; il en existe peut-être de dimensions plus fortes.

♀ major. Brun châtain clair, joues jaunâtres. Appendices légèrement plus clairs que le corps. Pilosité dressée jaunâtre, assez dense surtout sur la tête et le thorax (un peu plus abondante que chez *Steingröveri*), plus rare sur les téguments, nulle sur les scapes. Pubescence espacée, cachant peu la sculpture. Celle-ci est assez luisante, surtout sur le gastre; la tête est moins luisante.

Devant de la tête et côtés du thorax très finement striolés, passant

ailleurs à une fine réticulation avec des espaces lisses, surtout sur le gastre. Partout une fine ponctuation pilifère.

Tête carrée, à côtés un peu convexes, à angles postérieurs un peu arrondis et bords postérieurs droits. Aire frontale triangulaire, élargie. Épistome fortement convexe, subcaréné. Le scape dépasse d'un bon tiers le bord occipital (il est plus court chez *Steingröweri*). Mandibules densément et régulièrement striées en long, armées de 6 à 7 fortes dents noires, l'apicale du double plus longue que les suivantes. Thorax conformé comme chez *Steingröweri*, mais le promésotum est un peu plus convexe, la face basale de l'épinotum plus courte, avec les stigmates plus saillants aux angles postérieurs. Écaille mousse, arrondie ou à peine échancrée au sommet, dressée et de même hauteur que chez *Steingröweri*. Gastre dilaté.

♂ minor. Plus luisante partout que la ♀ major; la sculpture plus effacée; tête un peu plus longue que large; le scape dépasse de près de la moitié de sa longueur le bord postérieur de la tête. Promésotum moins convexe que chez la ♀ major. Les stigmates de l'épinotum encore plus saillants aux angles qui sont plus accentués. Écaille épaisse, non échancrée au sommet, gastre plus petit, pour le reste comme chez ♀ major. Diffère, en outre, par sa coloration de *Steingröweri*, dont il est très voisin.

Colonie du Cap : Capetown (D<sup>r</sup> REICHENSBERGER leg.).

*Camponotus maculatus* F. stirps **hieroglyphicus**, n. stirps.

♂ major 11,5 mm. Longueur du tibia postérieur 3,3 mm. Largeur de la tête 2,5 mm., longueur 3,5 mm. avec les mandibules.

Tête, mandibules, scape, thorax et gastre en partie noirs. Moitié des mandibules, bord de l'épinotum, angles postérieurs de la tête, bords du thorax et tarsi d'un brun rougeâtre foncé. Funicule et partie des tibias roussâtres, plus ou moins foncés; hanches, fémurs, écailles et taches du gastre jaunâtres; ces dernières, assez nettement circonscrites, occupent le devant des bords des trois premiers segments, celle du troisième petite, plus ou moins effacée. La base du gastre reste noire derrière l'écaille, mais elle est flanquée latéralement de deux taches jaunes qui se rejoignent au dessous de l'articulation. Les deux quarts médians de la tête, et parfois aussi le dos du thorax, mats; reste de la tête et du thorax presque mats. Densément réticulé-ponctué; les pattes sont mates et plus sculptées. Gastre luisant, lisse, avec une réticulation transversale microscopique. Quelques poils roussâtres dressés sur le gastre, rares sur le thorax, plus courts sur l'épi-

stome et le devant des joues. Tête trapézoïdale, à côtés peu convexes ; les angles postérieurs arrondis et rentrants, le bord postérieur un peu concave. Le scape récliné dépasse la tête de la longueur des deux premiers articles du funicule réunis. Mandibules fortement convexes, à 6 dents. Thorax pas très arqué. Métanotum distinct. Face déclive de l'épinotum bien plus courte que la face basale. Écaille verticale, plane en arrière, coupée en biseau plus ou moins arrondi en devant et tranchante au sommet. Tibias un peu comprimés, sans cannelures ni piquants.

♂ minor. Long. 7 mm. Épistome, une tache floue vers le bord occipital, hanches, fémurs et taches du gastre jaune roussâtre. Reste de la tête, mandibules, scape, dos du thorax et partie des tibias et des tarsi d'un brun foncé plus ou moins roussâtre ; le reste comme chez la ♀ major. Les taches du gastre sont disposées comme chez la ♀ major de *C. maculatus* var. *aegyptiacus* Em., le devant du premier segment du gastre est entièrement jaune, les taches latérales sont un peu plus étendues. Plus luisante que la ♀ major ; pour le reste, comme chez la race *liocnemis* Em.

♀. Long. 13 mm. Tête large de 2,3 mm., longue de 3,3 mm. Thorax large de 2,5 mm. Ailes supérieures longues de 13,5 mm. Plus foncée que la ♀ major. Les taches du gastre ne s'étendent que sur les côtés du deuxième segment. Tibias et métatarse noir brunâtre. Écaille brunâtre, plus mince et plus haute que chez la ♀ major. Le thorax est assez robuste, les deux faces de l'épinotum forment ensemble une forte convexité. Ailes enfumées, à taches brunes et nervures roussâtres. Diffère de la ♀ de *cavallus* Santschi par sa tête et son thorax plus étroits et la disposition des taches. Chez *liocnemis* Em. ; la base du gastre est jaune comme chez *cavallus*, mais avec des taches sur les autres segments. La tête est aussi plus robuste chez *liocnemis* et ses ♂ minor ont la tête entièrement jaune et plus mate.

Benguella : Caconda (J. CRUCHET).

J'avais confondu cette forme avec *liocnemis* ; la race *atramentarius* For. est encore plus foncée et beaucoup plus robuste. La race *guttatus* Em. est plus petite et a les tibias et les tarsi jaunes.

*Camponotus (Myrmoturba) maculatus* F. stirps *manzer* For.

var. *contaminatus*, n. var.

♂. Long. 8-15 mm.

♀ major. Tête noire, avec les angles postérieurs plus ou moins

brunâtres. Pronotum, moins les bords latéraux, mésonotum, métanotum, face basale de l'épinotum, scape, tibias et tarsi brun noirâtre. Gstre noir, avec une bande jaune confluyente vers la base et qui s'étend latéralement aux deux premiers segments, parfois un peu au troisième; le reste d'un jaune terne. La tête, mate, est plus allongée que chez *melanocnemis* Santschi et moins que chez *Liengmei* For. et *manzer* For., avec les côtés moins convexes que chez *melanocnemis* et plus que chez *Liengmei* et *manzer*. Le scape est aussi long que chez *manzer*, plus court chez *Liengmei*. Tibias prismatiques, à piquants bien développés. Pilosité comme chez *manzer*.

♂ minor. Jaune; le gstre a trois bandes brun noirâtre longitudinales et plus ou moins confluyentes, les latérales moins prolongées en devant. La tête a un bord postérieur aussi marqué que chez *manzer* et *melanocnemis* (il est beaucoup plus étroit, presque nul, chez *Liengmei* et *Hayensi* For.): C'est une forme de transition entre *Liengmei* et *melanocnemis* et qui se rapproche surtout de la race *manzer* For.

Sud Rhodesia : Matopo Hill, 23 v 1915 (G. ARNOLD leg.).

*Camponotus (Myrmoturba) maculatus* F. stirps *radamoides* For.  
(Grandidier, Hist. de Madagascar, XX (1891), p. 213).

M. J. DE GAULLE m'a envoyé autrefois quelques ♂ provenant des chasses du D<sup>r</sup> SICARD à Madagascar. Ces insectes ont le gstre tantôt entièrement noir, tantôt faiblement maculé de jaune brunâtre, et la tête noire. Ils se rapportent à la forme décrite par FOREL sous le nom de *radamoides*. Les tibias sans piquants, ainsi que d'autres caractères, font grouper cette forme avec *liocnemis* Em. et *madecassa* Em., mais ayant été décrite antérieurement, elle doit prendre le rang de race à la place d'*atramentarius* For.

La var. *madecassa* Em. est aussi sombre, mais les taches du gstre sont plus claires, plus tranchées et plus nombreuses. Je l'ai reçue aussi du Natal (TRÄGÅRDH) et de la Grande Comore (WOELTZKOW).

*Camponotus (Myrmoturba) maculatus* F. stirps *radamoides* For.  
var. *diffusus*, n. var.

♂ major. Long. 13-13,6 mm. Plus grande que la var. *madecassa* Em. La tête, d'un brun roussâtre, a les angles postérieurs roux jaunâtre, le vertex plus ou moins noirâtre. Les taches jaunes du gstre sont aussi étendues que les noires, avec des limites généralement très

diffuses. A l'exception d'une tache dorsale triangulaire, le premier segment est entièrement jaune. Les tibias sont peu ou non rembrunis. Long. des tibias postérieurs : 3,6-3,9 mm.

♂ minor. Long. 8 mm. Jaune, une bande longitudinale sur le dos du gastre d'autant plus floue et moins distincte que l'insecte est plus petit.

Sud Rhodesia : Matopo Hill (ARNOLD), *types*. Natal (v. MURALT et TRÄGÄRDH). Les exemplaires du Natal sont moins grands et passent à la var. *liocnemis* Em.

*Camponotus (Myrmoturba) maculatus* F. stirps *radamoides* For.  
var. *liocnemis* Em.

♂ minor. Long. 7 mm. Couleur comme chez la var. *diffusus* minor. La ♀, major est encore plus petite que celle du Cap de Bonne-Espérance (*types* de SIMON, reçus de M. EMERY) et les taches de l'abdomen un peu plus nettes que chez *diffusus*. Les tibias postérieurs n'ont que 3 mm.

Voici le tableau des variétés de cette race, dont je détache *atramentarius* et ses variétés que se rapportent plutôt à la race *negus* For. *Mathildae* For.

1. Gastre noir, sans tache ou faiblement taché de roussâtre. Tête noire avec les angles parfois roussâtres. — Madagascar..... stirps *radamoides* For.
2. Tibias postérieurs longs de 3 mm. Tête brun roussâtre plus ou moins foncé, les angles postérieurs plus clairs. Taches du gastre pas très nettement circonscrites. — Cap et Natal..... var. *liocnemis* Em.
3. Tibias postérieurs longs de 3,5 mm. Tête noire, de 3,5 sur 3 mm. Taches du gastre bien circonscrites. — Madagascar, Grande Comore, Natal..... var. *madecassa* Em.
4. Tibias postérieurs longs de 3,6 à 3,9 mm. Tête brun roussâtre, à angles postérieurs roux; taches du gastre plus diffuses. — Rhodesia..... var. *diffusus* Santschi

*Camponotus (Colobopsis) bifossus*, n. sp.

♂. Long. 7 mm. Noir. Les deux tiers antérieurs de la tête d'un roux jaunâtre en avant, roux brunâtre en arrière, ainsi que les man-

dibules. Antennes, scrobe et tarsi brunâtres, bord postérieur des segments du gastre étroitement jaunâtre. Presque mat. Tête et thorax densément et finement ponctués-réticulés. La tête est, en outre, couverte de grosses rides, généralement réticulées, surtout en avant et sur les côtés où elles dessinent de nombreuses fossettes irrégulières. Ces rides sont plus ou moins serpiginieuses et allongées en arrière et sur le front. Face déclive de l'épinothum et abdomen finement striés en travers, le gastre plus mat que le thorax. Pilosité dressée épaisse, obtuse, blanche, dispersée en bordure sur l'épinothum, l'écaille et le bord des segments du gastre, clairsemée ailleurs. Pubescence très courte, couchée, assez rare partout, excepté sur les antennes.

Tête cylindrique, obliquement tronquée en avant; vue de profil, elle forme un trapèze dont la base est aussi longue que la hauteur; vue de haut, elle représente un carré dont les angles sont légèrement rentrés. Yeux médiocres, situés environ au tiers postérieur des côtés. Les arêtes frontales sont très écartées, leur intervalle en arrière est le double de celui qui les sépare des yeux; elles limitent une gouttière ou scrobe qui peut loger la moitié antérieure du scape. Celui-ci, assez comprimé, dépasse de près d'un quart de sa longueur le bord postérieur de la tête. Aire frontale arrondie en arrière. Épistome étroit, une fois et demie aussi long que large, plat ou très faiblement caréné; le bord antérieur en lobe arrondi, les côtés bordés. De chaque côté de l'épistome se trouve une grande impression semiovale, limitée en dehors et en arrière par le bord saillant de la troncature de la tête, et en dedans par les côtés de l'épistome. Mandibules sculptées comme la tête, à 6 dents. Pronotum bien plus étroit que la tête, convexe, non bordé et faiblement épaulé. Mésonotum aussi long que le pronotum, formant sur le profil, avec la face basale de l'épinothum, une ligne horizontale presque droite (à peine convexe).

Métanotum distinct. Face basale de l'épinothum transversalement convexe, formant avec la face déclive un angle légèrement obtus presque droit. Celle-ci, aussi longue que celle-là, est bordée, un peu concave en bas, avec le bord supérieur arrondi subogival. Écaille mince, quatre à cinq fois aussi haute qu'épaisse; la face antérieure assez convexe, la postérieure presque plane, les bords tranchants, le sommet arqué. Gastre plus haut en avant que l'écaille, aussi large que la tête, ovale. Tibias cylindriques, sans rangée de piquants.

Cap de Bonne-Espérance : Caledon (PÉRINGUEY, 1905). S. Afr. Museum of Capetown, un ♂, reçu de M. G. ARNOLD.

***Polyrhachis (Myrma) Gamaii*, n. sp.**

♀. Long. 8,5 mm. Noire. Mandibules, trochanters et tarsi brunâtres. Segments du gastre étroitement bordés de roussâtre. Luisante. Occiput, côtés de la tête et du pronotum, mésopleure, épinothum et écaille très finement ponctués-réticulés. Pilosité dressée fine, lanugineuse, clairsemée sur la tête et le thorax, plus abondante sur l'abdomen. Pubescence dorée oblique, assez espacée; bien distincte et plus relevée sur les joues.

Tête environ d'un sixième plus longue que large, subtronquée en avant. Le bord occipital largement concave, avec les angles postérieurs distincts, bien qu'émoussés. Les côtés sont un peu convexes, surtout en arrière des yeux. Ceux-ci se trouvent légèrement en arrière du milieu des côtés, dont ils occupent près du quart. L'intervalle des arêtes frontales égale presque celui qui les sépare des yeux. Aire frontale petite, pas très distincte, suivie d'un sillon médian qui ne dépasse pas la hauteur des arêtes frontales. Ocelles petits et assez rapprochés. Épistome convexe, non caréné, à bord antérieur passablement arqué. Mandibules ponctuées, striées, étroites, à bord interne subparallèle au bord interne et à bord terminal oblique armé d'une forte dent apicale suivie de quatre denticules. Thorax allongé, un peu plus étroit que la tête, plus haut que large. Pronotum à bords latéraux arrondis, épaulé, mais avec les angles mousses. Mésonotum et scutellum formant un disque ovale à bords arrondis, presque du double plus long que large, séparés par un sillon en demi-lune qui n'atteint pas les bords. Métanotum très étroit, peu enfoncé. Face basale de l'épinothum aussi longue que la face déclive, régulièrement convexe de droite à gauche (non bordée) et faiblement convexe sur le profil, armée de deux dents courtes, épaisses et relevées. Face déclive verticale sur ses deux tiers supérieurs qui sont bordés et transversalement concaves; le tiers inférieur est au contraire convexe d'un côté à l'autre et non bordé. Écaille épaisse, un peu plus haute que la longueur de sa base. La face antérieure verticale, faiblement convexe de droite à gauche. Face postérieure convexe et oblique en avant, se continuant avec la face supérieure qui devient concave entre ses angles. Ceux-ci sont prolongés par une épine oblique en arrière, en haut et en dehors, et aussi longue que l'intervalle qui sépare sa base de celle de l'angle opposé. Le bord externe de l'écaille, très anguleux, présente en dessous de l'épine une légère saillie triangulaire. Le gastre est ovale, plus large que le thorax, subtronqué en avant

avec les bords arrondis. Longueur du tibia postérieur : 2,5 mm. Largeur du thorax : 1,6 mm., largeur du gastre : 2,1 mm.

Natal : Durban (H. BELL MARLEY leg.), une seule femelle à qui il manque les ailes et les antennes (Rhodesia Museum).

#### Post-scriptum.

Le *Monomorium Santschii* For., avec ses ouvrières monomorphes et sa massue antennaire de 4 articles, ne peut demeurer dans le sous-genre *Paraholcomyrme* et mérite un nom spécial. Je propose **Isolcomyrme**, nov. subg.