



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Digitized by Google

5949 e
593



600036251N

G. 105. S. 12.



E. BIBL. RADCL.

~~X~~ C

18949 e. 303



CAROLI LIB. BAR. DE GEER
REGIAE AVLAE MARESCH. R. ORD. WASIACI,
COMMEND. CRVGIG. R. ORD. DE STELLA BOR.
EQVIT. AVRAT. R. ACAD. SCIENT. SVEC.
MEMBR. ET PARISINAE CORRESPOND.

GENERA
ET
SPECIES
INSECTORVM

E
GENEROSSISSIMI AVCTORIS
SCRIPTIS

EXTRAXIT, DIGESSIT, LATINE QVOD PARTEM
REDDIDIT, ET TERMINOLOGIAM INSECTO-
RVM LINNEANAM ADDIDIT

ANDERS JAHAN RETZIVS

PHIL. MAG. PROF. REG. ET BOTAN. DEMONSTR.
SOCIET. PHYSIOGR. LVND. SECRET. SOC. REG. PA-
TR. SVEC. ET HASSO-HOME. MED. HAFN. NAT. CV-
RIOS. BEROL. ET SCIENT. AC ELEG. LITT. GOTH.
MEMBR. SOC. OECGN. LIPS.
CORRESPOND.

LIPSJAE,
APVD SIEGFRIED LEBRECHT CRVSIVM,
MDCCCLXXXIII.



B. L.

Excellentissimum Opus Illustrissimi DE GEER multi noscunt pauci possident. Ordines Ejus a perpaucis forte naturales judicantur, Genera a pluribus; Specierum autem descriptio et historia omnibus Entomologis acceptissima. In observandis et describendis Insectis *Reatis murium* Gallorum illud lumen primo quidem imitatus est, dein vero

*
intul-

multum superavit. Hinc tanta inter primum et sequentes tomos differentia. Dolendum est a b. Auctore, matura nimis morte praevento, Additamenta et Correctiones in ordinem redacta non fuisse; de editione enim nova Primi Tomi et Supplementorum serio cogitabat; sed dignum, qui ad Nestoreos vixisset annos, nimis cito desideravimus virum.

Quem in proprium usum conscripsi Catalogum Systematicum, vidi demum etiam aliis utilem fore; non vero illis tantum, quibus copia sit ipsius Operis De Geeriani, sed iis quoque, quibus illud sibi comparare non contigerit. Quamvis

vis enim ipsa Generum ordinatio a Linneana methodo abscedat, quamvis denique nomina specifica ab Illustrissimo Auctore adhibita secundum rigorem Systematicorum non sint concinnata et trivialia saepissime mutata; egregie tamen ejus definitiones ad Infectorum cognitionem conducere judicavi, in primis si cum definitionibus Linneanis conferantur.

Qui forte errores in citatione nominum Ill. a Linné a b. Auctore commissi sint, lubentissime emendatos voluissem; sed quoniam Infectorum collectione, ad hoc prosequendum sufficiente, destitutus sum: parcissimus in his fui, ne confusio-
nem

nem augerem, quam evitare stu-
debam.

Nomina Ordinum et Specierum
trivialia ab Ill. Auctore Gallice
tantum data, qua potui fide latine
reddidi. Exoticas speciēs indigenis
immiscui. Si vero in his coordi-
nandis nonnunquam erraverim, id
factum esse sine inspectione subjecto-
rum oculari scias velim.

Laborem itaque pro scopo et
aeque judices quaeso. Vale.

R.

I. Lepi-

		1. Lepidoptera.
		G. 1 — 5.
	2. Elingua. G. 6	
		— 7.
1. Gymnoptera.	3. Neuroptera.	
	G. 8 — 13.	
	4. Hymenoptera.	
	G. 14 — 23.	
	5. Siphonata. G.	
	24 — 27.	
	6. Dermaptera.	
	G. 28 — 29.	
2. Alata.	7. Hemiptera. G.	
	30 — 35.	
	8. Coleoptera. G.	
	36 — 69.	
	9. Halterata. G.	
3. Diptera.	70 — 81.	
	10. Probdscidea.	
	G. 82.	
A 2	2. Apt-	

	4. Saltatoria.	{ II, Suctoria. G. 83.
2. Apterā.		
	5. Gressoria.	12. Aucenata. G. 84 — 88.
		13. Atrachelia. G. 89 — 96.
		14. Crustacea. G. 97 — 100.

Ord. I. ALATA alis instruuntur.

2. APTERA alis deſtituuntur.

Subordo I. GYMNOPTERA Alae IV.

2. VAGINATA Alae II. Thecae II.

3. DIPTERA Alae II. Thecae o.

4. SALTATORIA Alae o. Larvae
Pupaeque statum trans agunt.

5. GRESSORIA Alae o. Sine me-
tamorphosi ex ovo prodeunt.

Classis I. LEPIDOPTERA Alae IV. farinosa. e.
Rostrum spirale.

2. ELINGVIA Alae IV. nuda. Ro-
strum o. Dentes o.

Classis

- M
- Classis 3. NEUROPTERA** Alae IV. nudae,
aequales, reticulatae. Os den-
tatum.
- 4. HYMENOPTERA** Alae IV. nudae,
inaequales, nervis longitudinali-
bus plerumque. Os dentatum.
Anus armatus aculeo plerisque.
- 5. SIPHONATA** Alae IV. membrana-
ceae. Rostrum sub pectore flexum.
- 6. DERMAPTERA** Vaginae II. semico-
riaceae et semimembranaceae cru-
ciato-complicatae. Alae II. mem-
branaceae. Rostrum sub pectore
flexum.
- 7. HEMIPTERA** Vaginae II. coriaceae
aliformes. Alae II. membranaceae.
Os dentatum.
- 8. COLEOPTERA** Vaginae II. durae,
crustaceae. Alae II. membrana-
ceae. Os dentatum vel maxillo-
sum.
- 9. HALTERATA** Alae II. membrana-
ceae. Halteres II. Os edentulum
proboscide instructum.

Classis IO. PROBOSCIDEA *Mas.*, Alae II.
membranaceae. Halteres nulli.
Dentes nulli, nec Rostrum.

Foemina aptera, sub pectore ro-
strata.

ii. **SvCTORIA** Alae o. Pedes VI. Os
proboscideum. E nympha Imago.

iii. **AVCENATA** Alae o. Pedes VI.
Caput a Thorace distinctum.

iv. **ATRACHELIA** Alae o. Pedes VI. vel
plures. Caput thoraci adnatum.

v. **CRVSTACEA** Alae o. Pedes XIV.
et ultra. Caput a thorace distin-
ctum.



GENE

GENERALIA.

1. PAPILLIO. Papillon.

Antennae clavatae. Alae quiescentis erectae.

Fam. 1. Ped. 6. ambulatorii. *Alae inferiores ventris latera tegentes, vt abdomen occultetur.*

2. Ped. 6. ambul. *Alae infer. dorsi latera tegentes, vt venter apparet.*

3. Ped. 6. ambul. *Alae versus posteriora inclinatae.*

4. Ped. 4. ambul. 2. spurii villosi, penduli.

5. Ped. 4. ambul. 2. spurii oecultati.

2. SPHECINAE. Papillon-Bourdon.

Ant. clavatae vel prismaticae medio crassiores. Alas horizontales abdomen non tegentes.

Fam. 1. Ant. clavatae. *Anus crassus, barbatus. Lingua spiralis.*

2. Ant. prismaticae. *Ante acuminatus. Lingua spiralis.*

3. Ant. prismaticae. *Anus acuminatus. Rostrum breve.*



3. ADSCITA. *Phalene.*

Ant. clauatae. Alae subdeflexae, invicem incumbentes.

4. PTEROPHORVS. *Phalene-Tipula.*

Ant. filiformes. Alae fissae.

5. PHALENA. *Phalene.*

Ant. setaceae. Alae deflexae vel horizontales.

Fam. 1. *Ant. pectinatae. Rostrum o. vel breve.*

Sectio 1. *Alae horizontales.*

2. *Alae semitectae.*

3. *Alae deflexae. Dorsum laeve.*

4. *Alae deflexae. Dorsum crista-
tum.*

Fam. 2. *Ant. pectinatae. Lingua spiralis.*

Sectio 1. *Alae deflexae postice dentatae
l. sinuatae.*

2. *Alae deflexae postice integrae.*

3. *Alae horizontales postice den-
tatae l. sinuatae.*

4. *Alae horizontales postice in-
tegrae.*

5. *Alae horizontales : inferiores
medio postice acuminatae.*

Fam. 3. *Ant. filiformes, breves. Lingua o.*

Fam. 4. *Ant. setaceae, longae. Lingua o.*

Fam. 5. *Ant. setaceae. Lingua spiralis.*

Sectio 1. *Alae superiores horizontales l.
deflexae supra dorsum invicem
incumbentes. Inferiores pli-
catiles.*

2. *Alae deflexae. Dorsum laeve.*

3. *Alae deflexae. Dorsum crista-
tum.*

Sectio

Sectio 4. *Alae horizontaliter extensae L.
patentes.*

Art. 1. *Alae mediocres, minus
exacte horizontales.*

2. *Alae majores, horizon-
tales.*

5. *Alae convolutae.*

6. *Alae rhombeae.*

7. *Alae pendentes.*

8. *Alae lanceolatae, compressae,
postice elevatae fimbriatae.*

6. PHRYGANEAE. *Friganea.*

Ant. setacea thorace longiores. *Os* edentulum,
palpis 4. *Alae* deflexae, inferiores plicati-
les. *Stemmata* 3. *Tarsi* artic. 5.

Fam. 1. *Ant.* longitudine circiter alarum.
2. *Ant.* longiores alis.

7. EPHemeridae. *Ephemeræ.*

Ant. breves. *Os* sine dentibus, lingua, pal-
pis. *Alae* erectæ, inferiores minores.

Stemm. 2. 3. *Cauda* setosa. *Tarsi* artic. 5.

Fam. 1. *cauda* trifeta.
2. *cauda* bifeta.

8. LIBELLULIDÆ. *Demoiselle.*

Ant. breves. *Os* maxillis 4. *Alae* extensæ,
aequales. *Stemm.* 3. *Tarsi* artic. 3. *Cauda*
foliolis terminata.

Fam. 1. *Caput* grande fere sphaericum.
Alae horizontales.

2. *Caput* grande, sed breve. *Alae*
erectæ.



9. HEMEROBIVS. Hemerobe.

Ant. filiformis thorace longiores. Os dentatum, palpis 4. Alae deflexae, aequales. inferiores non plicatae.

10. MYRMELEON. Fourmilion.

Ant. clavatae. Os dentatum. Palpi 4. Alae deflexae, aequales, inferiores non plicatae. Stemm. o. Tarsi artic. 5.

11. PERLA. Fausse-Frigane.

Ant. setaceae thorace longiores. Os dentibus et palpis. Alae aequales, horizontales, inviœm incumbentes. Stemm. 3. Tarsi artic. 3.

Fam. 1. *cauda simplici.*

2: *cauda bifeta.*

12. PANORPA. Mouche-Scorpion.

Ant. filiformes thorace longiores. Caput præductum in rostrum cylindricum apice dentibus ac palpis instructum. Alae aequales, horizontales. Stemm. 3. Tarsi articul. 5. Cauda maris chelata.

13. RAPHIDIA. Rappidie.

Ant. filiformes. Os dentibus et palpis 4. Thorax longus, angustus, cylindricus. Alae deflexae, aequales. Stemm. 3. Tarsi 4. artic. Cauda foeminae feta recurva.

14. APIS. Abeille.

Ant. fractae: articulo primo longo. Os dentibus et rostro flexili fracto sursumque platico. Alae planae. Abdomen thoraci petiolo brevi adnexum. Aculeus punctarius in abdo-

abdomine reconditus. *Oculi* reticulati, ovales, integri.

15. NOMADA Proabcille. Apis-ichneumon.

Ant. clavatae, vel filiformes articulis 12. Os dentibus et rostro prorecto, vagina cartilaginea cylindrica. Alae planae. Abdomen petiolatum. Aculeus pungitorius in abdomen reconditus. Oculi reticulati, ovales, uniti.

16. VESPA. Guespe.

Ant. fractae articulo primo elongato. Os dentibus et proboscide retractili membranacea. Alae longitudinaliter plicatae. Abdomen petiolatum. Aculeus pungitorius in abdomen reconditus. Oculi reticulati, lunati.

17. SPHEX. Guespe-ichneumon.

*Ant. fractae vel filiformes artic. 12. Os dentibus, elingue. Alae planae. Abdomen petiolatum. Aculeus pungitorius reconditus. Oculi reticulati, ovales, integri.
Fam. 1. Ant. fractae, clavatae;
2. Ant. filiformes.*

18. CHRYSIS. Guespe-Dorée.

Ant. fractae, filiformes, articulis 12. primo longiore. Os dentatum, elingue. Alae planae. Abdomen subtus fornicateum. Anus plerisque dentatus. Aculeus vaginatus reconditus.

19. SIREX. Ichneumon-Bourdon.

Ant. filiformes articulis pluribus. Os dentatum. Alae subfornicatae. Abdomen sessile,

file, ano acuto. *Aculeus exsertus rigenis*,
vagina bifoliata exceptus.

30. ICHNEUMON. *Ichneumon.*

Ant. vel setaceae articulis plurimis, vel clavatae, vel ramosae. *Os* dentatum. *Alae planae*, horizontales. *Abdomen* petiolatum. *Aculeus exsertus* vagina bifoliata exceptus.

Fam. 1. *Ant. setaceae.* *Abdom.* cylindricum.

2. *Ant. setaceae.* *Abdom.* fusiforme.

3. - - - falcatum.

4. - - - segmento ultimo globoſo.

5. - - - thoraci supra infertum.

6. *Ant. filiformes.*

7. - fractae, clavatae.

8. - ramosae.

9. *Foeminae apterae.* *Myrilla Linn.*

31. CYNIPS. *Cinips.*

Ant. filiformes, longae, articulis 13 — 14. *Os* dentatum, elingue. *Alae* horizontales. *Abdom.* subovale, compressum, subtus carinatum, breviter petiolatum. *Aculeus spiralis* in abdomen intra vaginam bivalvem reconditus. *Larvae Gallarum.*

32. TENTHREDO. *Mouche à Scie.*

Ant. variae. *Os* dentatum, elingue. *Alae* subfornicatae, (tumidae Linn.) inconditae. *Abdom.* sessile. *Aculeus laminis duabus seratis* sub abdome.

Fam. 1. *Antennis capitatis.*

Fam.

- Fam. 2. *Antennis triarticulatis clavatis.*
 3. - novemarticulatis filiformibus.
 4. *Antennis pectinatis.*
 5. - setaceis, articulis 9. pluribus.

23. FORMICA. Fourmi.

- Ant.* fractae, artic. 1. longiore. *Os dentatum.*
Alae horizontales maris et foeminae, spadonis nullae. *Abdomen petiolatum.*
 Fam. 1. *Squama verticalis in petiolo abdominis.*
 2. *Sqnama nulla. Petiolus ex articulis globosis.*

24. THRIPS. Trips.

- Ant.* filiformes longitudine thoracis. *Rostrum* sub capite. *Alae lineares, horizontales, fimbriatae.* *Corpus elongatum, subcylindricum.* *Tarsi vesiculis terminati.*

25. APHIS. Puceron.

- Ant.* thorace longiores. *Rostrum* subtus recutatum. *Alae erectae vel nullae.* *Pedes ambulatorii.* *Abdomen postice cornibus vel tuberculis 2.* *Tarorum articulus 1.*
 Fam. 1. *abdomen torniculatum.*
 2. - *tuberculatum.*

26. CHERMES. Faux-Puceron.

- Ant.* thorace longiores. *Rostrum* sub pectore. *Alae deflexae.* *Pedes saltatorii.* *Caput tuberculis 2. conicis terminatum.* *Tarsi artic. 2.*

27. CI-

27. CICADA. *Cigale.*

Ant. thorace breviores filo terminatae. *Rostrum* sub pectore inflexum. *Alae* deflexae et fornicatae: inferiores saepe plicatae: superiores saepe coriaceae et coloratae. *Pedes* saltatorii. *Tarsi* artic. 3.

Fam. 1. *Caput* in formam rostrum elongatum.

2. *Thorax* magnus, compressus, elevatus.

3. *Thorax* utrinque cornutus.

4. - inermis. *Alae* deflexae, membranaceae omnes. *Stemmata* 3.

5. *Thorax* inermis. *Alae* deflexae, superiores coloratae et semicartilagineae. *Stemmata* 2.

28. CIMEX. *Punaise.*

Ant. thorace longiores. *Rostrum* sub pectore recurvatum. *Hemelyptera* 2. plana, cruciato-complicata. *Alae* 2. membranaceae. *Tarsi* artic. 3.

Fam. 1. *Antenn.* siliiform. articulis 5.

2. - 4.
3. setaceae, acuminatae, *rostrum* curvatum capite vix longius.

4. *Antenn.* setaceae, acuminatae, *rostrum* longum rectum capitis et thoracis longitudine.

5. *corpus* depresso, planum.

6. - angustum, elongatum fere cylindricum.

7. *elyptris* coadunatis.

29. N.s.

29. NEPA. Punaise d'eau.

Ant. capite breviores, sub oculis. *Rostrum* sub thorace flexum. *Hemelytra* 2. cruciato-complicata. *Alae* 2. membranaceae. *Pedes* anteriores saepe chelati et posteriores saepe natatorii. *Tarsi* artic. 1. 2.

Fam. 1. Ped. anter. cheliformes. *Nepa* Linn.

2. simplices. *Notonepa* Linn.

30. MANTIS. Mantis.

Ant. setaceae. *Os* dentibus palpisque. *Caput* declinatum. *Thorax* elongatus, angustus. *Pedes* antici a reliquis remoti: quinque anibulatiorii. *Alae* horizontales. *Tarsi* artic. 5.

31. LOCUSTA. Sauterelle. *Gryllus Tettigonia* Linn.

Ant. setaceae corpore plerumque longiores. *Os* dentibus palpisque. *Caput* verticale. *Hemelytra* deflexa. *Alae* plicatae. *Cauda* enspera foeminis. *Ped.* saltatorii. *Tarsi* artic. 4.


32. ACRYDIVM. Criquet. *Gryllus Locusta* Linn.

Ant. filiformes corpore breviores. *Os* dentibus palpisque. *Caput* verticale. *Hemelytra* deflexa. *Alae* plicatae. *Cauda* simplex. *Pedes* saltatorii. *Tarsi* artic. 3.

33. GRYLLVS. Grillon. *Gryllus Acheta* Linn.

Ant. setaceae corpore longiores. *Os* dentibus palpisque. *Caput* rotundatum. *Hemelytra* horizontalia. *Alae* plicatae; hemelytris postice longiores. *Cauda* setis 2. *Pedes* saltatorii plerisque. *Tarsi* artic. 3.

34. BLAT-



34. BLATTA. *Blatte.*

Ant. setaceae, longae. *Os dentibus palpisque.*
Caput sub thorace piano marginato inclinatum. *Hemelytra* horizontalia. *Alae* pli-
catae. *Cornicula* 2. articulata caudae. *Pe-
des cursorii.* *Tarsi* artic. 5.

35. FORICULA. *Perce-Oreille.*

Ant. filiformes. *Os dentibus palpisque.* *Ely-
tra* dimidiata alas occultantia. *Forceps*
mobilis caudae. *Tarsi* artic. 3.
* *Tarsi omnes articulis 5.*

36. STAPHYLINUS. *Stapbylin.*

Ant. filiformes. *Elytra* dimidiata alas occul-
tantia. *Cauda exferens* 2. vesiculos ob-
longas.

37. LAMPYRIS. *Lampyre.*

Ant. filiformes. *Thorax* planus, semiorbicu-
latus, margine caput occultans. *Elytra*
flexilia. *Abdominis* latera papillosa.

38. TELEPHORVS. *Telephore.* *Cantharis* Linn.

Ant. filiformes. *Thorax* planus, marginatus.
Caput exsertum. *Elytra* flexilia. *Abdu-
minis* latera papillosa.

39. COLLIVRIS. *Colliure.*

Ant. filiformes. *Caput* conicum, postice at-
tenuatum. *Oculi magni*, nitidi. *Thorax*
longus, angustus, cylindricus.

40. CARABVS. *Carabe.*

Ant. filiformes: articulis subconicis. *Thorax*
utrinque truncatus, lateribus marginatus,
medio convexus. *Abdom.* ovale, conve-
xum.

xum. *Elytra marginata.* *Appendix* femorum posticorum.

Fam. 1. *apteri* alis nullis sub elytris.

2. *alati.*

41. CICINDELA. Cicindele.

Ant. filiformes. *Caput* magnum, thorace rotundato submarginato latius. *Oculi* magni, nitidi. *Dentes* magni, porrecti, intus ferrati. *Appendix* femorum posticorum major.

42. BUPRESTIS. Bupreste.

Ant. serratae longitudine thoracis. *Capitis* di- midium thoraci intrusum. *Corpus* elongatum. Non salit.

Fam. 1. *Elytra* ferrata.
2. - *integra.*

43. ELATER. Taupin.

Ant. filiformes, dentatae. *Corpus* elongatum, acuminatum. *Thorax* postice mucronibus binis angulatis terminatus. Dorso impo- situs exfilit.

44. SILPHIA. Bouclier.

Ant. extrofsum crassiores, plerumque truncatae vel perfoliatae. *Thorax* planiusculus, marginatus, caput non tegens. *Ely- tra* marginata, replicata.

45. DERMESTES. Dermeste.

Ant. clavatae: clava articulis 3, perfoliata vel truncata. *Thorax* convexus *elytraque* non marginata. *Tibiae* inermes.

Fam. 2. *alati.*

*** *Tarsi omnes articulis 4.*

58. CERAMBYX. *Capricorne.*

Ant. setaceae articulis conicis. Oculi lunati, circa basin antennarum. Elytra sublinearia.

Fam. 1. *Thorax planiusculus, marginato-dentatus.*

2. *Thorax subcylindricus, non marginatus spinosus.*

3. *Thorax subcylindricus, non marginatus inermis.*

4. *Thorax orbicularis, planiusculus, inermis.*

59. LEPTURA. *Lepture.*

Ant. filiformes ante oculos. Oculi integri.

Thorax elytris angustior, in primis apice.

Elytra fastigiata.

Fam. 1. *Thorace spinoso.*

2. *inermi.*

60. NECYDALIS. *Necydale.*

Ant. filiformes. Elytra alis minora, breviora vel angustiora. Oculi lunati, circa basin antennarum. Abdom. elongatum.

Fam. 1. *Elytris dimidiatis.*

2. *postice angustatis.*

61. CLERVS. *Clatron.*

Ant. moniliformes extus crassiores. Thorax convexus petice attenuatus, Caput declinatum. Corpus elongatum.

62. CAS-

62. CASSIDA. *Casside.*

Ant. clavato-incrassatae. *Caput* sub *clypeo* marginato occultatum. *Elytra* marginata, ab domine majora.

63. IPS. *Ips.*

Ant. fractae, clavato-capitatae. *Caput* globosum, parum deflexum. *Thorax* magnus, cylindricus, gibbus. *Abdom.* cylindricum. *Tibiae* dentatae.

64. CURCVLIO. *Charançon.*

Ant. capitatae in *capitis* rostro elongato.

Fam. 1. longirostris *antennis* fractis, femoribus dentatis.

2. brevirostris *antennis* fractis, femoribus dentatis.

3. longirostris *antennis* fractis, femoribus muticis,

4. brevirostris *antennis* fractis, femoribus muticis.

5. longirostris *antennis* strictis.

6. brevirostris

7. *femoribus* posticis crassis saltatoriis.

65. BRUCHVS. *Bruche.*

Ant. sensim incrassatae, articulo ultimo rotundato. *Caput* productum in rostrum breve depresso apice rotundatum. *Oculi* lunati. *Thorax* marginatus. *Elytra* abdome breviqra, apice rotundata.

66. ANTHRIBVS. *Antribe.*

Ant. clavatae vel incrassatae articulis tribus capiti impositae; *Thorax* latus, marginatus.

67. ANTIPVS. Antipe.

Ant. ferratae. Caput magnum, maxillis portatis. Thorax latus, parum convexus, elevato-marginatus. Corpus subcylindricum. Pedes anteriores longiores.

68. CHRYSOMELA. Chrysmela.

Ant. moniliformes, extrosum crassiores, corpore breviores. Thoracis latera marginata. Abdom. ovale, plus minus elongatum.

Fam. 1. *corpore ovali, thorace largo.*

2. *cylindrico, thorace gibbo caput excipiente.*

3. *corpore elongato, thorace angusto subcylindrico.*

4. *Saltatoriae, femoribus posticis incrassatis.*

*** *Tarsi omnes articulis 3.*

69. COCCINELLA. Coccinelle.

Ant. clavatae; clava compressa truncata. Palpi clava triangula. Corpus hemisphaericum subtus planum. Thorax et Elytra marginata.

Fam. 1. *Elytris rubris l. flavis, maculis nigris.*

2. *Elytris rubris l. flavis, maculis albis.*

3. *Elytris nigris, albo-flavo-l. rubro-maculatis.*

* * *

70. MVSCA. Mouche.

Ant. aristatae. Proboscis labii carnosiss.

Fam. 1. *Antenn. filo simplici, corpore piloso.*

Fam. 2.

Fam. 2. *Aixonn.* filo barbato, corpore piloso.

3. *Antenn.* filo simplici, corpore villosa.

4. *Antenn.* filo barbato, corpore villosa.

71. STRATIOMYS. *Stratiome.*

Ant. cylindricae, fractae, articulis 3. *Proboscis* labiis carnosis. *Scutellum* spinis duris. *Alae* invicem incanibentes.

72. NEMOTELEVS. *Nemotele.*

Ant. cylindricae vel moniliformes, articulis 3, capite breviores. *Proboscis* labiis carnosis.

Fam. 1. *Ant.* articulo 3. filo terminatae.

2. - - - - nullo.

3. - - - - stylo rigido terminatae.

4. *Ant.* clavatis aristatis.

73. TABANVS. *Taon.*

Ant. longitudine capitis, articulis 3. ultimo demum articulato. *Proboscis* labiis carnosis, aculeis compressis lanceolatis parallelis, testa *palpis* 2. magnis. *Alae* subextensae. *Fororum* articulus ultimus tripenicillatus.

Fam. 1. *Ant.* lunatis, articulo ultimo articulis 4 constante.

2. *Ant.* rectis, articulo ultimo articulis 4 pluribus.

74. ASIEVS. *Afille.*

Ant. cylindricae, fractae, articula tertio ultimo longiore compresso rotundato. *Ro-*

strum elongatum, rigidum, corneum, porrectum.

Fam. 1. *Ant.* non aristatis.

2. - aristatis.

75. **E M P I S.** *Empis.*

Ant. longitudine capitis, articulis 3. conicis.

Rostrum longum, rigidum, corneum, perpendiculare vel nutans.

76. **C O N O P S.** *Conops.*

Ant. capite longiores, basi approximatae, articulis 3. ultimo conico, hamato. *Rostrum* fractum, angustum, rigidum, palpis nullis. *Abdomen* clavatum.

77. **B O M B Y L I V S.** *Bombille.*

Ant. longitudine capitis, fractae, articulo tertio ultimo crassiore elongato. *Rostrum* longum, setaceum, porrectum, bivalve: valvulis horizontalibus intra quas aculei setacei. *Abdomen*. breve, crassum. *Ales* subextensae.

78. **H I P P O B O S C A.** *Hippobosque.*

Ant. brevissimae, setaceae, basi tuberosa. *Rostrum* setaceum, vagina bivalvi.

79. **O E S T R V S.** *Oestrus.*

Ant. subglobosae, 3. articulatae, aristatae. *Rostrum* nullum. *Palpi* nulli.

80. **C V L E X.** *Coufin.*

Ant. filiformes, pilosae, plumatae. *Rostrum* vagina flexilis aculeis setaceis. *Abdomen* elongatum cylindricum.

81. **T I**

81. TIPULA. Tipule.

Ant. setaceae l. filiformes, villoſae, plumosae, pectinatae, etc. *Rostrum* porrectum *labiis* terminatum, *palpisque* duobus longis articulatis recurvatis. *Abdomen* elongatum, cylindricum.

- Fam. 1. *Ant.* setaceis l. filiformibus, saepe plumosis in māribus.
- 2. *Ant.* pectinatis.
- 3. - nodosis.
- 4. - incrassatis, brevibus, subulatis.

82. COCCVS. Gallinſetæ.

Foemina aptera, rostro inter pedes anteriores. *Mas* exdens, elinguis, *alis* 2. et *filis* 2. setaceis caudæ.

- Fam. 1. *Foem.* gallæ similis, cute aequali.
- 2. - *infectio* similis, cute annulata.

83. PVLEX. Puce.

Pedes 6; postici longi, saltatorii. *Oculi* 2. *Proboscis* brevis, recurva. *Ant.* filiformes. *Annuli* ventris cute cartilaginea tecti,

84. LEPISMA. Forbicine.

Pedes 6. *Oculi* 2. compositi. *Palpi* 4. *Ant.* setaceae. *Cauda* filis 3. *Corpus* squamis tectum.

85. PODVRA. Podure.

Pedes 6. *Oculi* 2. compositi ex 8. *Ant.* filiformes. *Cauda* bifurcata sub abdome inflexa, saltatrix.

Fam. 1. *Ant.* rectiusculis, articulis 4.
2. fractis, articulis 4. pluribus.

86. TERMES. Termo.

Pedes 6. *Oculi* 2. reticulati. *Ant.* fetaceae
1, filiformes, thorace longiores. *Os dentibus* 2, et palpis 4. mobilibus,

87. PEDICVLVS. Pou.

Pedes 6. *Oculi* 2. *Rostrum* breve capitis. *Ant.*
longitudine thoracis. *Abdomen* depre-
sum.

88. RICINVS. Ricin.

Pedes 6. *Oculi* 2. *Ant.* filiformes longitudine
circiter capitis. *Dentes* 2. sub capite. *Ab-*
domen depresso.

89. ACARVS. Mitre.

Pedes 8. *Oculi* 2. *Rostrum* breve capitis. *Tegu-*
tacula 2. pediformia, artioulata.

Fam. 1. *Vitellium.*

- 2. *Mammalium.*
- 3. *Avium.*
- 4. *Insectorum.*
- 5. *Vegetabilium.*
- 6. *Vagabundi.*
- 7. *Aquatici.*

90. PHALANGIVM. Fauchbeur.

Pedes 8. *Oculi* 2. *Cibae* 2. didactylae in ex-
pitis antica parte. *Tentacula* 2. pedifor-
mia. *Abdomen* ovale.

91. ARA-

91. ARANEA. Araignée.

Pedes 8. *Oculi* 8. *Forcips* articulatus capitis. *Tentacula* 2. articulata pediformia. *Mamillae* 2. ani, netrioes, mobiles.

- Fam. 1. *Retioriae*, telas circulares, regulares, retiformes verticales nent.
 2. *Textoriae*, telas irregulares nent.
 3. *Vestiariae*, telas regulares, horizontales conficiunt.
 4. *Ar. Lupus* nullas telas conficit. *Pedes* poster. longiores. Rapinam cursitando capit.
 5. *Ar. Phalangium*, nullas telas conficit. *Pedes* subaequales. Insiliendo rapit.
 6. *Ar. Cangroides*, nullas telas conficit. *Pedes* 4. posteriores breviores.
 7. *Aquaticæ* in aqua vivunt.

92. SCORPIO. Scorpion.

Pedes 8. *Oculi* 8. 1. 6. *Chelæ* 2. frontales, parvae. *Palpi* 2. cheliformes, *Cauda* longa articulata, terminata aculeato mucrone. *Pectines* 2. subtus inter pectus et abdomen.

Fam. 1. *Oculis* 6.

2. - 8.

93. CHELIFER. Faust-Scorpion.

Pedes 8. *Ant.* nullæ. *Chelæ* 2. frontales, parvae. *Palpi* 2. cheliformes ad latera capitis. *Corpus* oblongum, ecaudatum.

94. ASTA-

94. ASTACVS. Ecrevisse.

Pedes 10. quorum anticum par chelatum. *Ant.* setaceae longae. *Oculi* 2. pedunculati, mobiles. *Palpi* 2. articulati. *Thorax* cylindrico-convexus. *Cauda* extensa, terminata laminis foliacéis.

Fam. 1. *thorace* laevi. l. inermi.

2. spinoso l. muricato.

3. *Parafacici* in testis inhabitantes.

95. CANCER. Crabæ.

Pedes 10. (rarius 8:) quorum anticum par chelatum. *Ant.* setaceae breves. *Oculi* 2. pedunculati, mobiles. *Palpi* 2. articulati. *Thorax* latus, planiusculus. *Cauda* triangula l. ovata, recurvata et corpori appressa.

Fam. 1. *thorax* laevis margine integro.

2. dentato.

3. supra spinosus.

96. MONOCVVS. Monocle.

Pedes ramosi, natatorii. *Bracia* 2. articulata, ramosa. *Corpus* testa bivalvi conchiformi. *Oculi* capitis congesti, unicum mententes. *Cauda* furcata plerisque.

Fam. 1. *Braciis* ramosis extra testam.

2. intra testam.

3. simplicibus extra testam.
Cauda furcata exserta.

4. *Cauda* simplici recta ad apicem corporis, exserta.

97. SQIL.

97. SQVILLA. *Squille.*

Pedes 14, primum par chelis adactylis. *Ant.* 4.
setaceae. *Cauda* nulla vel laminis folia-
ceis sub caudâ.

98. ONISCVS. *Cloperte.*

Pedes 14. *Oculi* 2. reticulati. *Ant.* 2. filiformes,
fractæ. *Corpus* ovatum, articula-
tum.

99. SCOLOPENDRA. *Scolopendre.*

Corpus depresso, articulatum. *Pedes* nume-
rosi totiderū utrinque quot segmenta cor-
poris. *Ant.* setaceæ, *Oculi* plures, di-
stincti, hemisphaerici. *Dentes* 2, curvati.
Palpi 2. articulati sub capite.

100. IVIVS. *Iule.*

Corpus cylindricum, articulatum. *Pedes* nu-
merosi, segmentis utrinque duplo plures.
Ant. filiformes, breves. *Oculi* 2. reticu-
lati. *Dentes* 2.

SPECIES.

1. PAPILIO.

Fam. 1.

1. *P. canicularis*, alis angularibus citrinis, macula rotunda aurantiaca notatis. T. 1. p. 132. t. 15. f. 1 — 9. T. 2. p. 182.

P. Rhamni. Linné Syst. Nat. ed. 12. p. 765.

2. *P. nigro-nervosus*, albus, nervis alarum nigris. T. 1. p. 235. t. 14. f. 13 — 19. T. 2. p. 182.

P. Crataegi. L. S. N. p. 758.

3. *P. Argus marginatus*, alis coeruleis margine nigro, subtus cinereo-coeruleiscentibus nigro-punctatis. T. 1. p. 288. t. 4. f. 9 — 15. T. 2. p. 182.

P. Argiolus. L. S. N. p. 790.

4. *P. candidus*, alis ovatis albis, macula superiorum nigrescente in nonnullis individuis. T. 2. p. 183. t. 1. f. 1.

P. Sinapis. L. S. N. p. 760.

Fam. 2.

5. *P. Reginæ*, alis flavis maculis lineisque nigris, inferioribus caudatis serie macularum coerulearum. T. 2. p. 185. t. 1. f. 2. 3.

P. Machaon. L. S. N. p. 750.

6. *P. alpicola*, albus nigro-maculatus, alis inferioribus ocellis quatuor, iride rubra, extus nigra: pupilla alba. T. 1. p. 282. t. 18. f. 8 — 13. T. 2. p. 136.

P. Apollo. L. S. N. p. 754.

Fam. 3.

Fam. 3.

7. *P. Virgula*, alis supra fulvis lineola nigra, infra viridescentibus maculis quadratis albis. T. 2. p. 189. t. 1. f. 4. 5.

P. Comma. L. S. N. p. 793.

8. *P. Matuse*, alis fusco-nigricantibus maculis punctisque albis. T. 2. p. 189.

P. Malvae. L. S. N. p. 795.

Fam. 4.

9. *P. Morio*, alis angulatis obscure rufo-fuscis, limbo albo-flavescente serieque macularum coerulescentium. T. 1. p. 305. t. 21. f. 1 — 9. T. 2. p. 192.

P. Antiopa. L. S. N. p. 776.

10. *P. Amiralis*, alis angulatis nigris, limbo rubro, superioribus albo-maculatis. T. 1. p. 310. t. 22. f. 1 — 5. T. 2. p. 193.

P. Atalanta. L. S. N. p. 779.

11. *P. C. album*, alis profunde angulatis fulvis nigro-maculatis, inferioribus C. albo-notatis. T. 1. p. 298. t. 20. f. 1 — 10. T. 2. p. 193.

P. C. album. L. S. N. p. 778.

12. *P. margaritaceus medius*, alis dentatis fulvis nigro-maculatis, inferioribus subtus flavescentibus maculis 27. argenteis nonnullisque rufis. T. 2. p. 193. t. 1. f. 6 — 9.

P. Adippe. L. S. N. p. 786.

13. *P. argenticolor*, alis rotundatis fulvis nigro-maculatis, inferioribus subtus maculis 9. argenteis nonnullisque flavescentibus. T. 2. p. 197. t. 1. f. 10. 11.

P. Euphydryas. L. S. N. p. 786.

14. *P. flavo-maculatus*, alis dentatis fulvis nigro-maculatis, inferioribus subtus flavescentibus maculatis

◆◆◆◆◆

latis serieque punctorum violaceorum. T.
2. p. 198. t. 1. f. 12.

— 15. *P. Abacus*, alis rotundatis fulvis, radiis transversis nigris undulatis; inferioribus subtus exalbido-flavis nigro-punctatis, fasciis 2. fulvis abruptis. T. 2. p. 199. t. 1. f. 13
— 18.

P. Cinxia. L. S. N. p. 784.

16. *P. Satyrus*, alis fuscis transversim subundulatis, superiorum ocello unico supra tribus que subtus: inferiorum ocellis 7. subtus. T. 2. p. 202. t. 2. f. 1. 2.

P. Maera. L. S. N. p. 771.

17. *P. Pamphilus*, alis rotundatis pallide aurantiis limbo griseo, superioribus ocello unico, inferioribus subtus cinereis fascia exalbida. T. 2. p. 205. t. 2. f. 3.

P. Pamphilus. L. S. N. p. 791.

18. *P. Hero*, alis rotundatis pallide aurantiis, ocellis superiorum 2. inferiorum 6. fasciaque undulata exalbida omnium. T. 2. p. 206. t. 2. f. 4.

P. Hero. L. S. N. p. 793.

19. *P. Arcanius*, alis rotundatis, superioribus pallide aurantiis ocello unico, inferioribus fuscis ocellis 5. l. 6. fasciaque alba subtus. T. 2. p. 207. t. 2. f. 5. 6.

P. Arcanius. L. S. N. p. 791.

Fam. 5.

20. *P. Alexis*, alis dentatis fuscis fascia rufa, superioribus ocellis quatuor, inferioribus tribus. T. 2. p. 210. t. 2. f. 7. 8.

P. Ligea. L. S. N. p. 772.

21. *P.*

21. *P. Tristan*, alis rotundatis fuscis, subtus ocellis superiorum 3, inferiorum 5. T. 2.
p. 211. t. 2. f. 9, 10.

P. Hyperanthus. L. S. N. p. 768.

2. SPHINX.

Fam. 1.

22. *S. flavidæ*, longirostris, antennis clavatis, alis superioribus fusco-cinereis obscure radia-
tis: inferioribus pallide aurantiis. T. 2.
p. 226.

S. Stellatarum. L. S. N. p. 803.

23. *S. Musca*, longirostris, antennis clavatis, alis hyalinis nigranti-rufo-marginatis, cor-
pore pilis griseo-rufis flavisque tormentose.
T. 2. p. 227.

S. Fuciformis. L. S. N. p. 803.

24. *S. Vespa*, brevirostris, antennis clavatis, alis hyalinis fusco-marginatis, corpore nigro
cingulis flavis, thorace maculis binis flavis,
pedibus rufis. T. 2. p. 227. t. 2. f. 11.

S. Apiformis. L. S. N. p. 804.

25. *S. Tipula*, longirostris, antennis clavatis, alis hyalinis nigrō-fusco-marginalis, corpore nigro intifuris alternis margine flavis. T.
2. p. 230. t. 2. f. 12.

S. Tipuliformis. L. S. N. p. 804.

26. *S. Gulex*, longirostris, antennis clavatis, alis hyalinis nigro-fusco-marginatis, corpore nigro cingulo unicò fulvo. T. 2. p. 222.
t. 2. f. 13.

S. Culieiformis. L. S. N. p. 804.

Fam. 2.

27. *S. Pinastri*, longirostris, antennis prismaticis,
cinereo-fusca, alis postice albo-margina-

~~34~~

tis: superioribus lineis 3. nigris disci, thorace maculis 2. nigris longitudinalibus. T. 2. p. 234. t. 2. f. 14. T. 1. p. 169. t. 10. f. 1 — 4.

S. Pinastris. L. S. N. p. 802.

28. *S. Galii*, longirostris, antennis prismaticis, obscure viridis, alis superioribus vitta bidentata alba, inferioribus macula rubra. T. 2. p. 236. T. 1. p. 162. t. 8. f. 6 — 11.

Obs. Simillima *S. Euphorbiae* ad quam retulit à Linné in S. N. p. 802. sed Larva diversa.

29. *S. Porcus*, longirostris, antennis prismaticis, olivacea, alarum superiorum fasciis tribus obliquis roseis, inferioribus roseis basi nigris. T. 2. p. 236. T. 1. p. 154. t. 9. f. 1 — 9.

S. Elpenor. L. S. N. p. 801.

30. *S. Porcellus*, longirostris, antennis prismaticis, olivacea, alarum superiorum fascia maculisque binis roseis, inferioribus fuscis fascia olivacea. T. 2. p. 237.

S. Porcellus. L. S. N. p. 801.

31. *S. Ligustris*, longirostris, antennis prismaticis, alis superioribus fuscis cinereo-nebulosis, inferioribus abdomineque roseis nigro-fasciatis. T. 2. p. 238. T. 1. t. 1. f. 6 — 12.

S. Ligustris. L. S. N. p. 799.

Fam. 3.

32. *S. Populi*, brevirostris, antennis prismaticis, alis dentatis cinereis strigis undatis fuscis, inferioribus basi rufis, superioribus macula alba. T. 2. p. 243. T. 1. p. 148. t. 8. f. 1 — 5.

S. Populi. L. S. N. p. 797.

33. *S.*

33. *S. Semi-Pavo*, brevirostris, antennis prismatis, alis repandis: superioribus fuscis cinereo-nebulosis, inferioribus rubris ocello coeruleo nigroque. T. 2. p. 243. t. 3. f. 1 — 4.

S. ocellata. L. S. N. p. 796.

34. *S. Tiliae*, brevirostris, antennis prismaticis, alis angustis repandis testaceis maculis viridibus angulatis: inferioribus griseo-flavis. T. 2. p. 246. t. 3. f. 5 — 7.

S. Tiliae. L. S. N. p. 797.

3. ADSCITA.

35. *A. Aries*, antennis clavatis simplicibus, alis superioribus coeruleo-viridescentibus nitidis rubro-maculatis, inferioribus rubris. T. 2. p. 252. T. 7. p. 591. t. 44. f. 1 — 8.

Sphinx Filipendulae. L. S. N. p. 805.

36. *A. Turcosa*, antennis clavatis pectinatis, virid aurea nitens, alis inferioribus fuscis. T. 2. p. 255. t. 3. f. 8 — 10.

Sphinx Statices. L. S. N. p. 808.

4. PTEROPHORVS.

37. *Pt. albo-fasciatus*, alis fuscis fasciis albis: superioribus 2-inferioribus 3-fidis, fimbriatis. T. 2. p. 260. t. 4. f. 1 — 12.

Phalaena didactyla. L. S. N. p. 899.

38. *Pt. fuscus*, alis fuscis immaculatis: superioribus 2-inferioribus 3-fidis, fimbriatis. T. 2. p. 267. t. 3. f. 11. 12.

5. PHALENA.

Fam. 1. Sect. 1.

39. *Pb. pavunculus*, elinguis, antennis pectinatis, alis extensis cinereis fusco-undulatis ocelloque

loquè instructis. T. 2. p. 290. T. 1. p.
270. t. 19. f. 1 — 12.

Ph. pavonia. L. S. N. p. 810.

40. *Pb. paradoxus*, elinguis, antennis pectinatis, alis
planis ferrugineis macula alba; *foemina* ci-
nerea aptera. T. 2. p. 292. T. 1. p. 253.
t. 17. f. 1 — 18.

Ph. antiqua. L. S. N. p. 325.

41. *Pb. dispar*, elinguis, antennis pectinatis, alis
extensis albis nigrò-maculatis, *foeminae*:
fuscis lineis undatis nigris *maris*; pedibus
antennisque nigris *foeminae*. T. 2. p. 293.

Ph. dispar. L. S. N. p. 821.

Fam. I. Sect. 2.

42. *Pb. Folium siccum*, elinguis, antennis pectinatis,
alis reversis dentatis fusco-rufis cine-
reo-nebulosis albo-marginatis, striis trans-
versis undulatis nigrefcentibus. T. 2. p.
298. T. 1. p. 229. t. 14. f. 1 — 9.

Ph. ilicifolia. L. S. N. p. 813.

43. *Pb. tesseraria pratensis*, elinguis, antennis pectinatis,
alis reversis: *foeminae* fuscis fasciis 2.
obliquis flavis, *maris* exalbido-flavis fasciis
fuscis. T. 2. p. 299. T. 1. p. 216. t. 13.
f. 1 — 6.

Ph. cafreensis. L. S. N. p. 818.

44. *Pb. bicaudata*, elinguis, antennis pectinatis, alis
subreversis cinereis, fascia superiorum la-
tiore obscura. T. 2. p. 300. T. 1. p. 193.
t. 11. f. 18 — 21.

Ph. Crataegi. L. S. N. p. 823.

Fam. I. Sect. 3.

45. *Pb. erinacea*, elinguis, antennis pectinatis, alis
deflexis: superioribus fuscis rivulis albis,
inferi-

inferioribus rubris maculis nigris. T. 2.

p. 301. T. 1. p. 198. t. 12. f. 1 — 9.

Ph. Caja. L. S. N. p. 819.

46. Ph. *opacus*, elinguis, antennis pectinatis nigris, alis deflexis albis, pedibus nigro-anulatis. T. 2. p. 302. T. 1. p. 191. t. 11. f. 13 — 17.

Ph. Salicis. L. S. N. p. 822.

47. Ph. *Lepus*, elinguis, antennis pectinatis nigris, alis deflexis albis vel flavescensibus nigropunctatis, abdome flavo ferre quintuplici punctorum nigrorum. T. 2. p. 304. T. 1. p. 178. t. 11. f. 1 — 11.

Ph. *lubricipeda*. L. S. N. p. 829.

48. Ph. *Ramus siccus*, elinguis, antennis pectinatis subhorizontalibus erosis flavis, strigis 2. fuscis, thorace citrino. T. 2. p. 305. T. 1. p. 349. t. 10. f. 9 — 14.

Ph. *Alniaria*. L. S. N. p. 860.

49. Ph. *birtipennis*, elinguis, antennis pectinatis, alis subhorizontalibus canis villosis, punctis strigarum nigris. T. 2. p. 306. T. 1. p. 354. t. 22. f. 6 — 9.

Ph. *birtaria*. L. Faun. Suec. 1236.

50. Ph. *tubifex*, elinguis, antennis pectinatis, alis fusco-nigricantibus, foeminae nullis. T. 1. p. 306. t. 29. f. 19 — 22. t. 30. f. 22. 23. T. 2. p. 307. t. 3. f. 13. 14.

Fam. 1. Sect. 4.

51. Ph. *Zizzac trituberculata*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato, alis pallido fuscis cano-nebulosis: superioribus macula magna ovali nebula linea fusca obscuriore circumscripta. T. 2. p. 309. T. 1. p. 216. t. 6. f. 1 — 9.

Ph. Ziczae. L. S. N. p. 827.

52. *Pb. Ziczae quinquetuberculata*, elinguis, antennis pectinatis, thorace subcristato, alis fuscoc-nigricantibus: superioribus transversè ferrugineo-undulatis maculaque sulphurea ad basin. T. 2. p. 309. t. 4. f. 13 — 17.

53. *Pb. diura major*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato nigro-punctato, alis hirsutis cinereis nigro-punctatis nebulosisque. T. 1. p. 318. t. 23. f. 6 — 12. T. 2. p. 312.

Ph. Vinula. L. S. N. p. 815.

54. *Pb. diura minor*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato nigro-lineis flavis, alis canis lineis transversis undulatis nigris margine aurantio, nigro-punctatis. T. 2. p. 313. t. 4. f. 18 — 21.

55. *Pb. Lunula*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato flavo lineis rufis, alis superioribus albo-cinereis macula anguli exteriores flava. T. 1. p. 221. t. 13. f. 7 — 21. T. 2. p. 317.

Ph. bucephala. L. S. N. p. 816.

56. *Pb. porrecta alba*, elinguis, antennis pectinatis flavis, thorace cristato, alis cinereo-albis, lineis transuersis undatus fuscis cinereisque. T. 1. p. 243. t. 16. f. 7 — 20. T. 2. p. 317.

Ph. pudibunda. L. S. N. p. 824.

57. *Pb. porrecta cana*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato cano, alis superioribus strigis duabus nigris flavo-marginatis maculaque nigra, albo-marginata. T. 1. p. 261. t. 15. f. 12 — 15. T. 2. p. 318.

Ph. fascelina. L. S. N. p. 825.

58. *Pb.*

58. *Pb. Coryli*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato grifeo fuscoque striato, alis superioribus antice fuscis, postice cinereo-albis, macula ovali alba nigro-marginata.

T. 1. p. 265. t. 18. f. 1 — 7. T. 2, p. 319.

Ph. Coryli. L. S. N. p. 823.

59. *Pb. atticauda alba*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato macula rhombea nigro-fusca, alis cinerascentibus lineis 4. transversis albidis maculaque ferruginea.

T. 2. p. 319. t. 4. f. 22 — 26.

60. *Pb. atticauda grisea*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato macula ovali nigro-fusca, alis grifeo-fuscis ferrugineo-nebulosis, lineis transversis undulatis pallidis. T. 2. p. 322.

Ph. Anastomosis. L. S. N. p. 824.

61. *Pb. atticauda furcata*, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato macula ovali fusco-nigra, alis murinis lineis 4. transversis albidis puncto albo maculaque ferruginea.

T. 2. p. 323. t. 5. f. 1. 2.

Ph. curtula. L. S. N. p. 823.

Fam. 2. Sect. 1.

62. *Pb. delicatula*, spirilinguis, antennis pectinatis, thorace cristato, alis deflexis erosis griseis aurantio-nebulofis lineis punctisque a albis. T. 2. p. 332. t. 5. f. 3 — 5.

Ph. libatrix. L. S. N. p. 831.

63. *Pb. palpina*, spirilinguis, antennis pectinatis, thorace cristato, alis deflexis dentatis griseis, palpis elongatis forma proboscidis depressae. T. 2. p. 334. T. 1. p. 60. t. 4. f. 7. 8.

Ph. palpina. L. S. N. p. 1146.

C 4

64. *Pb.*

64. *Pb. lacertina*, spirilinguis, antennis pectinatis, thorace cristato, alis erofo-denticulatis deflexis flavo-griseis lineis 2. transversis fuscis punctoque nigrescente. T. 1. p. 340. t. 10. f. 5 — 8. T. 2. p. 331. t. 5. f. 6, 7.
Pb. lacertinaria. L. S. N. p. 860.

Fam. 2. Sect. 2.

65. *Pb. fusca trimaculata*, spirilinguis, antennis pectinatis, thorace cristato linea nigra, alis deflexis griseo-fuscis, maculis 3. ovalibus fusco-nigricantibus inferioribus albis. T. 2. p. 337. t. 5. f. 8.
66. *Pb. trifissis*, spirilinguis, antennis pectinatis, thorace cristato, alis deflexis integris fusco-nigricantibus margine exteriore albido-punctato. T. 2. p. 338. t. 5. f. 9.
67. *Pb. C. nigrum*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis deflexis integris griseis fusco-nebulosis C. nigro notatis. T. 2. p. 338. t. 5. f. 10.
68. *Pb. cinerea bisignata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis deflexis cinerascentibus nebulis striisque nigris maculis 2. ovatis albidis nigro-cinctis. T. 2. p. 339. t. 5. f. 11.
69. *Pb. Graminis*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis deflexis fusco-griseis, linea longitudinali ramosa alba maculisque 3. flavescentibus superiorum. T. 2. p. 340.
- Pb. Graminis.* L. S. N. p. 830.
70. *Pb. flava nigro-punctata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis deflexis rotundatis flavis nigro-punctatis, abdome nigro apice flavo. T. 2. p. 342. t. 5. f. 12.
- Pb. irrorella.* L. S. N. p. 885.

Fam.

Fam. 2. Sect. 3.

71. *Pb. fusca bistrigata*, spirilinguis, antennis sub-pectinatis, alis erosis planis fusco-griseis strigis 2. undulatis nigricantibus albo-marginatis punctoque disci nigro. T. 1. p. 378. t. 25. f. 1 — 7. T. 2. p. 343.

Ph. bidentata. L. Faun. Suec. 1255.

72. *Pb. atomaria*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis dentatis planis aurantiis punctis lineolisque transversis griseis numerosis. T. 2. p. 344. t. 5. f. 14.

Ph. atomaria. L. S. N. p. 862?

Fam. 2. Sect. 4.

73. *Pb. alba nigro-punctata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis albis maculis punctisque numerosis nigris, thorace lineis nigris. T. 2. p. 344. t. 5. f. 15 — 18. T. 1. p. 344. t. 17. f. 19 — 22.

Ph. betularia. L. S. N. p. 862.

74. *Pb. grisea fasciata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis cinerascentibus fasciis 2. fuscis repandis albo-marginatis lineaque alba fulminata. T. 2. p. 348.

Ph. fasciaria. L. S. N. p. 862.

75. *Pb. olivaceo-fasciata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis cinereo-fuscis, fascia undulata olivacea, subtus cinereo-flavis. T. 2. p. 350. t. 5. f. 19.

Ph. pulveraria. L. S. N. p. 862?

76. *Pb. fuscov-fasciata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis cinereis fascia undulata fusco-ferruginea nigro-marginata, subtus carneis. T. 2. p. 351. t. 5. f. 13.

77. *Pb. cristata albo-lineata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis rufescensibus: infra-

rioribus punctis olivaceis lineaque longitudinali alba. T. 2. p. 351. t. 5. f. 20.

Ph. piniaria. L. S. N. p. 861.

78. *Pb. cristata flavo-punctata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis fuscis, punctis maculisque flavis, subtus flavis punctis striisque fuscis. T. 2. p. 353. t. 5. f. 21.

79. *Pb. falcata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis horizontalibus falcatis pallide ochraceo-fuscis linea, fascia obliqua maculaque fuscis. T. 2. p. 353. t. 6. f. 1. T. 1. p. 333. t. 24. f. 1 — 9.

Ph. falcataria. L. S. N. p. 859.

80. *Pb. parvula*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis albis linea undulata dupli nigrescente ad marginem posticum maculisque binis repandis ferrugineo-variegatis ad marginem exteriorem. T. 2. p. 355. t. 6. f. 2.

81. *Pb. testacea*, spirilinguis, antennis, pectinatis, alis planis : superioribus testaceis fascia pallida, inferioribus albidis. T. 2. p. 356. t. 6. f. 3.

82. *Pb. Alchemillae* spirilinguis, antennis pectinatis alis planis griseo-fuscis, fasciis binis lineaque fulminata albis in superioribus. T. 2. p. 357. T. 1. p. 358. t. 22. f. 10 — 16.

Ph. Alchemillata. L. S. N. p. 869.

83. *Pb. parallelo-lineata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis albo-cinerascentibus : superioribus linea 2. parallelis fuscis. T. 2. p. 357. t. 6. f. 4.

84. *Pb. longipalpis*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis albo-cinerascentibus linea 2. transversis fuscis, palpis longitudine anten-

antennarum. T. 2. p. 358. T. 1. p. 59.
t. 5. f. 1 — 3.

Ph. tentacularis. L. S. N. p. 881.

85. *Pb. cinerea undulata*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis cinereis fasciis 2. duplicatis undulatis nigris maculaque albida superioribus, cingulo abdominis albo. T. 2. p. 358. t. 6. f. 5.

Fam. 2. Sect. 5.

86. *Pb. straminea*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis pallide stramineis fascia saturatiore albo-marginata: inferioribus angulatis. T. 2. p. 360. t. 6. f. 6.

87. *Pb. suspensa*, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis exalbido-cinerascensibus, lineis 2. transversis nigro-punctatis ocelloque ferrugineo: inferioribus angulatis. T. 2. p. 360. t. 6. f. 7.

Ph. pendularia. L. Faun. Suec. 1244.

88. *Pb. semipectinata*, spirilinguis, antennis semipectinatis, alis planis virescentibus lineis 2. transversis undulatis albis: inferioribus angulatis. T. 2. p. 362. t. 6. f. 8.

Ph. vernaria. L. S. N. p. 858.

Fam. 3.

89. *Pb. bumuli*, elinguis, antennis brevibus filiformibus, *mare* albo, *foemina* ochracea. T. 1. p. 487. t. 7. f. 1 — 11. T. 2. p. 366.

Ph. Humuli. L. S. N. p. 833.

90. *Pb. clavipes*, elinguis, antennis brevibus filiformibus, alis *maris* rufo-fulvis maculis niveis, *foeminæ* fuscis fasciis fulvis. T. 7. p. 596. t. 44. f. 14. 15. T. 2. p. 366. T. 1. p. 495. t. 7. f. 12 — 15.

Ph. Hecta. L. S. N. p. 833.

91. *Pb.*

91. *Pb. fusto-nebulosa*, elinguis, antennis filiformibus brevissimis, alis albido-cinereis maculis fuscis nebulosis. T. 7. p. 598. t. 44. f. 16.

Fam. 4.

92. *Pb. Cossus* elinguis, antennis filiformibus lamelatis, thorace crista fascia nigra collarique albo, alis cinereis lineolis numerosis transversis nigris. T. 2. p. 368. T. 1, p. 32. t. 2. f. 9. 10.

Ph. Cossus. L. S. N. p. 827.

93. *Pb. pinguedinis*, elinguis, antennis filiformibus, palpis elongatis, alis planis canis striis maculisque fuscis et nigris. T. 2. p. 371. t. 6. f. 9 — 12.

Ph. pinguinalis. L. S. N. p. 882.

94. *Pb. tubulosa*, elinguis, antennis filiformibus, alis griseo-fuscis nitidis, capite flavo, *femina* aptera. T. 2. p. 375. t. 6. f. 13 — 21. E larva tinea Lichenum.

95. *Pb. trigano-tubulosa*, elinguis, antennis filiformibus, *femina* aptera. T. 2. p. 380. t. 11. f. 1 — 8. E larva tinea murorum tubum prismaticum e frustulis lapidum conficiente. An mas quoque apterus? videtur.

Ph. lichenella. L. S. N. p. 899.

Fam. 5. Sect. 1.

96. *Pb. Noctua major*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis incumbentibus fuscis vel griseis: inferioribus flavis fascia marginali nigra. T. 2. p. 399. T. 1. p. 109. t. 5. f. 17. 18.

Ph. pronuba. L. S. N. p. 842.

97. *Pb. Lignum secum*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis oblongis invicem incumbenti.

bentibus; colore ligni putridi, supra dorsum castaneis, thorace cristato trituberculato.

T. 2. p. 401. t. 7. f. 1 — 5.

Ph. exsoleta. L. S. N. p. 849.

98. *Pb. murina*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis invicem incumbentibus murinis maeulis 4, nigris: inferioribus subalbidis. T. 2. p. 406. t. 6. f. 22.

99. *Pb. Cerefolii*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis invicem incumbentibus fusco-griseis nitidis albo-bimaculatis. T. 2. p. 406. T. 1. p. 424. t. 29. f. 1 — 8.

Ph. Heracleana. L. S. N. p. 880?

100. *Pb. Heraclei*; spirilinguis, antennis filiformibus, alis invicem incumbentibus griseis nigro-striatis, palpis recurvis, pedibus posticis hirsutis. T. 2. p. 407.

Obs. vix *Heracleana* Linnei est; praecedens etiam palpos habet recuruos.

Fam. 5. Sect. 2.

101. *Pb. viridis bilineata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis: superioribus viridibus strigis binis obliquis flavescientibus, inferioribus albis. T. 2. p. 410. T. 1. p. 58. t. 3. f. 1 — 3.

Ph. prasiparia. L. S. N. p. 875.

102. *Pb. varia albo-maculata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis griseis aurantio-maculatis, maeulis binis albis utriusque. T. 2. p. 410. t. 6. f. 23.

103. *Pb. lanata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis albis punctis maculisque albiss. T. 2. p. 411. T. 1. p. 210. t. 10. f. 17.

Ph. leporina. L. S. N. p. 838.

104. *Pb.*



104. *Pb. cinerea bimaculata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis cinereo-nigricantibus striis undatis nigris maculisque binis albis ad marginem interiorem. T. 2. p. 411. T. 1. p. 185. t. 9. f. 14 — 23.

Ph. Rumicis. L. S. N. p. 852.

105. *Pb. viridis maculata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis viridescentibus fasciis undulatis albis nigrisque, maculis 2. albis disci. T. 2. p. 412. t. 6. f. 24.

106. *Pb. remigata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis: superioribus cinereo-nigricantibus maculis 2. exalbidis lineisque nigris, inferioribus albis. T. 2. p. 412. T. 1. p. 280. t. 11. f. 25 — 28.

107. *Pb. macrocephala*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis cinereis, strigis undatis nigris, stigmae submarginali exalbido. T. 2. p. 413. t. 7. f. 6 — 9.

108. *Pb. nervosa*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis griseis, lineis longitudinalibus albidis. T. 2. p. 415. t. 7. f. 10 — 14.

109. *Pb. hepatica*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis cinereo-hepaticis nitidis strigis 2. undulatis maculisque 2. nigricantibus. T. 2. p. 417. t. 7. f. 25.

110. *Pb. ochro-cephala*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis cinereis nitidis, punctis tribus disci, capite luteo. T. 2. p. 418. t. 7. f. 15.

Ph. Tragopogonis. L. S. N. p. 855.

111. *Pb. Hippophaës*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis fusco-rufescensibus nitidis

tidis fascia ferruginea punctaque nigro. T.

2. p. 419. t. 7. f. 16.

112. *Pb. ferruginea fasciata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis fusco-ferrugineis macula alba et flava fasciaque undulata alba. T. 2. p. 420. t. 7. f. 17.

Ph. L. Faun. Suec. 2290.

Obs. maculae et fascia in foeminis griseae.

113. *Pb. sulphureo-maculata*, spirilinguis, antennis filiformibus ferrugineis, alis deflexis canis strigis nigris maculisque a. sulphureis. T. 2. p. 422. t. 7. f. 18. 19.

114. *Pb. s. graecum*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis canis violaceo-nebulosiss fasciis nigris undulatis a. sulphureo scriptis. T. 2. p. 423. t. 7. f. 20 — 23.

115. *Pb. Stratiotes*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis cinereis l. fuscis punto albo nigro-marginato: inferioribus albis strigis nigris. T. 2. p. 426. T. 1. p. 517 t. 37. f. 1 — 18.

Ph. Stratiotata. L. S. N. p. 873.

116. *Pb. flavo-fusca*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis pallide flavis nitidis strigis binis punctatis fuscis, margine postice fusco. T. 2. p. 426. t. 7. f. 24.

Emm. 5. Sect. 3.

117. *Pb. meticulosa*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis erosis griseis fusco-nebulosiss macula trigona carnica viridi-marginata. T. 2. p. 427. T. 1. p. 240. t. 5. f. 13 — 14.

Ph. meticulosa. L. S. N. p. 845.

118. *Pb. aureo-fasciata*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis fu-
sco

seo-griseis fasciis q. aureo-viridulis. T. 2.
p. 483.

Ph. Chrysitis. L. S. N. p. 843.

119. *Pb. aureo-argentea*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis fuscis aureo mixtis, maculis 3. argenteis. T. 2. p. 429. Act. R. Ac. Scient. Suec. 1748. p. 210. t. 6. f. 3. 4.

Ph. Festucae. L. S. N. p. 845.

120. *Pb. flava strigata*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis flavis strigis 4. annulisque 2. oblongis ferrugineis. T. 2. p. 429. t. 7. f. 25.

Ph. Citrago. L. S. N. p. 857.

121. *Pb. Linariae*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace bicristato, alis deflexis exalbido-griseo-nebulosis strigis maculisque marginis exterioris nigris. T. 2. p. 430. t. 8. f. 1 — 6.

122. *Pb. Aprilis*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis fusco-nigricantibus albido-viriduloque-nebulosis macula ovali viridi-fusca albo-nigroque marginata. T. 2. p. 434. T. 1. p. 113. t. 3. f. 19 — 23.

Ph. Aprilina. L. S. N. p. 847.

123. *Pb. Filicis*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis nigro-cinereae que fasciatis, maculis 2. cinereis tertiaque cum striga flavidis. T. 2. p. 435. t. 7. f. 26.

124. *Pb. lateritia*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato angulato, alis deflexis lateritiis maculis albo-griseis: duabus ferrugineis strigisque nigris. T. 2. p. 436. t. 8. f. 7 — 9.

125. *Pb. Brassicae*; spirilinguis; antennis filiformibus; thorace cristato; alis deflexis fusco-griseis strigis undatis nigris; macula grisea. aliaque griseo-alba strigaque albida. T. 2. p. 438.

Ph. Brassicae. L. S. N. p. 852.

126. *Pb. albo fulminata*; spirilinguis; antennis filiformibus; thorace cristato; alis deflexis ferrugineis maculis strigisque fuscis; nigris griseisque; linea marginis postici fulminata alba. T. 2. p. 440.

Ph. Pisi. L. S. N. p. 854.

127. *Pb. griseo-reticulata*; spirilinguis; antennis filiformibus, thorace cristato angulari, alis deflexis fuscis rivulis reticulatis griseis. T. 2. p. 441. t. 7. f. 27.

128. *Pb. Conspicillum*; spirilinguis; antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis fusco-canis lineis 2. curvis maculaque triangula nigris. T. 2. p. 442. T. 1. p. 123. t. 6. f. 13 — 23.

Ph. triplasia. L. S. N. p. 854.

Fam. 5. Sect. 4. Art. 1:

129. *Pb. flavicauda*, spirilinguis; antennis filiformibus; alis planis albis maculis ovatis nigris; thorace anoque flavis. T. 2. p. 445. T. 1. p. 418. t. 28. f. 12 — 19.

Ph. urticata. L. S. N. p. 873.

130. *Pb. Sambuci*, spirilinguis; antennis filiformibus; alis planis fusco-griseis maculis albocavidis nitidis. T. 2. p. 446.

Fam. 5. Sect. 4. Art. 2:

131. *Pb. sulphurea taudata*, spirilinguis; antennis filiformibus; alis extensis stramineis strigis D fulvibus

◆◆◆◆◆

duabus luteis: inferioribus angulatis pun-
ctis 2. fuscis. T. 2. p. 447.

Ph. Sambucaria. L. S. N. p. 860.

132. **Pb. alba trilineata,** spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis albis: superioribus strigis 3, inferioribus 2. griseis. T. 2. p. 448. t. 8. f. 10 — 12.

Ph. pusaria. L. S. N. p. 864.

133. **Pb. albida biundulata,** spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis exalbidis griseo-nebulosis strigis binis fusco-nigricantibus. T. 2. p. 449. t. 8. f. 13 — 16.

134. **Pb. hyemalis,** spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis griseo-fuscis, strigis obscurioribus; *foemina* aptera. T. 2. p. 452. t. 8. f. 17. 18. T. 1. p. 36c. t. 24. f. 11 — 24.

Ph. brunata. L. S. N. p. 874.

135. **Pb. hastata,** spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis albis utrinque fasciis undulatis maculisque excisis nigris. T. 2. p. 455. t. 8. f. 19. 20.

Ph. hastata. L. S. N. p. 870.

136. **Pb. violacea nigro-strigata,** spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis violaceis griseo-albidoque mixtis, strigis tribus angulatis nigris. T. 2. p. 457. t. 9. f. 1 — 5.

137. **Pb. sexalata,** spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis albido-griseis fasciis tribus dentatis flavis punctoque nigro, *maris* tertio alarum pare. T. 2. p. 459. t. 9. f. 6 — 9.

138. **Pb. Tinea Pini** spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis griseis, strigis undulatis nigris griseisque, puncto nigro fasciaque ferruginea. T. 2. p. 462. t. 9. f. 10 — 12.

Fam.

Fam. 5. Sect. 5.

139. *Pb. argentea convoluta*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis supra albo-argenteis subtus fusco-griseis. T. 2. p. 464.

Ph. pratella. L. S. N. p. 886.

140. *Pb. argenteo-lineata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis flavescensibus lineis argenteis, palpis elongatis. T. 2. p. 465.

Ph. pascuella. L. S. N. p. 886.

141. *Pb. albo-flava*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis albido-flavis: inferioribus subtus ochraceis. T. 2. p. 466.

142. *Pb. convoluto-plana*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis albo-cinereis strigis 2. obliquis atomisque fuscis. T. 2. p. 466.

Ph. sociella. L. S. N. p. 883.

143. *Pb. cana nigro-punctata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis canis strigis 2. undulatis punctoque intermedio nigris. T. 2. p. 467.

Ph. colonella. L. S. N. p. 883.

Fam. 5. Sect. 6.

144. *Pb. Pallium reticulatum*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombaeis fuscis maculis strigisque obscuris: inferioribus supra nigrescentibus, palpis recurvis. T. 2. p. 468. T. 1. p. 403. t. 27. f. 1 — 8. II — 14.

Ph. Rosana. L. S. N. p. 876.

145. *Pb. Pallium fuscum*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombaeis fusco-caestaneis, fascia obliqua obscura, palpis porrectis. T. 2. p. 468. T. 1. p. 409. t. 27. f. 9. 10.

146. *Pb. Pallium luteum*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis luteis, strigis obliquis nebulisque fuscis. T. 2. p. 459.
147. *Pb. Pallium aurantium*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis aurantiis nitidis strigis 4. fusco-argentaeis. T. 2. p. 469.
- Ph. Bergmanniana*. L. S. N. p. 878.
148. *Pb. Pallium excisum*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis margine postice interiore exciso: obscure fuscis striga inflexa flavescente. T. 2. p. 470. T. 1. p. 413. t. 28. f. 1 — II.
149. *Pb. Pallium cristatum*, spirilinguis; antennis filiformibus, thorace cristato, alis rhombeis fusco-olivaceis annulis 2. ovatis strigisque 3. griseis. T. 2. p. 470. t. 9. f. 16 — 19.
150. *Pb. Pallium fasciatum*, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis rhombeis albis canisve, fascia undulata fusca maculaque lunulari ferruginea. T. 2. p. 472. t. 10. f. 1 — 4.
151. *Pb. Pallium viride*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis subdeflexis: superne viridibus margine albis, subtus totis niveis. T. 2. p. 475. t. 10. f. 5 — 9.
- Ph. clorana*. L. S. N. p. 876.
152. *Pb. Pallium transparens*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis griseis transparentibus: superioribus strigis 2. undulatis fuscis. T. 2. p. 478.
- Ph. mundana*. L. Faun. Suec. 1343.
- Fam. 5. Sect. 7.*
153. *Pb. viginti punctata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus albo-cinereis punctis

punctis 20. nigris. T. 2. p. 479. t. 10. f. 10 — 16.

154. *Pb. argyria*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus argenteo-albis: superioribus subtus testaceis, ano flavo. T. 2. p. 483. t. 10. f. 17 — 19.

155. *Pb. rhombo-maculata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus pallide fuscis macula communis subrhombica; *foeminis* alba *maribus* fusca. T. 2. p. 485. T. 1. p. 410. t. 28. f. 25 — 30.

Ph. Solandriana. L. S. N. p. 878.

156. *Pb. dimidio-alba*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus dimidiato-fuscis albisque, thorace cristato. T. 2. p. 485.

157. *Pb. dimidio-alba maculata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus obscure fuscis postice albis maculis fuscis, thorace laevi. T. 2. p. 486. T. 1. p. 501. t. 34. f. 1 — 5.

Ph. Cynosbatella. L. S. N. p. 887?

Obf. Praecedens potius *Pb. Cynosbatella* Linn. erit.

158. *Pb. phryganoides*, spirilinguis, antennis filiformibus corpore triplo longioribus, alis pendentibus nigro-aureis fascia lutea violaceo-marginata. T. 2. p. 487. T. 1. p. 541. t. 32. f. 13 — 19.

Ph. Degeerella. L. S. N. p. 895.

159. *Pb. nigra cristata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus nigris, strigis 3. undulatis cinereis cristaque transversa. T. 2. p. 487. T. 1. p. 421. t. 28. f. 20 — 23.

160. *Pb. strobilorum Pini major*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus elongatis

◆◆◆◆◆

cinereis, fasciis 2. nigro-marginatis lunulaque cinereis. T. 2. p. 487. t. 9. f. 13. 14.

161. *Pb. strobilorum Pini minor*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus fusco-nigricantibus strigis canis. T. 2. p. 490. t. 9. f. 5.

162. *Pb. Gallarum Pini*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus cinereis, strigis nebulisque nigris. T. 2. p. 491. T. 1. p. 473. t. 3. f. 1 — 13.

Pb. resinella. L. S. N. p. 892.

163. *Pb. gemmarum Pini*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus griseis maculis nebulisque fuscis, palpis brevibus. T. 2. p. 491. T. 1. p. 500. t. 22. f. 26. 27.

Fam. 5. Sect. 8.

164. *Pb. Caprifoliae*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis fuscis, linea longitudinali flava. T. 2. p. 493.

165. *Pb. Hesperidis*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis griseo-albis, linea undulata fusca. T. 2. p. 494. T. 1. p. 394. t. 26. f. 1 — 16.

Pb. porrectella. L. S. N. p. 894.

166. *Pb. duodecim cristata*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis subelevatis griseis, fasciis 4. nigricantibus cristulisque 6. nigris. T. 2. p. 494. T. 1. p. 498. t. 22. f. 17 — 24.

Pb. dodecella. L. S. N. p. 892.

167. *Pb. pelicaria Pyri*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis cinereo-canis, capite albo. T. 2. p. 494. T. 1. p. 388. t. 25. f. 8 — 16.

168.

168. *Pb. chrysargyria Alni*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis aureis argenteo-maculatis, postice puncto nigro. T. 2. p. 495. T. 1. p. 440. t. 31. f. 1 — 12.

Ph. Rayella. L. S. N. p. 898.

169. *Pb. chrysargyria Pomi*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis aureis argenteo-maculatis impunctatis. T. 2. p. 495. T. 1. p. 432. t. 30. f. 1 — 12.

170. *Pb. grisea Rosae*, spirilinguis; antennis filiformibus, alis angustis elevatis griseis e larva subcutanea Rosae. T. 2. p. 495. T. 1. p. 446. t. 30. f. 13 — 20.

171. *Pb. maculata Frangulae*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis albis maculis fuscis. T. 2. p. 496. T. 1. p. 459. t. 32. f. 1 — 12.

172. *Pb. bicristata Chaerophylli*, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis griseo-albis nigro-nebulosis crista 2. marginis interioris. T. 2. p. 496. T. 1. p. 455. t. 29. f. 9 — 18.

6. PHRYGANEAE

Fam. 1.

173. *Pb. pellucida*, antennis longitudine corporis, alis pellucidis postice nigro-nebulosis, pedibus griseis. T. 2. p. 526. t. 12. f. 1 — 19.

174. *Pb. bipunctata*, antennis longitudine corporis, alis cinereo-testaceis maculis cinereis linea longitudinali nigra punctisque 2. albis. T. 2. p. 527. t. 13. f. 1 — 17.

Ph. grandis. L. S. N. p. 909.

175. *Pb. nigro-punctata*, antennis longitudine corporis, grisea punctis maculisque nigricantibus:

tibis : alis superioribus posticé rotundatis angulo exteriore linea nigra. T. 2. p. 543. t. 13. f. 18 — 21.

176. *Pb. punctato-lineata*, antennis longitudine corporis, flavo-fusca, pedibus ochraceis, alis superioribus macula alba lineisque 2. nigro-griseoque-punctatis. T. 2. p. 548. t. 14. f. 4 — 5.

Fam. 2.

177. *Pb. nigra fasciata*, antennis corpore duplo longioribus, alis maris nigris fasciis testaceis, foeminae fusciis macula una vel altera flava. T. 2. p. 568. t. 15. f. 1 — 9.

Pb. bimaculata. L. S. N. p. 909.

178. *Pb. nigro-nervosa*, antennis nigris corpore duplo longioribus, palpis longis, alis fusco-testaceis nervis nigris, oculis ferrugineis. T. 2. p. 578. t. 15. f. 19. 20.

179. *Pb. nigro-coerulea*, antennis corpore duplo longioribus, palpis longis villosis, alis coeruleo-atris nitidis, oculis rubris. T. 2. p. 580. t. 15. f. 21 — 23.

Pb. nigra. L. S. N. p. 909.

Larvae obscurae hujus generis:

T. 2. p. 549. t. 14. f. 6 — 12,
p. 557. t. 14. f. 15. 16.
p. 568. t. 15. f. 8 — 10,
p. 570. t. 15. f. 11 — 14,
p. 571. t. 15. f. 15 — 18.

Gordius aquaticus Phryganearum laryas perforans
p. 553. t. 14. f. 13, 14;

7. EPHEMERA.

180. *E. communis*, fusca, abdomine luteo, maculis triangulis nigris, alis fusco-maculatis, cauda tri-

trifeta. T. 2. p. 621, t. 16, f. 1 — 14.
t. 17, f. 1 — 10.

E. vulgata. L. S. N. p. 906.

181. *E. albipennis*, nigra, thoracis lateribus fuscis,
alis albis pellucidis immaculatis, cauda tri-
feta. T. 2. p. 646, t. 17. f. 1 — 16.

E. vespertina. L. S. N. p. 906.

182. *E. cincta*, fusca, abdominis medio cingulo al-
bo, oculis 4. *maris*, cauda trifeta. T. 2.
p. 650, t. 17. f. 17. 18.

Fam. 2.

183. *E. fusco-grisea*, nigro-fusca, abdomine subtus
griseo, alis pellucidis nigro-nervosis, cauda
bifeta. T. 2. p. 652, t. 18. f. 1 — 4.

184. *E. diptera*, alis duabus griseo-fusca, abdomine
lineolis rubris, cauda bifeta, alarum *fœ-
minæ* margine exteriore fusco maculis al-
bis. T. 2. p. 656. t. 18. f. 5 — 10.

E. diptera. L. S. N. p. 907.

8. LIBELLULÆ.


Fam. 1.

185. *L. flavipennis*, fusca, capite globoso, thorace
lineis 4. obliquis flavis, alis subluteis, ab-
domine cylindrico. T. 2. p. 678. t. 20. f.
5 — 16.

L. grandis. L. S. N. p. 903.

186. *L. viridi-cincta*, nigra, capite globoso, tho-
race maculis abdomineque cingulis viridi-
bus. T. 2. p. 685. t. 21. f. 1 — 2.

L. forcipata; L. S. N. p. 903.



187. *L. aenea*, viridi-aenea nitida, capite globoſo, pedibus nigris, abdome medio incrassato. T. 2. p. 687. t. 19. f. 1 — 18.
188. *L. chinensis*, capite globoſo, alis posticis basi macula magna fusca flavo-cincta venisque flavis. T. 3. p. 556. t. 26. f. 1.
- L. carolina*. L. S. N. p. 904.
189. *L. trimaculata*, capite globoſo, alis albis me- dio macula basi fascia longitudinali fusca. T. 3. p. 556. t. 26. f. 2. 3.
190. *L. unifasciata*, capite globoſo, alis albis fascia transversa fusca. T. 3. p. 557. t. 26. f. 4.
- L. umbrata*. L. S. N. p. 903.
191. *L. unimaculata*, capite globoſo, alis albis basi macula magna fusca. T. 3. p. 558. t. 26. f. 5.
192. *L. marginata*, capite globoſo, alis dimidio fa- scis albisque fusco-cinctis. T. 3. p. 558. t. 26. f. 6.
- L. dimidiata*. L. S. N. p. 903.
193. *L. violacea*, capite globoſo, alis violaceo-fu- scis, fascia transversa linearis alba. T. 3. p. 559. t. 26. f. 7.
- L. fasciata*. L. S. N. p. 903.
- Fam. 2.
194. *L. coeruleo-maculata*, capite ovali, viridi-ni- tens maculis mari coeruleis, alis hyalinis, oculis viridibus. T. 2. p. 701. t. 21. f. 3 — 22.
- L. Puella*. L. S. N. p. 905.
9. HEMEROBEVS.
195. *H. cornutus*, maxillis corniformibus porrectis capite longioribus, alis griseo-fuscis albo-punctatis. T. 3. p. 559. t. 27. f. 1 — 2.
- Raphi-

- Raphidia cornuta. L. S. N. p. 916.
196. *H. pectinicornis*, fuscus, pedibus testaceis, antennis pectinatis nigris, alis griseo-fuscis: nervis nigro-punctatis. T. 3. p. 563. t. 27. f. 3.
- H. pectinicornis*. L. S. N. p. 911.
197. *H. viridis*, viridis nigro-maculatus, nervis alarum nigris. T. 2. p. 708. t. 22. f. 1 — 3.
- H. Chrysops*. L. S. N. p. 912.
198. *H. griseus*, griseus fusco-maculatus, alis albis nervis confertim fusco-punctatis pilosique. T. 2. p. 711. t. 22. f. 4 — 7.
- H. hirtus*. L. S. N. p. 912.
199. *H. niger*, niger hirtus, alis pallide fuscis, pedibus flavo-fuscis. T. 2. p. 713. t. 22. f. 8 — 13.
200. *H. Phalaenoides*, fusco-ferrugineus, thorace angulato, alis magnis latis postice excisis. T. 2. p. 714. t. 22. f. 12. 13.
- H. Phalaenoides*. L. S. N. p. 912.
201. *H. aquaticus*, niger, thoraee magno depresso, alis pallide fuscis nervis nigris. T. 2. p. 716. t. 22. f. 14 — 18. t. 23. f. 1 — 15.
- H. lutarius*. L. S. N. p. 913.
202. *M. immaculatum*, alis hyalinis macula albida, corpore fusco maculis griseis. T. 3. p. 564. t. 27. f. 8.
- M. Formicalynx*. L. S. N. p. 914.
203. *M. maculatum*, niger, collaris luteo, alis griseis nigro-maculatis nervisque flavis. T. 3. p. 565. t. 27. f. 9.
- Hemerobius speciosus*. L. S. N. p. 912?

11. PER-

II. PERLA.

204. *P. cinerea*, fusco-nigricans, corpore elongato, alis longis cinereis nervis fuscis. T. 2. p. 730. t. 23. f. 16 — 18. t. 24. f. 1. 2.

205. *P. fusca*, fusca, pedibus rufis, antennis filiformibus, alis fuscis corpore duplo longioribus. T. 3. p. 567. t. 27. f. 4. 5.

Hemerobius testaceus. L. S. N. p. 912.

206. *P. nasuta*, flava, capite nasuto, alis hyalinis albis margine fuscis corpore duplo longioribus. T. 3. p. 568. t. 27. f. 6. 7.

Hemerobius marginalis. L. S. N. p. 912.

Obs. utrum hic relinquenda 205. et 206. vel *Tenomis* generi inferenda dubius haeret generosissimus Auctor. Conf. Tom. 7. p. 50.

207. *P. cylindrica*, oblonga cylindrica nigra, alis fuscis costis nigris, abdomine fulvo maculis lateralibus nigris. T. 7. p. 599. t. 44. f. 17 — 19.

12. PANOPA,

208. *P. communis*, flava nigraque, alis nigro-maculatis. T. 2. p. 733. t. 24. f. 3 — 11. t. 25. f. 1 — 3.

P. communis. L. S. N. p. 915.

13. RAPHIDIA.

209. *R. communis*, nigra, lineis abdominis flavidis, thorace cylindrico. T. 2. p. 742. t. 25. f. 4 — 9.

R. Ophiopsis. L. S. N. p. 916.

14. APIS.

210. *A. muraria nitida*, muraria, foemina violacea pilis cinereis, mare viridi-aureo lucido pilis

- lis rufis. T. 2. p. 751. t. 30. f. 23. — 25.
t. 32. f. 1 — 5.
211. *A. surinamensis*, glabra, flava, capite postice ferrugineo; thorace abdomineque maculis fasciisque nigris. T. 3. p. 569. t. 28. f. 1, 2.
212. *A. Vespiiformis*, glabra, lutea, capite postice nigro; thorace nigro lineis 4 longitudinalibus luteis; abdomine maculis lobatis nigris. T. 3. p. 570. t. 28. f. 3. 4.
213. *A. cordata*; nitida; viridis, alis hyalinis, abdome cordato, tibiis posticis dilatatis. T. 3. p. 572. t. 28. f. 5. 6.
- A. cordata*. L. S. N. p. 955.
214. *A. leucotorax*, hirsuta; nigra, thorace luteo, alis nigro-violaceis, abdomine glabro. T. 3. p. 573. t. 28. f. 7.
- A. aestuans*. L. S. N. p. 961.
215. *A. aeneipennis*, hirsuta; nigra, alis aeneis nitidis. T. 3. p. 573. t. 28. f. 8.
216. *A. abdomen flavum*, hirsuta, nigra, abdomine excepto primo segmento, flavo; tibiis posticis dilatatis. T. 3. p. 574. t. 28. f. 9. 10.
- A. surinamensis*. L. S. N. p. 961.
217. *A. ferruginea*, hirsuta; fusca, alis pallide fuscis; antennis pilisque ferrugineis. T. 3. p. 575. t. 28. f. 11.
218. *A. pensylvanica*, hirsuta, nigra, thorace ante posticeque luteo, abdomine supra luteo apice nigro, alis nigro-fuscis. T. 3. p. 575. t. 28. f. 12.
219. *A. griseo-collis*, hirsuta, nigra, thorace abdominisque basi griseo-flavis, alis fuscis. T. 3. p. 576. t. 28. f. 13. 14.



220. *A. Gigas*, nigra, nitida, oculis fuscis, alis violaceo-viridibus aeneo-nitentibus. T. 3. p. 576. t. 28. f. 15.
221. *A. flavo-rufa*, hirsuta, nigra, abdomine glabro, thorace abdominisque apice flavo-rufis, alis violaceo-viridibus aeneonitentibus. T. 7. p. 605. t. 45. f. 1.
222. *A. flavigollis*, hirsuta, nigra, abdomine glabro, thorace postice citreo, alis fusco-violaceis obscuris. T. 7. p. 606. t. 45. f. 2.
223. *A. citroneila*, hirsuta, supra flave-citreata, subitus nigra, alis fuscis nitidis cupreo-aeneis. T. 7. p. 606. t. 45. f. 3.
224. *A. fulvo-cincta*, nigra, abdomine antice fasciis 2. transversis flavo-fulvis, alis hyalinis. T. 7. p. 607. t. 45. f. 4.
225. *A. albo-maculata*, nigra, abdominis lateribus maculis tibiisque albis, alis superioribus fuscis inferioribus hyalinis. T. 7. p. 607. t. 45. f. 5. 6.
226. *A. fusiformis*, nigra, abdomine conico acutissimo: segmentorum marginibus flavescentibus, alis brevioribus, antennis longis subulatis. T. 7. p. 608. t. 45. f. 7.

15. NOMADA.

227. *N. nigro-rufa*, nigra, alis fuscis, antennis clavatis, abdomine rufo, ano nigro. T. 2. p. 755. t. 32. f. 6 — 12.
228. *N. Surinamensis*, antennis filiformibus, capite thoraceque nigris maculis hirsutis aureis nitidis, abdomine rufo, ano nigro, pedibus rufis. T. 2. p. 759. t. 32. f. 13 — 16.
- Apis ichneumonea*. L. S. N. p. 959.

16. VESPA.

229. *V. vulgaris*, nigra luteaque, antennis totis nigris. T. 2. p. 766. t. 26. f. 1 — 17.
V. vulgaris. L. S. N. p. 949.
230. *V. Crabro medius*, nigra luteaque, antennis subtus rufis. T. 2. p. 791. t. 27. f. 1 — 8.
231. *V. Crabro major*, nigra luteaque, nucha, thoracis antica parte primoque antennarum articulo rufis. T. 2. p. 801. t. 27. f. 9. 10.
- V. Crabro.** L. S. N. p. 801.
232. *V. maxillosa*, nigro-fusca, antennis rufis, alis fuscō-violaceis, abdominis petiolo elongato clavato, dentibus subulatis rectis, lingua elongata. T. 3. p. 577. t. 29. f. 1. 2.
- V. emarginata.** L. S. N. p. 952.
233. *V. recurvirostris*, atra, alis atro-coerulecentibus, abdominis petiolo ovato, lingua inflexa. T. 3. p. 579. t. 29. f. 4 — 6.
- Apis mexicana.** L. S. N. p. 953.
234. *V. canadensis*, ferrugineo-fusca, antennis medio nigris, alis ferrugineis, abdominis segmento primo obconico. T. 3. p. 580. t. 29. f. 7.
- V. canadensis.** L. S. N. p. 952.
235. *V. fulvo-fasciata*, flava, antennis rufis, capite thoraceque signaturis nigris, abdomine fasciis fulvis: petiolo elongato. T. 3. p. 581. t. 29. f. 8.
236. *V. olivacea*, griseo-olivacea, antennis rufis, thorace abdomineque lineis nigro-fuscis, alis olivaceis. T. 3. p. 582. t. 29. f. 9.
237. *V. nigripennis*, ferruginea, alis antennisque nigro-fuscis. T. 3. p. 582. t. 29. f. 10.

238. *V. annularis*, nigro-fusca, thoracis lateribus nigris, abdomine fascia tarsisque flavis. T. 3. p. 583. t. 29. f. 11.

V. annularis. L. S. N. p. 950.

239. *V. cincta*; nigra, alis fusco-violaceis, thorace maculis 3. abdomine fascia sulphureis. T. 3. p. 584. t. 29. f. 12.

V. quadricornis. L. S. N. p. 951.

240. *V. maculata*; nigra; capite, thoracis lateribus apiceque abdomineque postice sulphureo-maculatis. T. 3. p. 584. t. 29. f. 13.

V. maculata. L. S. N. p. 948.

241. *V. carbonaria*; nigra; antennis, labio superiore; abdominisque apice ferrugineis; alis superioribus obscure violaceis; inferioribus fuscis. T. 7. p. 609. t. 45. f. 9.

V. capensis. L. S. N. p. 952.

242. *V. petiolata*, nigra, capite; antennis tibiisque ferrugineis, alis fulvis apice nigris, abdome maculis 2. flavis, petiolo longissimo; T. 7. p. 610. t. 45. f. 10.

Sphex capensis. L. S. N. p. 942.

17. SPHECI

Fam. I.

243. *S. interrupte-fasciata*, nigra; antennis fractis dimidio flavis, abdominis fasciis 4. flavis: tribus primis interruptis. T. 2. p. 807. t. 25. f. 10 — 15.

Vespa cribaria. L. Faun. Suec. 1675. 3.

244. *S. cribaria*, nigra, antennis fractis nigris, pedibus flavis, abdominis fasciis flavis 2. primis interruptis; lamina cartilaginea contava

cava pedum anteriorum in *mare*. T. 2. p.

810. t. 28. f. 1 — 5.

S. cribaria. L. S. N. p. 573.

245. *S. clavata*, nigra, petiolo longo clavato, antennis fractis, pedibus rufis, abdominis fasciis 3. punctisque 2. maculaque thoracis flavis. T. 2. p. 820.

Vespa arvensis. L. S. N. p. 950.

246. *S. americana aptera*, aptera, nigra, villosa, thorace maculis 6. albis: abdomine 4. rubris lineisque 3. albis. T. 3. p. 591. t. 30, f. 10 ← 12.

Mutilla americana. L. S. N. p. 966.

Fam. 2.

247. *S. rufa fasciata*, nigra, antennis filiformibus petiolo brevi, abdomine antice rufo lineis nigris, postice nigro, alis fuscis. T. 2. p. 822. t. 28. f. 6.

S. fusca. L. S. N. p. 944.

248. *S. sabulosa*, nigra, antennis filiformibus petiolo longo, abdomine antice rufo, alis brevibus. T. 2. p. 822. t. 28. f. 7 — 15.

S. sabulosa. L. S. N. p. 941.

249. *S. viatica*, nigra, hirsuta, antennis filiformibus, petiolo longiusculo, abdomine antice rufo postice nigro, alis fuscis. T. 2. p. 830. t. 28. f. 16.

S. viatica. L. S. N. p. 943.

250. *S. rufipennis*, nigra, antennis pedibusque ferrugineis, alis rufo aureis nitidis basi nigris apice violaceis. T. 7. p. 611. t. 45. f. 11.

251. *S. auripennis*, nigro-coerulea nitida, alis ferrugineo-aureis basi nigris apice albieantibus, antennis apice ferrugineis. T. 3. p. 585. t. 30. f. 1.

E

S. coe

S. coerulea. L. S. N. p. 947.

252. *S. pensylvanica*, nigra, alis violaceis apice fuscis, abdominis petiolo filiformi, maxillis longissimis incurvatis. T. 3. p. 586. t. 30.
f. 2. 3.

S. pensylvanica. L. S. N. p. 941.

253. *S. indica*, átra, alis obscure violaceis, capite antennis pedibusque fulvis. T. 3. p. 587.

S. indica. L. S. N. p. 945.

254. *S. flavo-maculata*, nigra, alis fuscis, abdominis petiolo longissimo, thorace, abdominis basi pedibusque flavo-maculatis. T. 3. p. 588. t. 30. f. 4.

255. *S. dimidiata*, nigra, alis obscure violaceis, abdomine antice ferrugineo postice nigro, petiolo elongato. T. 3. p. 589. t. 30. f. 5.

256. *S. coerulea*, nigro-coerulea nitida, antennis nigris, alis fusco-violaceis, abdominis petiolo elongato. T. 3. p. 589. t. 30. f. 6.

S. coerulea. L. S. N. p. 941.

257. *S. depressa*, nigra, capite lato depresso, alis externis fuscis, abdomine gibbo: petiolo depresso maculis 2, flavis. T. 3. p. 590. t. 30. f. 7 — 9.

18. CHRYSIS.

258. *Ch. coccinea*, nitida, viridis, thorace postice coeruleo, abdomine coccineo-aurato apice quadridentato. T. 2. p. 832. t. 28. f. 17 — 21. t. 29. f. 1. 2.

Ch. ignita. L. S. N. p. 947.

259. *Ch. coerulea*, nitida, coeruleo-viridis, abdomine macula magna nigra nitida, alarum apici-

apicibus nigris. T. 2. p. 837. t. 29. f. 3
— 5.

Ch. bidentata. L. S. N. p. 947.

19. SIREX.

260. *S. Gigas*, abdomine dimidio nigro dimidioque flavo, thorace nigro, antennis pedibusque flavis. T. 1. p. 564. t. 36. f. 1 — 5.

S. Gigas. L. S. N. p. 928.

261. *S. Pensylvanica*, capite thoraceque ferrugineis, abdomine atro supra fasciis transversis flavis. T. 7. p. 593. t. 30. f. 13.

S. Columba. L. S. N. p. 929.

262. *S. Spectrum*, niger, pedibus ferrugineis. T. 1. p. 567. t. 36. f. 6.

S. Spectrum. L. S. N. p. 929.

263. *S. Iuvencus*, nigro-coeruleus nitidus, pedibus luteis. T. 1. p. 568. t. 36. f. 7.

S. Iuvencus. L. S. N. p. 929.

20. ICHNEUMON.

Fam. 1.

264. *I. resinosus*, niger, abdomine elongato cylindrico, pedibus ferrugineis: posticis nigris. T. 2. p. 844. T. 1. p. 473. t. 36. f. 9.

265. *I. rugosus*, capite thoraceque rufis, abdomine cylindrico rugoso nigro, alis obscure fuscis. T. 3. p. 597. t. 30. f. 18. 19.

Fam. 2.

266. *I. spinosus*, thorace ferrugineo bispinose, alis maculis 2. fuscis, abdomine nigro fasciis 3. albis. T. 3. p. 596. t. 30. f. 16. 17.

I. ariolator. L. S. N. p. 933.

267. *I. hypochondriacus*, niger, pedibus rufis, abdomine fusiformi lateribus exalbidis. T. 2. p. 845. t. 29. f. 6 — 8.

E 2

I. ni



L. niger, abdomine ovato elongato, pedibus aurantiis, antennis medio luteis, thorace maculis flavis. T. 1. p. 580. t. 23. f. 16. annas?

268. *L. nigro-caudatus*, abdomine fusiformi flavo, thorace nigro-flavo-maculato, ano nigro, pedibus flavis. T. 2. p. 848. t. 29. f. 9.

269. *I. cinctipes*, niger, abdomine fusiformi, pedibus ferrugineus: articulis tribus mediis tarorum posticorum flavis. T. 2. p. 849. t. 29. f. 10. 11.

270. *I. rufus*, totus rufus, corpore fusiformi, antennis longissimis fuscis. T. 7. p. 569. t. 44. f. 13.

Fam. 3.

271. *I. fulvus*, abdomine falcato fulvo, oculis viridibus nitidis. T. 2. p. 850. t. 29. f. 15 — 26.

L. luteus. L. S. N. p. 937.

272. *I. cantator*, niger, abdomine falcato: medio rufo, alis abbreviatis, tibiis anticis rufis posticis nigris, oculis aeneis. T. 7. p. 594. t. 44. f. 9 — 12.

Fam. 4.

273. *I. niger*, abdominis articulo ultimo globoso, totus niger, tibias posticis fuscis. T. 1. p. 577. t. 36. f. 12 — 13.

Fam. 5.

274. *I. clavipes*, abdomine longo attenuato truncato; petiolo longo thoracis dorso imposito, pedibus posticis longis clavatis. T. 1. p. 578. t. 30. f. 10. 11.

275. *I. appendigaster*, niger, abdomine brevissimo compresso truncato; petiolo longo thoracis

cis dorso imposito, pedibus posticis longissimis. T. 3. p. 594. t. 30. f. 14. 15.

Fam. 6.

276. *I. gossypinus*, niger, antennis filiformibus, pedibus luteis, abdomine subtus viridescente. T. 2. p. 862. t. 29. f. 13. 14.

I. globatus. L. S. N. p. 940.

277. *I. Aranearum*, niger, antennis filiformibus, thorace lineis 2. pedibusque flavis. T. 2. p. 863. t. 30. f. 1 — 3.

278. *I. Aphidum*, niger, antennis filiformibus, ore flavescente, pedibus fusco-nebulosis. T. 2. p. 866. t. 30. f. 4 — 13.

I. Aphidum. L. S. N. p. 940.

279. *I. Pelliionellae*, niger, antennis filiformibus, pedibus rufis. T. 2. p. 875. t. 30. f. 14 — 19.

Fam. 7.

280. *I. aureus Bedeguaris*, antennis fractis clavatis nigris, capite thoraceque aeneis, abdome purpureo-nitido, pedibus flavis. T. 2. p. 877. t. 30. f. 20. 21.

I. Bedeguaris. L. S. N. p. 939.

281. *I. rufescens*, rufus, antennis fractis clavatis, thorace postice abdomineque nigris, macula alarum magna fusca. T. 2. p. 882. t. 30. f. 22.

282. *I. Puparum*, saltator, aeneus, antennis fractis clavatis, pedibus flavis, alarum nerva longitudinali appendiculata. T. 2. p. 883. T. 1. p. 604. t. 35. f. 14 — 17. p. 607. t. 32. f. 17 — 22.

283. *I. Apum*, saltator, nigro-viridescens, antennis fractis clavatis, pedibus fuscis nigro-maeulatis. T. 2. p. 887. t. 30. f. 24 — 31.

284. *I. aeneus myriventris*, saltator, antennis fractis clavatis, capite thoraceque aeneis, abdome nigro macula fusca, pedibus flavescentibus. T. 2. p. 889. t. 31. f. 1 — 9.
285. *I. aeneus globiceps*, saltator, aeneus, antennis fractis clavatis, capite globoſo, pedibus flavis, abdominis medio flavo punctis 6. nigris in mare. T. 2. p. 896. t. 31. f. 10 — 12.

Fam. 8.

286. *I. fuscus ramicornis*, fusco-nigricans, antennis ramosis. T. 1. p. 588. t. 35. f. 1 — 7.
- I. pectinicornis*. L. S. N. p. 941.
287. *I. aeneus ramicornis*, saltator aeneus, antennis mari ramosis, pedibus flavis. T. 2. p. 899. t. 31. f. 14 — 17.

Fam. 9.

288. *I. fuscicornis*, niger, apterus, abdomine ovali, antennis pedibusque fuscis. T. 2. p. 903. t. 31. f. 18.
289. *I. ruficornis*, niger, apterus, abdomine ovali, antennis pedibusque ferrugineis. T. 2. p. 906.
290. *I. nigricornis*, ferrugineus, apterus, capite ano antennisque nigris. T. 2. p. 907. t. 31. f. 19 — 21.
- Mutilla Acarorum. L. S. N. p. 968.
291. *I. vesicularis*, saltator, apterus, nigro-aeneus, antennis fractis clavatis pedibusque flavis nigrisque. T. 2. p. 909. t. 31. f. 22.

21. CYNIPS.

292. *C. Potentillae*, capite thoraceque nigris, abdome pedibusque rufis nitidis. T. 2. p. 898. t. 31. f. 12. 13.

22. TEN-

78

32. TENTHREDO.

Fam. 1.

293. *T. lutea*, antennis capitatis, fusca, abdomine flavo fasciis striisque nigro-coerulecentibus. T. 2. p. 934. t. 33. f. 8 — 16.

T. lutea. L. S. N. p. 924.

294. *T. femorata*, antennis capitatis, nigra, abdominis macula flava, antennis pedibusque obscure luteis. T. 2. p. 944. t. 34. f. 1 — 8.

T. femorata. L. S. N. p. 920.

295. *T. rufa*, antennis capitatis, nigra, abdomine subtus lateribusque rufis, pedibus fulvis. T. 2. p. 948. t. 33. f. 17 — 24.

T. amerinae. L. S. N. p. 921.

296. *T. quadrifasciata*, antennis capitatis capitulo ferrugineo, nigra, segmentis abdominalibus 4. flavescentibus: primo interrupto. T. 3. p. 598. t. 30. f. 20.

Fam. 2.

297. *T. flavipes*, antennis clavatis 3. articulatis, viridi-coerulea nitens; pedibus flavis, alis flavescentibus macula fusca. T. 2. p. 1016. t. 38. f. 32 — 34.

T. nitens. L. S. N. p. 922.

298. *T. nigripes*, antennis clavatis 3. articulatis, nigro-coerulescens nitida, antennis pedibusque nigris, alis fusco-hyalinis. T. 2. p. 1018. t. 39. f. 14 — 20.

T. ustulata. L. S. N. p. 922.

299. *T. Rosae*, antennis clavatis 3. articulatis, flava, capite thoraceque nigris, alis superioribus nigro-marginatis. T. 2. p. 1021. t. 39. f. 21 — 29.

T. Rosae. L. S. N. p. 925.

~~72~~

300. *T. coeruleipennis*, antennis clavatis 3. articulatis nigris, corpore alisque nigro-coeruleis nitidis. T. 2. p. 1025. t. 40. f. 1 — 6.

301. *T. americana*, antennis crassioribus 7. nodiis, thorace flavo, abdomine coeruleo nitido, alis violaceis. T. 3. p. 598. t. 30. f. 21.
T. americana. L. S. N. p. 921.

Fam. 3.

302. *T. Vespa*, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, fasciis abdominalis flavis, pedibus luteis. T. 2. p. 951. t. 34. f. 9 — 19.

T. rustica. L. S. N. p. 923.

303. *T. goffypina*, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, macula magna rufescente thoracis, T. 2. p. 956. t. 35. f. 1 — 13.

T. ovata. L. S. N. p. 924.

304. *T. pulverata*, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, segmentis abdominalis albo marginatis, femoribus ferrugineis. T. 2. p. 963. t. 34. f. 20 — 25.

305. *T. rufo-cincta*, antennis filiformibus 9. nodiis, abdomine elongato cylindrico nigro: cingulo pedibusque rufis. T. 2. p. 967. t. 35. f. 14 — 18.

306. *T. papillosa*, antennis filiformibus 9. nodiis, capite thoraceque nigris, abdomine flavo superne serie punctorum nigrorum. T. 2. p. 982. t. 37. f. 1 — 11.

307. *T. Salicis*, antennis filiformibus 9. nodiis, abdomine pedibusque flavis, capite, antennisque thoraceque nigris, *Salicis*. T. 2. p. 991. t. 37. f. 12 — 22.

T. alicis. L. S. N. p. 924.

308. *T. Betulae*, antennis filiformibus 9. nodiis, abdomine pedibusque flavis, capite, antennis

nis thoraceque nigris, *Betulae.* T. 2. p. 994. t. 37. f. 23.

Obs. Simillima *Tenthredinum Salicis*, sed minor et Larva diversa.

309. *T. largipes*, antennis filiformibus 9. nodiis nigra, abdome rufo, ano nigro, pedibus posticis longis latis compressisque. T. 2. p. 995. t. 37. f. 24 — 28.

T. septentrionalis. L. S. N. p. 926.

310. *T. nigrata*, antennis filiformibus 9. nodiis nigra, rufa, abdome annulis nigris. T. 2. p. 1000. t. 38. f. 2 — 4.

311. *T. Pini*, antennis filiformibus 9. nodiis nigra, pedibus viridi-nigroque variegatis, thorace maculis 2. lateralibus viridibus. T. 2. p. 1001. t. 38. f. 5 — 7.

312. *T. viridi-dorsata*, antennis filiformibus 9. nodiis, superne fusco-nigricans: inferne testacea. T. 2. p. 1002. t. 38. f. 8 — 10.

313. *T. limacina*, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, pedibus fuscis, alis nigrescentibus. T. 2. p. 1007. t. 38. f. 16 — 25.


T. Cerasi. L. S. N. p. 923.

314. *T. Salicis pentandrae*, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, pedibus flavis, alis superiorebus nigro-marginatis. T. 2. p. 1009. t. 39. f. 1 — 11.

315. *T. Salicis cinereae*, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, pedibus abdomeque subtus testaceis. T. 2. p. 1013. t. 38. f. 26 — 31.

316. *T. rufipectus*, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, thorace subtus rufo, alis fuscis vasis rubris. T. 3. p. 599. t. 30. f. 22.

Fam. 4.



317. *T. pectinata major*, antennis pectinatis, pedibus griseis, *mare nigro*, *foemina grisea*, capite maculisque nigris. T. 2. p. 971. t. 36. f. 1 — 30.

T. Pini. L. S. N. p. 922.

318. *T. pectinata minor*, antennis pectinatis, pedibus griseis, *mare nigro*, abdomen subtus pallide fusco, *foemina testacea* abdomen viridi subtus nigro lineata, capite griseo.

T. 2. p. 983. t. 35. f. 24 — 27.

319. *T. pectinata rufa*, antennis pectinatis, *mare nigro*, abdomen subtus pedibusque rufis, *foemina tota rufa* immaculata. T. 2. p. 986.

Fam. 5.

320. *T. flaviceps*, antennis setaceis 24. nodiis, corpore coeruleo-viridescente nitido, capite flavo. T. 2. p. 1038. t. 40. f. 19 — 20.

T. erythrocephala. L. S. N. p. 926.

321. *T. fulva*, antennis setaceis 24. nodiis, abdome fulvo, oculis, thorace anoque nigris, macula alarum fusca. T. 2. p. 1039.

T. Betulæ. L. S. N. p. 927.

322. *T. flaviventris*, antennis setaceis 24. nodiis, nigra, pedibus flavis, abdomen postice flavo fuscostriato. T. 2. p. 1040. t. 40. f. 22.

323. *T. fulvipes*, antennis setaceis 30. nodiis flavis, corpore nigro, pedibus fulvis. T. 2. p. 1040. t. 40. f. 23.

T. sylvatica. L. S. N. p. 926.

23. FORMICA.

Fam. I.

324. *F. rufa*, rufa, capite abdomineque fuscis, petiolo abdominalis squamifero. T. 2. p. 1053. t. 41. f. 1 — 22. t. 42. f. 1 — 11.

F. rufa

F. rufa. L. S. N. p. 962.

325. *F. pratensis*, rufa, capite abdomineque nigris, petiolo abdominalis squamifero. T. 2. p. 1080.

326. *F. nigra major*, nigra rutens, petiolo abdominalis squamifero. T. 2. p. 1082. t. 42. f. 12 — 15.

F. fusca. L. S. N. p. 963.

327. *F. nigra minor*, nigra, pedibus dimidiisque antennarum fusco-flavescens, petiolo abdominalis squamifero. T. 2. p. 1085. t. 42. f. 16 — 23.

F. nigra. L. S. N. p. 963.

328. *F. flava*, flava, petiolo abdominalis squamifero. T. 2. p. 1089. t. 42. f. 24 — 28.

329. *F. bidens*, rufo-fusca, antennis ferrugineis: articulo infimo nigro, capite ovato, thoracis gibbere bidentato, petiolo squama erecta. T. 3. p. 600. t. 31. f. 1 — 2.

F. bidens. L. S. N. p. 964.

330. *F. maxillosa*, alata, nigro-fusca, pedibus maxillisque porrectis rufis, squama petiolari conica. T. 3. p. 601. t. 31. f. 3 — 5.

F. haematoda. L. S. N. p. 965.


331. *F. lobata*, alata, nigra, maxillis porrectis, abdominalis primo segmento contractiore, squama petiolari magna excavata. T. 3. p. 602. t. 31. f. 6 — 8.

F. foetida. L. S. N. p. 965.

332. *F. pensylvanica*, nigra, pedibus fuscis, capite magno ovato gibbo, squamula petiolari lenticulari. T. 3. p. 603. t. 31. f. 9. 10.

333. *F. fulvo-pilosa*, nigra, opaca, abdomine pilis fulvis: petiolo squama erecta. T. 7. p. 613. t. 45. f. 13 — 14.

Fam.



Fam. 2.

334. *F. rubra aculeata*, rufo-flava, aculeata, thorace bispinoso. T. 2. p. 1093. t. 43. f. 1 — 14.

F. rubra. L. S. N. p. 963.

335. *F. fusca aculeata*, rufo-fusca, capite thorace que fuscis, aculeata, thorace bispinoso. T. 2. p. 1105. t. 43. f. 15 — 22.

F. caespitum. L. S. N. p. 963.

336. *F. migratoria*, fusco-castanea, capite didymo magno utrinque postice spinoso, thorace 4. spinoso. T. 3. p. 604. t. 31. f. 11 — 13.

F. cephalotes. L. S. N. p. 964.

337. *F. sexdens*, rufa, capite magno didymo utrinque postice spinoso, thorace sexspinoso. T. 3. p. 607. t. 31. f. 14 — 16.

F. sexdens. L. S. N. p. 964.

338. *F. quadridentata*, atra nitida, capite magno depresso marginato utrinque bispinofo, thorace quadrispinoso. T. 3. p. 609. t. 31. f. 17 — 20.

F. atrata. L. S. N. p. 965.

339. *F. foetida*, alata rufa, maxillis porrectis incurvatis, thorace fusco bispinofo, abdome antice rufo postice nigro. T. 3. p. 611. t. 31. f. 21. 22.

340. *F. pusilla*, rufa, abdomine fusco, pedibus testaceis, thorace bidentato. T. 3. p. 611. t. 31. f. 23. 24.

F. omnivora. L. S. N. p. 964.

24. THRIIPS.

341. *T. Physapus*, atra, alis albis, antennis sexnodis. T. 3. p. 6. t. 1. f. 1 — 4.

T. Physapus. L. S. N. p. 743.

342.

342. *T. Iuniperina*, griseo-fusca; oculis nigris, alis albescentibus. T. 3. p. 10. t. 1. f. 5 — 7.
T. Iuniperina. L. S. N. p. 743.
343. *T. Corticis*, nigra, alis hyalinis niveis barbis (fimbriis) longissimis, antennis 8. nodiis. T. 3. p. 11. t. 1. f. 8 — 13.
344. *T. fasciata*, alis fasciis 3. transversis albis, antennis annulo albo. T. 3. p. 18.

25. APHIS.

Fam. I.

345. *A. Pruni*, dilute viridis albo-farinosa, corniculis brevioribus, Pruni. T. 3. p. 49. t. 2. f. 1 — 13.
346. *A. Pomi*, flavo-viridis, corniculis longioribus, pedibus antennisque nigrescentibus, Pomi. T. 3. p. 53. t. 3. f. 18 — 23.
347. *A. Juniperi*, obscure fusca cinereo-maculata, corniculis brevioribus grossis. T. 3. p. 56. t. 4. f. 7 — 9.
348. *A. Viciae Craccae*, nigro-coerulescens albo-farinosa, corniculis brevioribus, Viciae Craccae. T. 3. p. 58. t. 2. f. 14 — 19.
- A. Viciae Craccae*. L. S. N. p. 735.
349. *A. Millefolii*, viridis nigro-maculata, pedibus antennisque nigris, corniculis longioribus, Millefolii. T. 3. p. 60. t. 4. f. 1 — 6.
350. *A. Rosae*, viridis, corniculis longissimis Rosae. T. 3. p. 65. t. 3. f. 1 — 13.
- A. Rosae*. L. S. N. p. 734.
351. *A. Salicis farinosa*, obscure viridis, tuberculis lanuginosis albis, corniculis longioribus. T. 3. p. 76. t. 4. f. 10 — 13.
352. *A. Tiliae nigro-punctata*, flavo-viridis, lineis punctis nigris, alis nigro-maculatis, corniculis

culis brevioribus, Tiliae. T. 3. p. 77. t.
5. f. 1 — 6.

A. Tiliae Europaeae. L. S. N. p. 734.

Fam. 2.

353. *A. nuda* Pini, fusca tuberculata, pedibus nudis, Pini. T. 3. p. 27. t. 6. f. 1—18.

A. Pini sylvestris. L. S. N. p. 736.

354. *A. tomentosa* Pini, nigra albo-farinosa, tuberculata, pedibus villoso-tomentosis, Foliorum Pini. T. 3. p. 39. t. 6. f. 19 — 25.

355. A. *Betulae nigro-punctata*, ecorniculata, viridis, dorso tuberculis nigris, *Betulae*. T. 3. p. 45. t. 3. f. 27. 28.

A. Betulae albae. L. S. N. p. 735.

356. *A. Alni*, flavescenti-alba, tuberculata, *Alni*.
T. 3. p. 47. t. 3. f. 15 — 18.

357. *A. Foliorum Ulmi*, nigricans, tuberculata, foliorum volutorum Ulmi. T. 3. p. 81. t. 5. f. 7.

A. Ulmi campestris. L. S. N. p. 733.

358. *A. Gallarum Ulmi*, nigricans, corniculis nul-
lis, *Gallarum Ulmi*. T. 3. p. 89. t. 4.
f. 15 — 17.

359. *A. Tremulae*, coeruleo-nigra tomentosa, corniculis nullis; Populi tremulae ramulorum.
T. 3. p. 94. t. 7. f. 1 — 7.

360. A. *Xylostei*, tomentosa, corniculis nullis, ~~L~~
nicerae *Xylostei*. T. 3. p. 96. t. 7. f. 8
— 18.

361. A. *Gallarum Abietis*, tomentosa, cornicalis nullis, *Gallarum Abietis*. T. 3. p. 99. t. 8. f. I — 29.

Chermes Pini Abietis. L. S. N. p. 738.

26. СНЕГ.

26. CHERMES.

362. *Cb. Urticae*, fusca l. virescens, abdominis lateribus albo-maculatis; Urticae. T. 3. p. 134. t. 9. f. 17 — 26. t. 10. f. 1 — 7.
Ch. Urticae dioicae. L. S. N. p. 738.
363. *Cb. Pyri*, viridi-fusca, maculis fasciisque obscuris, alis fusco-maculatis, Pyri. T. 3. p. 141. t. 9. f. 1 — 16.
Ch. Pyri communis. L. S. N. p. 737.
364. *Cb. Alni*, lanata, viridis, Alni. T. 3. p. 148. t. 10. f. 8 — 20.
Ch. Betulae Alni. L. S. N. p. 738.

27. CICADA.

Fam. I.

365. *C. laternaria surinamensis*, fronte rostrata ovali recta gibbosa, alis lividis: posticis ocellatis. T. 3. p. 195.
Fulgora laternaria. L. S. N. p. 703.
366. *C. laternaria chinensis*, fronte rostrata subulata adscendente: punctis albis, alis superioribus viridibus luteo-maculatis, posticis flavis apice nigris. T. 3. p. 197.
Fulgora candelaria. L. S. N. p. 703.
367. *C. laternaria fusca*, fusca fronte rostrata subulata recta apice truncata, alis superioribus punctis nigris sparsis. T. 3. p. 200. t. 32. f. 1.
368. *C. filirostris*, griseo-fusca subtus flavescens, fronte rostrata filiformi adscendente. T. 3. p. 201. t. 32. f. 2. 3.
Fulgora phosphorea. L. S. N. p. 704.
369. *C. conirostris*, viridis, fronte rostrata conica adscendente, alis hyalinis. T. 3. p. 202. t. 32. f. 4. 5.

Fu

~~====~~

Fulgora noctivida. L. S. N. p. 704.

370. *C. brevirostris*, supra viridis subtus flava, fronte rostrata obtusa brevi. T. 3. p. 203. t. 32. f. 6.

Fulgora lucernaria. L. S. N. p. 704.

371. *C. Folium ambulans*, flavo-viridis, fronte rostrata brevi recta, alis amplissimis verticalibus compressis. T. 3. p. 204. t. 32. f. 7. 8.

Fam. 2.

372. *C. foliata-fasciata*, nigro-fusca, thorace compresso foliaceo verticali: fascia arcuque albis. T. 3. p. 205. t. 32. f. 9.

C. foliata. L. S. N. p. 705.

373. *C. foliata-arcuata*, nigro-fusca, thorace compresso foliaceo vorticali: arcu flavescente. T. 3. p. 206. t. 32. f. 10 — 13.

374. *C. foliata-fascia*, nigro-fusca tota, thorace compresso foliaceo verticali. T. 3. p. 208. t. 32. f. 14.

375. *C. foliata-sinuosa*; fusca, thorace compresso foliaceo: margine sinuoso, apice rostrato. T. 3. p. 208. t. 32. f. 15. 16.

C. fronditia. L. S. N. p. 705.

376. *C. bastata*, grisea livida, thorace magno elevato antice posticeque acuto, pedibus quatuor primoribus latis compressis. T. 3. p. 209. t. 32. f. 17 — 18.

C. squamigera. L. S. N. p. 705.

377. *C. gibbosa*, nigra, elytris flavo-livitis, pedibus fulvis, thorace carinato gibbo: antice obtuso, postice acuto. T. 3. p. 211. t. 32. f. 20. 21.

Fam.

Fam. 3.

378. *C. cornuta*, fusca, thorace bicorni postice subulato longitudine abdominalis. T. 3. p. 181. t. 11. f. 22. 23.
C. cornuta. L. S. N. p. 705.
 379; *C. angulata*, nigra albo-maculata, thorace quadrangulato postice subulato longitudine abdominalis. T. 7. p. 613. t. 45. f. 15.

Fam. 4.

380. *C. Lyricen*, thorace antice viridi postice fulvo maculis nigris, alis hyalinis venis fuscis; margine dilatato viridi. T. 3. p. 212. t. 32, f. 22.—26.

C. Tibicen. L. S. N. p. 707.

381. *C. nigro-lineata*, fulva, thorace linea nigra, alis linea flexuosa fusca: margine maculis que hyalinis. T. 3. p. 219. t. 33. f. 1.

C. repanda. L. S. N. p. 707.

382. *C. ocellata*, viridis fusco-fulvoque maculata, alis superioribus ocellis maculisque fuscis albidisque: inferioribus fulvis fascia flexuosa nigra. T. 3. p. 220. t. 33. f. 2. 3.

383. *C. nitida*, griseo-viridis, alis hyalinis nitidissimis, femoribus anticis tridentatis. T. 3. p. 220. t. 33. f. 4. 5.

384. *C. sanguinea*, alis superioribus fuscis, fronte abdomine thoracisque maculis binis sanguineis. T. 3. p. 221. t. 33. f. 17.

Fam. 5.

385. *C. spumaria Graminis*, fusca, alis superioribus maculis albis. T. 3. p. 163. t. 11. f. 3 — 21.

C. spumaria. L. S. N. p. 708.

386. *C. spumaria Salicis*, grisea, pedibus rufo-testaceis. T. 3. p. 180.



387. *C. nervosō-punctata*, griseo-fusca, alis hyalinis
fusco-maculatis: nervis fusco-punctatis.
T. 3. p. 182. t. 12. f. 1 — 5.
C. nervosa. L. S. N. p. 709.
388. *C. undata*, flava, thorace fusca, alis superio-
ribus fascia undata fusca. T. 3. p. 185. t.
11. f. 24.
389. *C. trifasciata*, nigro-fusca, fasciis tribus trans-
versis albis, capite subtus flavo. T. 3. p.
186. t. 11. f. 25.
- C. bifasciata*. L. S. N. p. 706.
390. *C. interrupta*, alis superioribus flavis fasciis
binis nigris interruptis longitudinalibus,
pedibus flavis. T. 3. p. 186. t. 12. f. 6
— 11.
- C. interrupta*. L. S. N. p. 710.
391. *C. Musciformis Ulmi*, viridi-lutea, abdomen
nigricante, alis superioribus apice nigri-
cantibus. T. 3. p. 188. t. 12. f. 12 — 19.
C. Ulmi. L. S. N. p. 711.
392. *C. Musciformis Rosae*, viridi-lutea, abdomen
luteo l. viridi, alis albidis apice hyalinis.
T. 3. p. 193.
- C. Rosae*. L. S. N. p. 712.
393. *C. Phalaenoides*, flava, alis amplissimis deflo-
xis albidis nigro-punctatis. T. 3. p. 222.
t. 33. f. 6. 7.
- C. Phalaenoides*. L. S. N. p. 710.
394. *C. rubra*, rubra, alis deflexis fuscis: fasciis 2,
flavis. T. 3. p. 224. t. 33. f. 8 — 10.
C. rubra. L. S. N. p. 711.
395. *C. quadrifasciata*, flava, fasciis 4. transversis
nigris. T. 3. p. 225. t. 33. f. 11.
- C. 4fasciata*. L. S. N. p. 706.

396. *C. collaris*, flavo-fulva, thorace fascia rubra pallida, antennis longioribus. T. 3. p. 226. t. 33. f. 12. 13.
397. *C. marginata*, fusca, utrinque linea laterali flava, alis posticis nigris. T. 3. p. 226. t. 33. f. 14.
398. *C. reticulata*, fuscotestacea, capite obtuso, thorace linea alba, alis albo-reticulatis, tibiis posticis nigro-maculatis. T. 3. p. 227. t. 33. f. 15. 16.
399. *C. nigra*, nigra tota, abdomine subtus obscure rubro, alis magnis deflexis. T. 7. p. 615. t. 45. f. 17.

28. CIMEX.

400. *C. juniperinus*, ovatus, viridis, elytrorum marginibus scutellique apice flavis. T. 3. p. 231. et 253. t. 13. f. 1 — 8.
C. juniperinus. L. S. N. p. 722.
401. *C. rufipes*, ovatus, fuscus, thorace angulato-spinoso, scutelli apice pedibusque rubris. T. 3. p. 253.
C. rufipes. L. S. N. p. 719.
402. *C. haemorrhoidalis*, ovatus, viridis, subtus paleide flavus, thorace obtuse spinoso, elytris macula fusca, abdomine supra rubro: maculis nigris. T. 3. p. 254. t. 14. f. 7. 8.
C. haemorrhoidalis. L. S. N. p. 720.
403. *C. Verbasci*, ovatus, griseo-fuscus, antennis albo-nigroque-maculatis, scutelli apice glauco, abdomine supra nigro: margine flavo-maculato. T. 3. p. 257. t. 14. f. 3 — 5.
C. Baccarum. L. S. N. p. 721.

404. *C. purpureipennis*, ovatus, flavo-viridis, thorace angulato, elytris pallide purpureis, antennis nigris, pedibus roseis. T. 3. p. 258. t. 13. f. 15.
405. *C. bitens*, ovatus, fuscus, thorace spinis longioribus: subtus maculis rubris, antennis rufis, abdomine subtus macula nigra. T. 3. p. 259. t. 13. f. 9.
- C. bidens*. L. S. N. p. 718.
406. *C. dentatus*, ovatus, fusco-viridis, subtus flavescens, thorace linea transversa flava, elytris tubero-nigro-marginatis, antero bidentato rubro. T. 3. p. 260.
407. *C. Betulae*, ovatus, viridi-l. rubro-griseus, scutello macula nigra, antennis griseis apice nigris, abdominis lateribus flavo-nigro-que variis. T. 3. p. 261. t. 14. f. 9 — II.
C. griseus. L. S. N. p. 721.
408. *C. viridis totus*, ovatus, viridis, subtus viridi-griseus, pedibus concoloribus. T. 3. p. 266.
- C. prasinus*. L. S. N. p. 722.
409. *C. oléraceus*, ovatus, coeruleo-aeneus, thorace lineola, scutelli apice elytrisque purpuro albo rubro-ve. T. 3. p. 266. t. 15. f. 22. 23.
- C. oléraceus*. L. S. N. p. 722.
410. *C. coeruleus*, ovatus, aeneo-coeruleus nitidus totus. T. 3. p. 268.
- C. coeruleus*. L. S. N. p. 722.
411. *C. bicolor*, ovatus, niger nitidus, thorace elytris tibiisque spinosis albo-maculatis. T. 3. p. 268.
- C. bicolor*. L. S. N. p. 722.

412. *C. niger spinipes*, ovatus, niger ditidus, tibiis spinosis, elytrorum parte membranacea fusca, aliis albidis. T. 3. p. 269.

413. *C. punctatus*, ovatus, niger subaeneus, thorace obtuse spinoso, tibiis annulo albo. T. 3. p. 269.

C. punctatus. L. S. N. p. 720.

414. *C. griseus nigro-punctatus*, ovatus, griseus albo-marginatus nigroque punctatus, abdomine aeneo-nigro. T. 3. p. 270.

415. *C. rostratus*, ovatus, griseus punctatus, fasciis longitudinalibus fuscis, capite magno triangulari longitudine thoracis. T. 3. p. 271.
t. 14. f. 12. 13.

C. acuminatus. L. S. N. p. 723.

416. *C. sanguineus*, ovatus, rubro-sanguineus, elytris singulis macula nigra, thorace medio scutelloque nigris. T. 7. p. 616. t. 46. f. 1.

Fam. 2.

417. *C. valgus*, oblongus, nigro-fuscus, thorace spinis 2. majoribus, femoribus posticis incurvis, tibiis posticis unidentatis. T. 7. p. 618. t. 46. f. 6.

C. valgus. L. S. N. p. 720.

418. *C. capensis ruber*, oblongus, ruber totus, thorace linea transversa nigra, femoribus rubris apice nigris, elytrorum parte membranacea fusca. T. 7. p. 619. t. 46. f. 7. 8.

419. *C. auriculatus*, oblongo-ovatus fuscus, thorace obtuse angulato, antennis grossis clavatis medio rubris, abdomine supra rubro. T. 3. p. 273.

C. marginatus. L. S. N. p. 719.



420. *C. Hyoscyami*, oblongus, rüber nigro-maculatus, elytrorum parte membranacea fusca immaculata. T. 3. p. 274. t. 14. f. 14 — 16.

C. Hyoscyami. L. S. N. p. 726.

421. *C. equestris*, oblongus, ruber nigro-maculatus, elytrorum parte membranacea fusca albo-maculata. T. 3. p. 276.

C. equestris. L. S. N. p. 726.

422. *C. apterus*, oblongus, ruber nigro-maculatus, elytris abbreviatis, alis nullis. T. 3. p. 276.

C. apterus. L. S. N. p. 727.

423. *C. littoralis*, ovatus, nigricans, dorso gibbo, elytris maculis dilute fuscis diaphanis, alis brevissimis. T. 3. p. 278. t. 14. f. 17 — 21.

C. littoralis. L. S. N. p. 717.

424. *C. Pini*, oblongus, niger, thorace postice elytrisque fuscis punctatis macula nigra. T. 3. p. 278. t. 14. f. 22.

C. Pini. L. S. N. p. 729.

425. *C. Gallarum Ulmi*, oblongus, niger, antennis brevioribus, elytris fuscis macula flavescente albaque. T. 3. p. 279.

426. *C. calcaratus*, oblongus, nigro-fuscus, abdome supra rubro, femoribus posticis subtus dentatis. T. 3. p. 280. t. 14. f. 23. 24.

C. calcaratus. L. S. N. p. 730.

Fam. 3.

427. *C. quisquilius*, oblongus, obscure fuscus, antennis setaceis capillaceis, rostro brevi arcuato. T. 3. p. 281. t. 15. f. 1 — 9.

C. personatus. L. S. N. p. 724.

428. *C. niger rufipes*, oblongus, niger, antennis setaceis capillaceis, rostro brevi arcuato, pedibus

dibus abdominisque lateribus rubro-maculatis. T. 3. p. 286.

C. annulatus. L. S. N. p. 725.

429. *C. subapterus*, oblongus, griseus, antennis setaceis capillaceis, rostro brevi arcuato, alis brevissimis, abdomine nigro-punctato. T. 3. p. 287. t. 15. f. 10 — 12.

430. *C. birtipes*, oblongus, thorace nigro, elytrum basi antennis pedibusque 4. rubris; tibialis anticus nigris hirsutissimis. T. 3. p. 344. t. 35. f. 1 — 3.

C. nigripes. L. S. N. p. 730.

431. *C. femoratus*, oblongus, niger, rostro arcuato, elytris albidis macula alba arcuque nigra, femoribus 4. clavatis rubris. T. 3. p. 346. t. 35. f. 4 — 6.

432. *C. quadrispinosus*, oblongus, ruber, rostro arcuato, capite bispinoso, thorace 4spinoso; abdomine spinis ciliato. T. 3. p. 347. t. 35. f. 7 — 9.

433. *C. multispinosus*, oblongus, fuscus, rostro arcuato, capite thoraceque multispinosis, femoribus anticus crassioribus multidentatis. T. 3. p. 342. t. 35. f. 10. 11.

434. *C. rubro-fasciatus*, oblongo-ovatus, nigro-fuscus, rostro arcuato, thoracis abdominisque margine fasciisque transversis rubris. T. 3. p. 349. t. 35. f. 12.

Fam. 4.

435. *C. leucocephalus*, ovatus, niger, antennis setaceis, capite pedibusque rufo-flavis, T. 3. p. 290.

C. leucocephalus. L. S. N. p. 723.

436. *C. striatus*, oblongus, niger, antennis setaceis, pedibus rubris, thorace macula flava,

elytris flavo-nigroque-striatis. T. 3. p. 290.
t. 15. f. 13 — 15.

C. striatus. L. S. N. p. 730.

437. *C. laevigatus*, oblongus, albo-viridi-griseus,
pedibus anteanisque setaceis nigricantibus,
thorace fasciis 2. nigris, elytris albo-cin-
etis. T. 3. p. 292.

C. laevigatus. L. S. N. p. 730.

438. *C. nigropustulosus*; oblongus, viridis, oculis
nigris, antennis longis setaceis, T. 3.
p. 293.

439. *C. roseo-maculatus*, oblongus, viridis, anten-
nis setaceis, elytris maculis 6. roseis, pedi-
bus rubro-tinctis. T. 3. p. 293.

440. *C. fulvo-maculatus*, oblongus, niger, anten-
nis setaceis, elytris macula fulva, pedi-
bus fuscis nigro-punctatis. T. 3. p. 294.

C. Rolandri. L. S. N. p. 729.

441. *C. flavo-4-maculatus*, oblongus, niger, anten-
nis setaceis, elytris fuscis maculis 2. pedi-
busque flavis. T. 3. p. 291.

Fam. 5.

442. *C. lectularius*, domesticus, apterus. T. 3. p.
296. t. 17. f. 9 — 15.

C. lectularius. L. S. N. p. 715.

443. *C. depresso-Betulae*, ovatus, depresso, nigro-
fuscus, thorace denticulato, capite muri-
cato, elytris foeminae abdomine angustio-
ribus. T. 3. p. 305. t. 15. f. 16 — 19.

C. Betulae. L. S. N. p. 712.

444. *C. grossipes*, depresso, rufo-fuscus, capite tho-
raceque nigris, femoribus anticis crassis
dentatis. T. 3. p. 308. t. 15. f. 20. 21.

C. Abietis. L. S. N. p. 732.

445.

445. *C. Cardui*, depressus, ovatus, griseus nigromaculatus, antennis clavatis, thorace lineis tribus longitudinalibus elevatis. T. 3. p. 309. t. 16. f. 1 — 6.

C. Cardui. L. S. N. p. 718.

446. *C. Scorpio*, ovatus, depressus, angulatus, antennis clavatis, abdomine flavo fascia nigra, pedibus anticis cheliformibus. T. 3. p. 350. t. 35. f. 13 — 15.

C. erosus. L. S. N. p. 718.

Fam. 6.

447. *C. Naja*, aquaticus, linearis, niger, pedibus anticis brevissimis, reliquis longissimis. T. 3. p. 311.

a. *apterus*, apterus, fusco-niger. t. 16. f. 8 — 11.

b. *alatus*, alatus, fusco-niger, ano bidentato. t. 16. f. 7. 13. 16 — 19.

c. *inermis*, alatus, ano mutico. t. 16. f. 12.

C. lacustris. L. S. N. p. 732.

448. *C. Asus*, aquaticus, linearis, niger, capite tereti longissimo, pedibus omnibus aequalibus. T. 3. p. 322. t. 15. f. 24. 25.


C. stagnorum. L. S. N. p. 732.

449. *C. cuticiformis*, linearis, fulvis albo-maculatus, antennis pedibusque 4. posticis longissimis: anterioribus brevissimis. T. 3. p. 323. t. 17. f. 1 — 8.

C. vagabundus. L. S. N. p. 732.

450. *C. longipes*, linearis, fuscus, rostro arcuato, antennis pedibusque longissimis: anticis dentatis. T. 3. p. 352. t. 35. f. 16. 17.

451. *C. tipuloides*, linearis, griseus, antennis rubro-maculatis, femoribus apice rubris, pedibus



dibus omnibus subaequalibus. T. 3. p. 354. t. 35. f. 18.

451. *C. trispinosus*, linearis, griseo-fuscus, antennis longis apice crassioribus, spinis dorsalibus 3. erectis. T. 3. p. 354. t. 35. f. 19. 20.

452. *C. fulvipes*, linearis, nigro-fuscus, pedibus testaceis, femoribus crassis, elytris abdomine brevioribus. T. 3. p. 355. t. 35. f. 21.

Fam. 7.

453. *C. testudo grisea*, ovatus, flavo-griseus, maculis fuscis nigro-punctatis, abdome clypeo integro convexo testo. T. 7. p. 616. t. 46. f. 2. 3.

454. *C. testudo nigra*, ovatus, niger, nitidissimus, antennis pedibusque testaceis, abdome clypeo integro convexo testo. T. 7. p. 617. t. 46. f. 4. 5.

29. *N. S. P. A.*

Fam. 1.

455. *N. Scorpio aquaticus*, grisea, corpore ovato depresso, thorace inaequali. T. 3. p. 361. t. 18. f. 1 — 13.

N. cinerea. L. S. N. p. 714.

456. *N. linearis*, corpore elongato angustissimo, thorace longo, tibiis anticis in medio spina laterali. T. 3. p. 369. t. 19. f. 1 — 7.

N. linearis. L. S. N. p. 714.

457. *N. Naucoris*, ovata, fusca viridi-variegata, abdомinis margine serrato. T. 3. p. 375. t. 19. f. 8 — 13.

N. cimicoides. L. S. N. p. 714.

458. *N. surinamenis*, grisea, fuso-nebulosa, corpore oblongo piano, thorace laevi, pedibus maculatis. T. 3. p. 379.

N. gran-

N. grandis. L. S. N. p. 713.

Fam. 2.

459. *N. Notonecta*, cylindracea, elytris griseo-flavis, margine fusco-punctatis, scutello nigro. T. 3. p. 382. t. 18. f. 16 — 29.

Notonecta glauca. L. S. N. p. 712.

460. *N. striata*, oblonga, nigro-fusca, lineolis transversis numerosissimis griseis striata. T. 3. p. 389. t. 20. f. 1 — 17.

Notonecta striata. L. S. N. p. 712.

30. MANTIS.

461. *M. phthifical*, thorace teretiusculo muricato, elytris brevissimis carinatis, alis longitudo corporis, pedibus inermibus. T. 3. p. 404. t. 36. f. 1.

M. phthisica. L. S. N. p. 689.

462. *M. Baculus*, thorace teretiusculo scabro, elytris brevissimis gibbis, alis abdomine brevioribus, pedibus inermibus. T. 3. p. 405. t. 36. f. 2. 3.

M. Necydalooides. L. S. N. p. 691.

463. *M. precaria*, thorace marginato spinoso, elytris flavis macula fusca, antennis thorace brevioribus, pedibus anticis cheliformibus. T. 3. p. 407. t. 36. f. 4 — 8.

M. precaria. L. S. N. p. 691.

464. *M. hyalina*, thorace marginato laevi, elytria hyalinis innaculatis, antennis nigris thorace longioribus, pedibus anticis cheliformibus. T. 3. p. 410. t. 37. f. 1.

465. *M. Oratoria*, thorace marginato spinoso, elytris viridibus, alis rufescentibus fascia nigra, pedibus anticis cheliformibus. T. 3. p. 410. t. 37. f. 2.

M. Ora-

M. Oratoria. L. S. N. p. 690.

466. *M. brevicornis*, thorace rugoso, alis hyalinis macula marginali rufa, antennis filiformibus brevissimis, pedibus anticis cheliformibus. T. 7. p. 620. t. 46. f. 9. 10.

31. LOCVSTA.

467. *L. viridis contatrix*, viridis immaculata, thorace rotundato, cauda *foeminae* ensifera recta. T. 3. p. 428.

Gryllus T. viridissimus. L. S. N. p. 698.

468. *L. verrucivora*, viridis, elytris fusco-maculatis cauda *foeminae* ensifera recurvata. T. 3. p. 430. t. 21. f. 1 — 17. p. 413.

Gr. T. verrucivorus. L. S. N. p. 698.

469. *L. thalassina*, coeruleo-viridis, antetinis pedibusque flavescentibus, cauda *foeminae* ensifera recurvata. T. 3. p. 433.

Gryllus. L. Faun. Suec. 2283.

470. *L. brachyptera*, griseo-fusca, thorace lineis 2. albis, elytris aliquae ab domine brevioribus. T. 3. p. 434. t. 22. f. 2. 3.

Gr. brachypterus. L. Faun. Suec. 868.

471. *L. griseo-aptera*, grisea, aptera, capite thorace que fasciis 2. nigris. T. 3. p. 436.

472. *L. citrifolia*, viridis, thorace tetrágono marginibus scabro. T. 3. p. 437. t. 37. f. §. 4.

Gr. T. citrifolius. L. S. N. p. 695.

473. *L. sicifolia*, thorace laevi, elytris maximis ovatis erectis foliiformibus, antennis longissimis, tibiis muticis. T. 3. p. 438. t. 37. f. §. 6.

474. *L. cornuta*, viridis, thorace rotundato, capite vertice cornuto ringoso, femoribus spinosissi-

- mosissimis, antennis testaceis elytro brevibus. T. 3. p. 441. t. 37. f. 7.
475. *L. acuminata*, thorace rotundato, vertice cornuto laevi, femoribus spinosis, antennis nigris elytro longioribus. T. 3. p. 442. t. 37. f. 8.
- Gr. *T. acuminatus*. L. S. N. p. 696.
476. *L. tuberculata*, thorace planiusculo, vertice tuberculato laevi, elytris elongatis angustis, antennis testaceis longitudine elytrorum. T. 3. p. 444. t. 32. f. 1.
477. *L. oblongifolia*, thorace subtetragono plano, corpore fusco, elytris viridibus ovatis alae brevioribus, pedibus posticis longissimis. T. 3. p. 445. f. 38. f. 2.
478. *L. curvicauda*, viridis tota, thorace tetragono plano, elytris elongatis ala brevioribus, pedibus posticis longissimis. T. 3. p. 446. t. 38. f. 3.
479. *L. Myrrifolia*, viridis, pedibus testaceis, thorace tetragono plano, elytris ovatis ala acuminata brevioribus. T. 3. p. 447. f. 38. f. 4.
- Gr. *T. myrtifolius*. L. S. N. p. 696.
480. *L. coronata*, thorace spinis erectis coronato, elytris maculis concavis nigris, antennis corpore triplo longioribus. T. 3. p. 448. t. 38. f. 5.
- Gr. *T. coronatus*. L. S. N. p. 697.
481. *L. aquilina*, thorace angulato verrucoso, femoribus atticis muticis, aliis fusco-fasciatis, antennis corpore triplo longioribus. T. 3. p. 449. t. 38. f. 6. f. 39. f. 1.
- Gr. *T. aquilinus*. L. S. N. p. 697.

499. *A. clavicone*, griseo-fuscum, tibiis posticis rubris, antennis clavatis. T. 3. p. 482. t. 23. f. 13. 14.
Gr. *L. rufus*. L. S. N. p. 702.
500. *A. scutellatum*, fuscum punctis 2. nigris, elytris nullis, thoracis scutello abdominis longitudine alas tegente. T. 3. p. 483. t. 23. f. 15. 16.
Gr. *B. bipunctatus*. L. S. N. p. 693.
501. *A. subulatum*, fuscum, elytris nullis, thoracis scutello abdomine longiore alas tegente. T. 3. p. 484. t. 23. f. 17.
Gr. *B. subulatus*. L. S. N. p. 693.
502. *A. hamatum*, elytris nullis, thoracis scutello abdomine longiore: antice hamato, antennis longitudine abdominis. T. 3. p. 503. t. 42. f. 13.
503. *A. verrucosum*, thorace ovato piano dentato verrucofo, elytris alisque fuscis, abdome nigro fasciis albis. T. 3. p. 486. t. 40. f. 6.
Gr. *L. miliaris*. L. S. N. p. 700.
504. *A. albipes*, thorace cristafo: segmento quadruplici, elytris obscure viridibus, alis violaceis; femoribus posticis albo-maculatis. T. 3. p. 487. t. 40. f. 7.
505. *A. roseum*, viride, antennis flavis, alarum dimidia parte tibiisque posticis roseis. T. 3. p. 488. t. 41. f. 1.
506. *A. flavo-fasciatum*, fuscum, capite thorace elytrisque fasciis longitudinalibus flavis. T. 3. p. 488. t. 40. f. 8.
507. *A. sanguinolentum*, capite flavo-rubro-nigroque maculato, thorace flavo, elytris viridibus,

dibus; tibiis rubro-maculatis: T. 3. p. 489. t. 40. f. 9.

§ 68. *A. haematopum*; griseum punctatum; thorace scabro subcristato; femoribus maximis intus nigris; tibiis posticis rubris: T. 3. p. 490. t. 40. f. 10. *A. rubripes* cum sp. 494 non confundendum.

Gr. *L. haematopus*: L. S. N. p. 700.

§ 69. *A. carolinum*, fuscum nebulosum; thorace carinato: segmento unico; alis nigris margine flavis. T. 3. p. 491. t. 41. f. 2. 3.

Gr. *L. carolinus*: L. S. N. p. 701.

§ 70. *A. obscurum*, fuscum; alis rubro-roseis margine nigris macula hyalina alba; tibiis posticis rubris: T. 3. p. 492. t. 41. f. 4.

Gr. *L. obscurus*: L. S. N. p. 701.

§ 71. *A. nigro-fasciatum*, viride maculis fuscis, elytris nigro-maculatis; alis hyalinis virescen-tibus: medio fascia nigra. T. 3. p. 493: t. 41. f. 5.

Gr. *L. flavus*: L. S. N. p. 702.

§ 72. *A. serratum*; viride; thorace cymbiformi carinato denticulato; capite acuminato: T. 3. p. 493. t. 41. f. 6: t. 42. f. 1.

Gr. *B. ferratus*: L. S. N. p. 693.

§ 73. *A. serrato-fasciatum*; viride, fasciis binis longitudinalibus griseis; thorace cymbiformi carinato denticulato; capite acuminato: T. 3. p. 495. t. 42. f. 2.

§ 74. *A. dentatum*, fuscum nebulosum; thorace cymbiformi rugoso; carina laevi; femoribus posticis denticulatis; capite ovato: T. 3. p. 496. t. 42. f. 3.

515. *A. flavo-lineatum*, fuscum, alis viridibus, thorace rotundato laevi, femoribus posticis linea flava. T. 3. p. 497. t. 42. f. 4.
516. *A. femur rubrum*, griseo-fuscum, femoribus posticis subtus rubris: intus flavescentibus nigro-maculatis, tibiis posticis rubris. T. 3. p. 498. t. 42. f. 5.
517. *A. viridi-fasciatum*, viride, thorace carinato, elytris fuscis margine inferiore viridibus, alis nigris basi luteis. T. 3. p. 498. t. 42. f. 6.
518. *A. ensiforme*, viride, capite conico, antennis compressis, alis hyalinis. T. 3. p. 499. t. 48. f. 7.
- Gr. *A. brevicornis*. L. S. N. p. 692.
519. *A. variegatum*, viridi-obscum, alis coeruleis, corpore fasciis maculisque flavis, femoribus basi sanguineis. T. 3. p. 500. t. 42. f. 8.
520. *A. longipenne*, viridi-flavum, capite thorace elytrisque ab domine duplo longioribus fasciis binis nigris. T. 3. p. 501. t. 42. f. 9.
521. *A. acuminatum*, thorace nigro, macula flavo-viridi, elytris fuscis macula viridi, femoribus posticis fasciis tribus nigris. T. 3. p. 501. t. 42. f. 10.
522. *A. aeneo-oculatum*, griseo-fuscum, thorace fasciis binis nigris, elytris unica grisea, femoribus posticis intus tibisque sanguineis. T. 3. p. 502. t. 42. f. 11.
523. *A. punctatum*, griseo-fuscum, elytris lineis punctatis nigris. T. 3. p. 503. t. 42. f. 12.

33. GRYLLVS.

524. *Gr. domesticus*, griseo-fuscus pallidus, capite fasciis transversis fuscis obscuris, T. 3. p. 509. t. 24. f. 1 — 20.

Gr. A. domesticus. L. S. N. p. 694.

525. *Gr. Gryllo-Talpa*, supra fuscus, subtus ferrugineo-flavus, pedibus anticus latis compressis denticulatis. T. 3. p. 517.

Gr. A. Gryllo-Talpa. L. S. N. p. 693.

526. *Gr. Surinamensis*, griseo-fuscus, thorace plano, elytris macula oblonga nigra, pedibus posticis corpore duplo longioribus. T. 3. p. 519. t. 43. f. 1.

527. *Gr. muticus*, capite elytrisque fusco-castaneis, pedibus testaceis, cauda foeminae mutica. T. 3. p. 520. t. 43. f. 2.

528. *Gr. later*, nigro-fuscus, cauda foeminae mutica. T. 3. p. 520. t. 43. f. 3.

529. *Gr. bimaculatus*, niger, elytrorum basi maculis binis flavis, antennis corpore brevioribus. T. 3. p. 521. t. 43. f. 4.

530. *Gr. fasciatus*, fuscus, thorace elytrisque lineis longitudinalibus fulvis. T. 3. p. 520. t. 43. f. 5.

531. *Gr. niveus*, albidus, elytris aliquaque niveis, thorace elongato, antennis femoribusque posticis longissimis. T. 3. p. 522. t. 43. f. 6.

532. *Gr. bipunctatus*, griseo-fuscus, elytris hyalinis puncto fusco, aliis carneis antennisque longissimis, thorace elongato. T. 3. p. 523. t. 43. f. 7.

533. *Gr. testaceus*, flavo-testaceus, antennis corpore triplo longioribus, cauda foeminae

G 2 eni-

~~← →~~
ensifera recurvata. T. 3. p. 524. t. 43.
 f. 8.

Gr. A. misutus. L. S. N. p. 694.

Grylli ignoti pupa fusca. T. 3. p. 524. t. 43. f. 9.

34. BLATTA.

534. *Bl. culinaris*, ferrugineo-fusca, alis maris abdomine brevioribus, foemina aptera. T. 3.
 p. 530. t. 25. f. 1 — 7.

Bl. orientalis. L. S. N. p. 688.

535. *Bl. lapponica*, nigro-fusca, thoracis margine elytrisque dilute griseis nigro-maculatis.
 T. 3. p. 533. t. 25. f. 8 — 15.

Bl. lapponica. L. S. N. p. 688.

536. *Bl. kakkerlak*, ferruginea, thoracis clypeo flavescente: maculis binis margineque postico fusco, abdomine rufo, antennis longissimis. T. 3. p. 536. t. 44. f. 1 — 3.

Bl. americana. L. S. N. p. 687.

537. *Bl. pensylvanica*, fusca, thoracis clypeo albidio: medio nigro-fusco, elytris flavo-fusco antice albidis. T. 3. p. 537. t. 44. f. 4.

538. *Bl. abdomen nigrum*, obscure fusca, abdomine nigro, tarsis flavis, alis longitudine abdominalis. T. 3. p. 538. t. 44. f. 5.

539. *Bl. livida*, fusca, corpore subtus pedibusque fulvo-griseis, alis longitudine abdominalis. T. 3. p. 538. t. 44. f. 6.

540. *Bl. rufa*, oblonga rufa, pedibus testaceis, alis abdominaliæ longioribus. T. 3. p. 539. t. 44. f. 7.

541. *Bl. surinamenis*, fusca, thorace atro nitido: margine antico flavo, pedibus testaceis. T. 3. p. 539. t. 44. f. 8.

Bl.

Bl. surinamensis. L. S. N. p. 687.

542. *Bl. grisea*, oblonga cinereo-grisea, punctis aliquot minutissimis fuscis. T. 3. p. 540. t. 44. f. 9.

543. *Bl. nivea*, livida, pallida, thoracis clypeo elytrisque hyalinis albo-virescentibus, antennis flavis. T. 3. p. 540. t. 44. f. 10.

Bl. nivea. L. S. N. p. 688.

544. *Bl. oblongata*, oblonga, flavo-testacea, thorace fascia punctisque duobus nigris, antennis nigris hirsutissimis. T. 3. p. 541. t. 44. f. 11. 12.

Bl. oblongata. L. S. N. p. 689.

545. *Bl. minutissima*, ovata, nigro-fusca, antennis brevioribus, thoracis lateribus albis hyalinis. T. 3. p. 542. t. 44. f. 13. 14.

35. FORICULA.

546. *F. major*, fusca, pedibus testaceis, antennis articulis quatuordecim. T. 3. p. 545. t. 25. f. 16 — 25.

F. auricularia. L. S. N. p. 686.

547. *F. minor*, fusca, capite thoraceque nigris, pedibus flavis, antennis articulis undecim. T. 3. p. 553. t. 25. f. 26 — 27.


F. minor. L. S. N. p. 686.

36. STAPHYLINUS.

548. *St. murinus*, villosus griseo-fusco-virescens, nigro-nebulosus, abdomine conico maculis nigris, capite maximo. T. 4. p. 13. t. 1. f. 1 — 6.

St. murinus. L. S. N. p. 683.

549. *St. pubescens*, villosus nigro-fuscus, maculis nigris viridi-griseisque nitidis, corpore G 3 subtus



subtus argenteo, abdominis apice subrotundato. T. 4. p. 17.

550. *St. major*, niger totus, alis rufescentibus, abdome elongato planiusculo. T. 4. p. 18.
 551. *St. balteatus*, niger nitidus, abdome subtus elytrisque fascia transversali griseo cinerea: punctis nigris. T. 4. p. 18. t. 1. f. 7 — 10.

St. maxillofus. L. S. N. p. 683.

552. *St. bombilius*, hirsutus niger, capite thorace abdominisque apice viridi flavis nitidis. T. 4. p. 20.

St. hirtus. L. S. N. p. 683.

553. *St. erythropierus*, ater, elytris pedibusque rufis. T. 4. p. 21.

St. erythropterus. L. S. N. p. 683.

554. *St. politus*, niger nitidus, antennis obscure fuscis, abdome elongato. T. 4. p. 22.

St. politus. L. S. N. p. 683.

555. *St. aenococephalus*, obscure fuscus, capite thoraceque aeneis nitidis, tibiis pedibusque rufofuscis. T. 4. p. 23.

556. *St. aeneus*, glaber aeneo-viridis nitidus, abdome pedibusque nigris. T. 4. p. 23.

557. *St. rufas*, capite elytrorum abdominisque posticis nigris. T. 4. p. 24. t. 1. f. 11
— 13.

St. rufus. L. S. N. p. 684.

558. *St. rufipes*, ovatus glaber niger nitidus, pedibus rufis, elytris amplis, abdominis apice tranneato. T. 4. p. 24. t. 1. f. 14.

St. rufipes. L. S. N. p. 685.

559. *St. fulvus*, rufo-flavus postice niger, elytris pedibusque testaceis, antennis longitudine corporis. T. 4. p. 25.

St.

St. caraboides. L. S. N. p. 685.

560. *St. Boleti*, fuscus, antennis pedibusque flavo-lividis pallidis. T. 4. p. 26. t. 1. f. 15
— 17.

St. Boleti. L. S. N. p. 686.

561. *St. riparius*, rufus, elytris coeruleis, capite abdominalisque apice nigris. T. 4. p. 28.
t. 1. f. 18.

St. riparius. L. S. N. p. 684.

37. LAMPYRIS.

562. *L. noctiluca communis*, oblonga, supra nigro-fusca, subtus albido-flava. T. 4. p. 31.
t. 1. f. 19 — 33.

L. noctiluca. L. S. N. p. 643.

563. *L. sanguinea*, nigra, thorace rubro maculis 5.
nigris, elytris rubris, venis reticulatis.
T. 4. p. 45. t. 2. f. 1 — 4.

L. sanguinea. L. S. N. p. 646.

564. *L. nigra-rubra*, nigra, thorace toto nigro,
elytris rubris: venis reticulatis. T. 4.
p. 46.

565. *L. villosa*, nigra, thorace elytrisque villosis
rubris, medio thoracis nigro. T. 4. p. 47.

L. coccinea. L. S. N. p. 646.

566. *L. surinamenis*, ovata, elytris fuscis: ma-
cula marginali triangulari flava, abdomine
subtus fusco apice flavo. T. 4. p. 48. t.
17. f. 1.

L. hespera. L. S. N. p. 644.

567. *L. ignita*, ovata, elytris fuscis: macula mar-
ginali ovata flava, abdomine subtus toto
flavo. T. 4. p. 49. t. 17. f. 2.

L. ignita. L. S. N. p. 645.

568. *L. sitens*, oblonga, elytris pallide fuscis: macula marginali oblonga fusca, abdomine subtus rufo, postice flavo: segmento unice nigro. T. 4. p. 50. t. 17. f. 3.
569. *L. maculata*, ovata testacea, thorace fascia elytrisque macula nigris. T. 4. p. 50. t. 17. f. 4.
570. *L. lucida*, oblonga, elytris fuscis marginē exteriore luteis, abdomine toto subtus flavo. T. 4. p. 51. t. 17. f. 5.
- L. lucida*. L. S. N. p. 645.
571. *L. phosphorea*, oblonga, elytris fuscis marginē exteriore flavis, abdomine atro postice flavissimo, pedibus testaceis. T. 4. p. 51. t. 17. f. 6.
- L. phosphorea*. L. S. N. p. 645.
572. *L. Pyralis*, oblonga, elytris obscure fuscis margine rufescens, abdomine atro postice flavissimo, pedibus fuscis. T. 4. p. 52. t. 17. f. 7.
- L. Pyralis*. L. S. N. p. 644.
573. *L. Pensylvanica*, oblonga, elytris pallide griseo-testaceis, thorace intra marginem nigro: maculis binis rubris. T. 4. p. 52. t. 17. f. 8.
574. *L. Italica*, oblonga, elytris nigro-fuscis, thorace rufo: macula nigra in medio, capite nigro. T. 4. p. 54. t. 17. f. 9 — 11.
- L. Italica*. L. S. N. p. 645.
575. *L. ferrata*, flavo-testacea, elytris striatis reticulatis: fasciis tribus nigris, antennis longissimis ferratis nigris. T. 4. p. 55. t. 17. f. 12.
- Cantharis ferrata*. L. S. N. p. 649.
- 576.

576. *L. pectinata*, atra, antennis pectinatis, thorace lateribus flavis, elytris striatis reticulatis. T. 4. p. 57. t. 17. f. 13 — 14.

Cantharis pectinata. L. S. N. p. 649.

577. *L. rostrata*, ovata, elytris flavo-fulvis antice posticeque nigris, thorace flavo macula nigra, capite rostrato. T. 7. p. 622. t. 46, f. 14 — 13.

38. TELEPHORVS.

578. *T. fusca*, thorace flavo-rubro macula nigra, elytris obscuris cinereo-nigris. T. 4. p. 60. t. 2. f. 5 — 15.

Cantharis fusca. L. S. N. p. 647.

579. *T. flavus*, thorace flavo-rufo, elytris testaceis, femorum posteriorum apice nigro. T. 4. p. 70.

Cantharis livida. L. S. N. p. 647.

580. *T. bimaculatus*, flavo-rufus, elytris testaceis apice nigris. T. 4. p. 71.

581. *T. testaceus*, niger, thorace rufescente macula nigra, elytris testaceis, femoribus nigris tibiisque flavis. T. 4. p. 71.

Cantharis testacea. L. S. N. p. 649.


582. *T. niger*, thorace flavo-rufo, capite elytris que nigris, pedibus totis flavis. T. 4. p. 72.

T. aeneus, viridi-aeneus, elytris extrorsum rubris, capite antice flavo. T. 4. p. 73. t. 16 — 18.

neae. L. S. N. p. 648.

tus, viridi-aeneus nitidus, elytris is. T. 4. p. 75.

L. S. N. p. 648.



585. *T. coeruleus*, villosum violaceo-coeruleum, antennis pedibusque nigris. T. 4. p. 76.
Cantharis coerulea. L. S. N. p. 650.
586. *T. fasciatus*, thorace obscure viridi nitido, elytris nigris, fasciis duabus transversis rubris. T. 4. p. 76.
Cantharis fasciata. L. S. N. p. 648.
587. *T. biguttatus*, niger, femoribus flavis, elytris apice luteis. T. 4. p. 77.
Cantharis biguttata. L. S. N. p. 648.
588. *T. pensylvanicus*, thorace elytrisque rufo-flavis, macula oblonga nigra in singulo elytro, antennis pedibusque nigris. T. 4. p. 78. t. 17. f. 15.

39. COLLIVRIS.

589. *C. surinamensis*, fusca, thorace subulato longissimo arcuato, elytris striatis apice bidentatis, pedibus ferrugineis. T. 4. p. 80. t. 17. f. 16 — 18.
Attelabus surinamensis. L. S. N. p. 619.

40. CARABVS.

Fam. I.

590. *C. aeneo punctatus*, apterus, supra viridi-aenus obscurus, subtus niger, elytris punctis excavatis aureis quadruplici ordine: fulcis elevatis. T. 4. p. 88. t. 3. f. 12.
591. *C. granulatus*, subapterus, supra viridi-aenus, subtus niger, elytris tuberculis elongatis triplici ordine: fulcis elevatis. T. 4. p. 88.
C. granulatus. L. S. N. p. 668.
592. *C. violaceus*, apterus, aeneo-niger nitidus, thorace subviolaceo, elytris punctis minutissimi.

- tissimis excavatis triplici ordine, T. 4.
p. 89.
- C. violaceus. L. S. N. p. 669.
593. *C. coriaceus*, apterus, ater opacus, elytris
punctis intricatis rugosis. T. 4. p. 90.
- C. coriaceus. L. S. N. p. 668.
594. *C. striatus*, apterus, niger, elytris striatis
margin'e violaceis: punctis aureis excava-
tis triplici serie. T. 4. p. 90. t. 3. f. 1—6.
- C. hortensis. L. S. N. p. 668.
595. *C. aureus*, apterus, capite thoraceque aureis,
corpore subtus nigro, elytris viridi-aeneis
margin'e aureis: sulcis elevatis nigris. T.
4. p. 91.
- C. nitens. L. S. N. p. 669.
596. *C. coadunatus*, apterus, niger totus, corpore
ovato brevi, elytris coadunatis scabriuscum-
lis. T. 4. p. 92. t. 3. f. 13. 14.
- Tenebrio caraboides. L. S. N. p. 677.
597. *C. melanocephalus*, apterus, niger nitidus, ely-
tris laevibus, antennis pedibusque flava-
testaceis. T. 4. p. 93.
- C. melanocephalus. L. S. N. p. 671.
598. *C. sulcatus*, apterus, viridi-aeneus nitidus, an-
tennis pedibusque rufis, abdomine nigro,
elytris sulcatis. T. 4. p. 104. t. 17. f. 20.
- C. auratus. L. S. N. p. 669.
599. *C. tuberculatus*, apterus, niger, elytris sca-
bris: tuberculis conicis hirsutis, tibiis ob-
scure ferrugineis. T. 7. p. 623. t. 46.
f. 14.
600. *C. albo-guttatus*, apterus, niger, elytris sulca-
tis thoraceque maculis niveis. T. 7. p.
624. t. 46. f. 15. 16.
- C. decemguttatus. L. S. N. p. 669.

601.

601. *C. elongatus*, apterus, elongatus, niger, thorace cordato angulato, abdomine ovali, elytris profunde sulcatis. T. 7. p. 626. t. 47. f. 1.
602. *C. rugosus*, apterus, niger, thorace rotundato, elytris striis rugosis atomisque aureis. T. 7, p. 627. t. 47. f. 2.

Fam. 2.

603. *C. inquisitor*, alatus, supra aeneo-fuscus, subtus viridi-aureus, elytris striatis margine aeneis: punctis excavatis triplici ordine. T. 4. p. 94.

C. inquisitor. L. S. N. p. 669.

604. *C. ruficornis*, alatus, niger, antennis rufis, pedibus corporeque subtus fusco-caeruleis, elytris striatis. T. 4, p. 95.

605. *C. rufipes*, alatus, fuscus, elytris striatis, corpore subtus rufescente, pedibus antennisque ferrugineis. T. 4. p. 96.

606. *C. nigro-striatus*, alatus, totus niger nitidus, elytris striatis. T. 4. p. 96.

C. leucophthalmos. L. S. N. p. 668.

607. *C. cupreus*, alatus, supra viridi-aeneus, subtus niger, antennis basi rufis. T. 4. p. 97. t. 3. f. 15. 16.

C. cupreus. L. S. N. p. 672.


608. *C. vulgaris*, alatus, supra viridi-aeneus nitidus, subtus niger, pedibus antennisque nigris. T. 4. p. 97.

C. vulgaris. L. S. N. p. 672.

609. *C. aeneus*, alatus, corpore ovato brevi supra nigro-aeneo, subtus nigro, thorace convexo, elytris laevibus, antennis basi rufis. T. 4, p. 98.

610.

610. *C. sexpunctatus*, alatus, capite thoraceque viridi-aureis, elytris rubro-acneis: punctis sex impressis. T. 4. p. 99.
611. *C. cyanoccephalus*, alatus, capite elytrisque viridi-coeruleis, thorace pedibusque ferrugineis. T. 4. p. 100. t. 3. f. 17.
612. *C. latus*, alatus, niger nitidus, elytris striatis, pedibus antennisque rufis. T. 4. p. 101.
613. *C. ferrugineus*, alatus, flavo-griseus nitidus, oculis nigris, elytris striatis. T. 4. p. 102.
614. *C. bimaculatus*, alatus, supra niger subtus flavus, elytris maculis binis, pedibus antennisque flavis. T. 4. p. 102.
615. *C. quadripunctatus*, alatus, niger nitidus, elytris substriatis: punctis quatuor impressis. T. 4. p. 102.
616. *C. crepitans*, alatus, ferrugineus, thorace angusto, elytris cinereo-nigris. T. 4. p. 103. t. 3. f. 18 — 20.
617. *C. Sycophanta*, alatus, nitens, thorace femoribusque violaceis, elytris viridibus striatis, abdомine viridi-aureo. T. 4. p. 109. t. 17. f. 19.
618. *C. americanus*, alatus, niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis, genibus nigris, elytris striatis. T. 4. p. 107. t. 17. f. 21.
619. *C. pennsylvanicus*, rufo-fuscus, capite obscuro, antennis pedibus corporeaque subtus testaceis,



ceis, elytris striatis. T. 4. p. 108. t. 17.
f. 22.

41. CICINDELA.

620. *C. campestris*, viridis, nitida, elytris singulis
punctis sex albis. T. 4. p. 113. t. 4. f.
1 — 6.

C. campestris. L. S. N. p. 657.

621. *C. sylvatica*, supra nigra, subtus viridis nitida,
elytris singulis fascia punctisque tribus al-
bis. T. 4. p. 115. t. 4. f. 7.

C. sylvatica. L. S. N. p. 658.

622. *C. maculata*, supra viridi-grisea nitida, subtus
viridi-aurea, elytris singulis fascia lunu-
lisque duabus albis. T. 4. p. 115. t. 4.
f. 8.

C. hybrida. L. S. N. p. 657.

623. *C. riparia*, viridi-aenea, elytris punctis latis
excavatis griseo-viridibus. T. 4. p. 117.
t. 4. f. 9.

C. riparia. L. S. N. p. 658.

624. *C. striata*; aenea nitidissima, capite striato,
elytris dimidio striatis punctatis: intus lae-
vibus. T. 4. p. 118.

C. aquatica. L. S. N. p. 658.

625. *C. flavipes*, capite thoraceque viridi-aeneis,
elytris pallide fuscis nigro-maculatis, an-
tennis pedibusque flavescentibus. T. 4.
p. 119.

C. flavipes. L. S. N. p. 658.

626. *C. chinensis*, capite corporeque subtus coeru-
leo-violaceis nitidis, elytris viridibus: ma-
culis nigris punctisque quatuor albis. T.
4. p. 119. t. 17. f. 23.

627.

627. *C. carolina*, purpurea nitida viridi-aureo-marginalata, elytroquin apice antenpis pedibusque flavis. T. 4. p. 120. t. 17. f. 24.

628. *C. capensis*, viridi-aenea, elytris albis: lineis maculisque ramosis aeneis. T. 7. p. 628. t. 47. f. 3. 4.

C. capensis. L. S. N. p. 657.

629. *C. marginata*; nigra, thorace elytrisque margine tormentoso flavo-griseo. T. 7. p. 629. t. 47. f. 5.

42. BUPRESTIS.

Fam. 1.

630. *B. mariana*, nitida; supra fusco-aenea, subtus rubro-cuprea, elytris rugosis postice dehiscentibus. T. 4. p. 128. t. 4. f. 18. 19. *B. mariana*. L. S. N. p. 660.

631. *B. chryso-stigma*, fusca, elytris singulis maculis tribus rubro-aureis impressis, abdome subtus viridi-aureo: margine purpureo nitido. T. 4. p. 130.

B. chryso-stigma. L. S. N. p. 660.

632. *B. violacea*, viridi-aenea seu coerulea nitida, elytris striatis. T. 4. p. 130. t. 4. f. 10 — 17.

B. rustica. L. S. N. p. 660.

633. *B. acuminata*, nigra, elytris punctatis pone acuminatis, thorace laevi. T. 4. p. 133.

634. *B. 4-punctata*, subviridi-nigra, thorace punctis quatuor impressa. T. 4. p. 134.

B. 4-punctata. L. S. N. p. 662.

Obs. 633. et 634. ad sequentem forte familiam speciem. Etant.

635. *B. sternicornis*, viridi-aurata, elytris fusco-caeruleis ferrato-tridentatis, thorace punctato,

~~Specie~~
Etato; sternō porrecto. T. 4. p. 135. t. 17. f. 25.

B. sternicornis. L. S. N. p. 660.

636. B. viridi-aenea; viridi-aurea obscura; nitida supra, nigra subtus, elytris ferratis sulcatis. T. 7. p. 631. t. 47. f. 8. 9.

637. B. aeneo-collis, capite thoraceque rubro-cupreis, elytris sulcatis punctatis ferratis eupreto-fuscis. T. 7. p. 632. t. 47. f. 10.

638. B. ruficaudis, nigra, elytris ferratis subfulcatis postice rufis. T. 7. p. 632. t. 47. f. 11.

639. B. rubro-aurea, rubro-cuprea aurata viridescentis, elytris ferratis punctatis; pedibus viridi-aureis. T. 7. p. 635. t. 47. f. 14.

Fam. 2.

640. B. flavo-punctata; nigra, thorace margine flavo, elytris punctis abdomineque subtus maculis flavis quadruplici ordine. T. 4. p. 129.

641. B. albo-punctata, coeruleo-violacea nitida, thoracis lateribus albis, elytris striatis maculis quinque albis. T. 4. p. 132. t. 4. f. 20.

B. octo-guttata. L. S. N. p. 659.

642. B. viridis, viridis nitida, corpore elongata; elytris linearibus scabris integerrimis. T. 4. p. 133. t. 5. f. 1. 2.

643. B. gigantea; viridi-aenae nitidissima, elytris rugoso-sulcatis, thorace maculis binis nigro-aeneis. T. 4. p. 135.

B. gigantea. L. S. N. p. 659.

644. B. linearis; linearis-oblonga; nigro-aenea cinereo-maculata, elytris carinatis, thorace rugoso postice trilobo. T. 4. p. 137. t. 7. f. 26.

B. li-

B. linearis. L. S. N. p. 663.

645. *B. pigmaea*, nigra nitida, elytris coeruleo-violaceis nitidissimis. T. 4. p. 137. t. 17. f. 27.

646. *B. fascicularis*, viridi-aurata obscura, capite thorace elytrisque scabris hirsutissimis, villosis fasciculisque flavis et rubris. T. 7. p. 629. t. 47. f. 6. 7.

B. fascicularis. L. S. N. p. 661.

647. *B. fulgens*, cupreo-aurea nitida, elytris laevibus: maculis quatuor cupreis fasciaque lata transversali testacea. T. 7. p. 633. t. 47. f. 12.

648. *B. aurea*, supra viridi-aurea coerulescens nitidissima, subtus aurea, elytris bidentatis punctatis: sulcis senis fasciaque longitudinali aurea. T. 7. p. 634. t. 47. f. 13.

B. aurulenta. L. S. N. p. 661.

43. ELATER.

649. *E. rufus*, totus rufus, oculis nigris. T. 4. p. 144. t. 5. f. 18.

650. *E. aeneo-peccinicornis*, viridi-aeneus obscurus nitidus, antennis peccinatis. T. 4. p. 145. t. 5. f. 3 — 17.

E. peccinicornis. L. S. N. p. 655.

651. *E. fuscus major*, nigro-fuscus nitidus pedibus fusco-caustaneis, abdomine supra rubente. T. 4. p. 146.

652. *E. fuscus minor*, elongatus, capite thoraceque nigris, elytris obscure fuscis, pedibus antennisque fuscis. T. 4. p. 147.

653. *E. obtusus*, corpore obtuso (brevi) subtus nigro, thorace nigro, elytris fuscis griseo-

H ville.

- villoſis, antennis rufis. T. 4. p. 147. t. 5.
f. 19 — 22.
654. *E. inaequalis*, niger, maculis villoſis griseis,
elytris ſcabris, thorace cavitatibus impref-
ſis. T. 4. p. 148.
655. *E. rufo-unguiculatus*, fuſco-aeneus nitidus, ma-
culis villoſis viridi-griseis, antennis nigris,
unguibus rufis. T. 4. p. 148.
- E. tefſelatus*. L. S. N. p. 655.
656. *E. aeneus rufipes*, viridi-aeneus ſeu violaceus
nitidus, pedibus fulvis. T. 4. p. 149.
- E. aeneus*. L. S. N. p. 655.
657. *E. cruciatus*, pedibus rufis, thorace nigro la-
teribus rubro, elytris fulvis: cruce macu-
lique binis nigris. T. 4. p. 149.
- E. cruciatus*. L. S. N. p. 653.
658. *E. rufipes*, nigro-fuſcus, maculis nebulofo-
villoſis viridi-griseis, plantis (tarſis) rufis.
T. 4. p. 150.
- E. murinus*. L. S. N. p. 659.
659. *E. fuſcus flavipes*, capite thoraceque nigris,
elytris rufo-fuſcis, pedibus flavis, anten-
nis rufis. T. 4. p. 151.
- E. sputator*. L. S. N. p. 654.
660. *E. niger*, totus ater nitidus. T. 4. p. 151.
- E. niger*. L. S. N. p. 656.
661. *E. ſanguineus*, niger, elytris rubris. T. 4.
p. 151.
- E. ſanguineus*. L. S. N. p. 654.
662. *E. balteatus*, niger, elytris antice dimidiato-
rufis, poſtice nigris. T. 4. p. 152.
- E. balteatus*. L. S. N. p. 654.
663. *E. flavo-peſtinicornis*, thorace fuſco pilis rufis,
elytris flavis apice nigris, corpoſe ſubtus
nigro, antennis peſtinatis. T. 4. p. 153.
- E. ca-*

- E. castaneus.* L. S. N. p. 654.
664. *E. ruficollis*, thorace rubro nitido, antice nigro, elytris corporeque nigris. T. 4. p. 153.
- E. ruficollis.* L. S. N. p. 653.
665. *E. variabilis*, thorace rufo, capite corporeque nigris elytris mari flavis, foeminae fuscis flavo-marginatis. T. 4. p. 154.
- E. linearis.* L. S. N. p. 653.
666. *E. undulatus*, griseo-murinus villosum, elytris fasciis tribus undulatis transversis nigris. T. 4. p. 155. t. 5. f. 23 — 26.
667. *E. nigro-maculatus*, capite nigro, thorace rufo: maculis tribus oblongis nigris, elytris pallide fuscis. T. 4. p. 158.
668. *E. lineatus*, thorace nigro margine flavo fuscō, elytris pallide flavo-fuscis: futura nigra. T. 4. p. 158.
- E. trifinis.* L. S. N. p. 655.
669. *E. aeneo-niger*, nigro-viridi-aeneus nitidus, pedibus nigris. T. 4. p. 159.
670. *E. oculatus*, niger, thorace maculis binis ovatis villosis aterrinis. T. 4. p. 159. t. 17. f. 28.
- E. oculatus.* L. S. N. p. 651.
671. *E. noctilucus*, fuscus, thoracis lateribus macula flava glabra convexa nitida. T. 4. p. 160. t. 18. f. 1.
- E. noctilucus.* L. S. N. p. 651.
672. *E. phosphoreus*, fusco-castaneus, thorace postice maculis duabus flavis glabris, antennis pedibusque rufo-fuscis. T. 4. p. 161. t. 18. f. 2.
- E. phosphoreus.* L. S. N. p. 651.
673. *E. picus*, totus ater nitidus, elytris laevissimis. T. 4. p. 162. t. 12. f. 3.

674. *E. lividus*, pallide fusco-rufescens, antennis rufis pedibusque flavo-testaceis. T. 4. p. 162. t. 18. f. 4.
675. *E. flavipes*, nigro-fuscus, pedibus antennisque flavo-testaceis. T. 4. p. 163. t. 18. f. 5.
676. *E. maculatus*, obscure testaceus, thorace ante nigro, singulo elytro maculis binis irregularibus nigris. T. 4. p. 163. t. 18. f. 6.

44. SILPHIA.

677. *S. Vespollo*, nigra, elytris truncatis abdomine brevioribus: fascia lata dupli ferruginea transversa undata. T. 4. p. 168. t. 6. f. 1 — 3. 5 — 6.

S. Vespollo. L. S. N. p. 569.

678. *S. nigra major*, tota atra, elytris truneatis ab domine brevioribus. T. 4. p. 173. t. 6. f. 4.

S. germanica. L. S. N. p. 569.

679. *S. thoracica*, nigra, thorace ferrugineo, elytris lineis tribus longitudinalibus: unica elevata. T. 4. p. 174. t. 6. f. 7 — 9.

S. thoracica. L. S. N. p. 574.


680. *S. rufo-clavata*, oblonga, nigra, thorace orbiculato nitido, elytris lineis elevatis tribus, clava antennarum rufa. T. 4. p. 176.

S. littoralis. L. S. N. p. 570.

681. *S. punctata*, nigra, nitida, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevibus, clava antennarum nigra. T. 4. p. 177. t. 6. f. 10 — 19.

S. atrata. L. S. N. p. 571.

682. *S. quadripunctata*, corpore nigro, thorace testaceo: macula magna nigra, elytris flavo-testaceis: punctis duobus nigris. T. 4.
p. 181.
- S. quadripunctata*. L. S. N. p. 571.
683. *S. rugosa*, nigra opaca, elytris tuberculatis: lineis tribus elevatis inaequalibus. T. 4.
p. 182. T. 7. p. 60c. t. 44. f. 20 — 25.
- S. rugosa*. L. S. N. p. 571.
684. *S. tomentosa*, villosa, supra nigro-fusca, subtus atra, capite tomentosa, elytris lineis tribus elevatis. T. 4. p. 183.
685. *S. cimicoides*, supra fusco-eastanea rufo-marginata, subtus rufa, elytris lineis senis punctisque excavatis. T. 4. p. 183.
- S. ferruginea*. L. S. N. p. 572.
686. *S. maculata*, supra rufo-fusca nigro-maculata, subtus rufa immaculata. T. 4. p. 184.
- S. grisea*. L. S. N. p. 574.
687. *S. oblonga*, oblonga, fusco-nigra, elytris lineis octo elevatis punctisque excavatis. T. 4. p. 185.
- S. oblonga*. L. S. N. p. 572.
688. *S. quadripustulata*, nigra, oblonga, depressa, elytris singulis maculis duabus rubris. T. 4. p. 185. t. 6. f. 20. 21.
- S. quadripustulata*. L. S. N. p. 570.
689. *S. bipustulata*, nigra, corpore obtuso, (brevi) elytris singulis macula unica rubra. T. 4.
p. 186. t. 6. f. 22. 23.
- S. bipustulata*. L. S. N. p. 570.
690. *S. Colon*, rufo-fusca nigro-maculata, thorace dupli puncto impresso, corpore subtus toto fusco. T. 4. p. 187. t. 6. f. 24.
- S. Colon*. L. S. N. p. 573.



691. *S. rufipes*, supra nigra, subtus fusca, pedibus rufis, elytris laevis. T. 4. p. 188.

45. DERMESTES.

692. *D. lardarius*, niger, elytris antice cinereis nigro-punctatis. T. 4. p. 192. t. 7. f. 1 — 17.

D. lardarius. L. S. N. p. 563.

693. *D. nebulosus*, niger cinereo-nebulosus, corpore subtus albido-cinerascente, scutello hirsuto rufo. T. 4. p. 197.

D. murinus. L. S. N. p. 563.

694. *D. bipunctatus*, ovatus, niger, elytris singulis puncto albo. T. 4. p. 197.

D. Pellio. L. S. N. p. 562.

695. *D. tomentosus*, oblongus, villosus, griseo-murinus, oculis nigris, pedibus fulvis. T. 4. p. 199. t. 7. f. 18. 19.

696. *D. undatus*, oblongus, niger, elytris fascia alba dupli transversa undulata. T. 4. p. 199.

D. undatus. L. S. N. p. 562.

697. *D. Scrophulariae*, ovatus, niger, maculis squamosis albis, futura elytrorum rubra. T. 4. p. 200. t. 7. f. 20 — 22.

Byrrhus Scrophulariae. L. S. N. p. 568.

698. *D. Muscorum*, ovatus, fuscus obscurus, maculis squamosis griseis. T. 4. p. 203. t. 8. f. 1 — 14.

Byrrhus Muscorum. L. S. N. p. 568.

699. *D. Pilula*, ovatus, supra nigro-aeneus, subtus totus niger, elytris fasciis interruptis aeneis. T. 4. p. 213. t. 7. f. 23 — 26.

Byrrhus Pilula. L. S. N. p. 568.

700. *D. fornicatus*, fuscus obscurus, corpore ovato laevi fornicato, anteninis longissimis: clava subulata. T. 4. p. 216. t. 8. f. 15.

Obs. An potius Ptini species vel forte distinctum genus.

701. *D. atomarius*, ovatus, minutissimus, nigro-fuscus, antennis corporis dimidia longitudine: apice hirsutissimis. T. 4. p. 218. t. 8. f. 16 — 20.

702. *D. Armadillus*, minutissimus, ovatus, niger nitidus, thoracis marginibus pedibusque rufo-fuscis pallidis. T. 4. p. 220. t. 8. f. 21 — 23.

703. *D. ater*, ovatus, nigro-fuscus, antennis rufis. T. 4. p. 223. t. 18. f. 7.

704. *D. maculatus*, ovatus, fuscus, thoracis lateribus cinereis abdomine subtus albo-nigroque maculato, antennis rufis. T. 4. p. 223.

705. *D. hemipterus*, nigro-fuscus, elytris abbreviatis pallide griseis fascia transversa undulata nigra, pedibus rufis. T. 4. p. 224.

D. hemipterus. L. S. N. p. 565.

46. PTINVS.

706. *Pt. pertinax*, nigro-fuscus, elytris striatis, thorace ad angulos macula flava. T. 4. p. 227. t. 8. f. 24 — 28.

Pt. pertinax. L. S. N. p. 565.

707. *Pt. rufo-villosus*, rubro-fuscus villosus, oculis nigris. T. 4. p. 230.

708. *Pt. punctatus*, griseo-fuscus, elytris striatis punctis excavatis. T. 4. p. 230.



709. *Pt. mollis*, rufo-fuscus, oculis nigris, elytrorum apice rufo. T. 4. p. 230. t. 8. f. 29
— 31.

Pt. mollis. L. S. N. p. 565.

710. *Pt. rapax*, ovatus, rufo-fuscus albedine maculatus, thorace angulato villis flavis, antennis longitudine corporis. T. 4. p. 231. t. 9. f. 1 — 7.

Pt. Fur. L. S. N. p. 566.

711. *Pt. testaceo-villosum*, oblongus, griseo-testaceus villosus, antennis pedibusque rufis. T. 4. p. 235. t. 9. f. 8 — 9.

47. SCARABAEVS.

Fam. I.

712. *Sc. nasicornis*, scutellatus, fusco-castaneus, elytris laevibus, thorace gibbo, capite cornu incurvato. T. 4. p. 255.

Sc. nasicornis. L. S. N. p. 544.

713. *Sc. lunaris*, exscutellatus, fusco-castaneus, thorace gibbo, elytris sulcatis, capitum clypeo lunato: cornu erecto. T. 4. p. 257. t. 10. f. 1.

Sc. lunaris. L. S. N. p. 543.

714. *Sc. cylindricus*, scutellatus, cylindricus, niger, capite cornu incurvato, thorace ante truncato quinquedentato. T. 4. p. 258. t. 10. f. 2. 3.

Sc. cylindricus. L. S. N. p. 544.

715. *Sc. stercorearius*, scutellatus, supra niger, subitus violaceus, elytris sulcatis, antennis rufis, capite tuberculato. T. 4. p. 259. t. 9. f. 10 — 26.

Sc. stercorearius. L. S. N. p. 550.

716.

716. *Sc. vernalis*, scutellatus, violaceus totus, elytris glabris laevissimis, antennis nigris, capite tuberculato. T. 4. p. 262. t. 10. f. 4.
Sc. vernalis. L. S. N. p. 551.
717. *Sc. Typhoeus*, scutellatus, niger, elytris sulcatis, thorace cornubus tribus incumbentiibus. T. 4. p. 262. t. 10. f. 5.
Sc. Typhoeus. L. S. N. p. 543.
718. *Sc. capitatus*, scutellatus, nigro-fuscus, corpore oblongo, elytris striatis, capite magno laevi. T. 4. p. 263. t. 10. f. 6.
- Sc. rufipes.* L. S. N. p. 559.
719. *Sc. Fosfor*, scutellatus, oblongus, ater, capite magno tuberculis tribus. T. 4. p. 264. t. 10. f. 7.
Sc. Fosfor. L. S. N. p. 548.
720. *Sc. nuchicornis*, exscutellatus, ater, corpore ovato brevi, elytris griseis nigro-maculatis, occipite maris spina armato. T. 4. p. 265.
Sc. nuchicornis. L. S. N. p. 547.
721. *Sc. pedellus*, scutellatus, oblongus, niger, elytris sulcatis rubris, thorace antice maculis binis rufis. T. 4. p. 266. t. 10. f. 8. 9.
Sc. fimetarius. L. S. N. p. 548.
722. *Sc. fimetarius*, scutellatus, oblongus, niger, pedibus fuscis, capite laevi, elytris griseis: maculis linearibus nigris. T. 4. p. 267. t. 10. f. 10. 11.
Sc. fimetarius. L. S. N. p. 548. 3.
723. *Sc. subterraneus*, exscutellatus, oblongus, niger totus, capite tuberculis tribus, elytris profunde sulcatis. T. 4. p. 268.
Sc. subterraneus. L. S. N. p. 548.

724. *Sc. conspurcatus*, scutellatus, nigro-fuscus, thoracis margine fulvo, elytris striatis fulvis: maculis binis nigris, antennis rufis. T. 4. p. 268.
- Sc. conspurcatus*. L. S. N. p. 549.
725. *Sc. femoratus*, scutellatus, niger, corpore ova-
to, elytris rugosis futuris quatuor, femo-
ribus anticis maximis. T. 4. p. 269. t. 10,
f. 12.
- Sc. fabulosus*. L. S. N. p. 551.
726. *Sc. erraticus*, scutellatus, niger, elytris testa-
ceis substriatis, capite tuberculo unico, an-
tennis nigris. T. 4. p. 270.
- Sc. erraticus*. L. S. N. p. 548.
727. *Sc. ater*, scutellatus, niger totus, corpore ab-
breviato, capite tuberculis tribus, elytris
leviter striatis. T. 4. p. 270.
728. *Sc. haemorrhoidalis*, scutellatus, niger, elytris
profunde fulcatis apice rufis. T. 4. p. 271.
- Sc. haemorrhoidalis*. L. S. N. p. 548.
729. *Sc. quisquilius*, exscutellatus, niger nitidus,
elytris striatis livido-testaceis. T. 4. p. 271.
- Sc. quisquilius*. L. S. N. p. 558.
730. *Sc. Aloëus*, scutellatus, niger, thorace tricor-
ni: intermedio longiore recurvato. T. 4.
p. 302.
- Sc. Aloëus*. L. S. N. p. 543.
731. *Sc. Hercules*, scutellatus, niger, elytris griseis nigro-maculatis, thorace cornu incur-
vo maximo subtus bidentato, capitis recur-
vato multidentato. T. 4. p. 304. t. 18.
f. 9.
- Sc. Hercules*. L. S. N. p. 541.
732. *Sc. Tityus*, scutellatus, griseus nigro-macula-
tus, capite unicorni recurvato, thorace tri-

tricorni incurvato. T. 4, p. 306. t. 18. f. 10.

Sc. Tityus. L. S. N. p. 543.

733. Sc. *Moloßus*, exscutellatus, niger, capitis clypeo lunato unicornj, thorace retuso bidentato utrinque impresso, elytris laevibus. T. 4. p. 307. t. 18. f. 11.

Sc. Molossus. L. S. N. p. 543.

734. Sc. *Pensylvanicus*, scutellatus, capite nigro tuberculo unico, thorace elytrisque laevibus olivaceis: maculis punctisque nigris. T. 4. p. 309. t. 18. f. 12.

735. Sc. *Carolinus*, exscutellatus, niger, capite ovali tuberculato, thorace retuso bituberculato utrinque impresso, elytris sulcatis. T. 4. p. 310. t. 18. f. 13.

Sc. Carolinus. L. S. N. p. 545.

736. Sc. *cristatus*, exscutellatus, fusco-caſtaneus nigricans, thorace gibbo: in medio margine angulato, capite lamella angulata elevata. T. 7. p. 636. t. 47. f. 15.

Sc. Gigas. L. S. N. p. 549.

737. Sc. *tricornutus*, exscutellatus, niger splendens, capitis clypeo lunato: cornu recto, thorace retuso: cornubus duobus porrectis. T. 7. p. 637. t. 47. f. 16.

738. Sc. *quadridentatus*, exscutellatus, niger splendidus, capitis clypeo lunato: cornu recurvato denticulato, thorace retuso quadridentato. T. 7. p. 638. t. 47. f. 17.

739. Sc. *crenatus*, exscutellatus, niger, capitis clypeo lunato margine antice denticulato, thorace elytrisque laevibus. T. 7. p. 638. t. 47. f. 18.

740. *Sc. pilularius*, exscutellatus, niger glaber, capite magno depresso, thorace postice rotundato. T. 4. p. 311. t. 18. f. 14.
- Sc. pilularius*. L. S. N. p. 550.
741. *Sc. festivus*, exscutellatus, capite lunato nigro, thorace convexo rubro maculis nigris, elytris rubro-aeneis fulcatis. T. 4. p. 315. t. 18. f. 15.
- Sc. festivus*. L. S. N. p. 552.
742. *Sc. ebenus*, scutellatus, ater, oblongus, convexus, laevis, thorace antice cavitate impresso, capite bituberculato. T. 4. p. 317. t. 19. f. 1.
743. *Sc. tuberculatus*, scutellatus, oblongus, griseocinereus, elytris tuberculis pilosis, femoribus anticis maximis, capite recondito. T. 4. p. 318. t. 19. f. 2.
744. *Sc. nanus*, scutellatus, oblongus, nigro-fuscus, capite lato, elytris striatis, antennis rufis. T. 4. p. 318. t. 19. f. 3.
- Fam. 2.
745. *Sc. Fullo*, scutellatus, niger s. rufus, maculis sparsis albidis squamosis, antennis heptaphyllis. T. 4. p. 273. t. 10. f. 13.
- Sc. Fullo*. L. S. N. p. 553.
746. *Sc. Melolontha*, scutellatus, rufo-fuscus, thorace villoso, abdominis lateribus albo-maculatis, cauda acuta inflexa. T. 4. p. 273. t. 10. f. 14.
- Sc. Melolontha*. L. S. N. p. 554.
747. *Sc. solstitialis*, scutellatus, villosus, griseo-testaceus, capite nigro, pedibus fulvis, abdominis lateribus albo-maculatis. T. 4. p. 276. t. 10. f. 15.
- Sc. solstitialis*. L. S. N. p. 554.

748. *Sc. aeneus*, scutellatus, viridis nitidus, elytris fulcatis. T. 4. p. 277. t. 10. f. 16.
749. *Sc. fulvus*, scutellatus, flavo-rufus; oculis nigris, thorace punctis binis nigris, pedibus longissimis. T. 4. p. 277. t. 10. f. 17.
- Sc. brunnus.* L. S. N. p. 556.
750. *Sc. viridicollis*, scutellatus, elytris obscure flavis, capite thoraceque violaceis s. viridibus nitidis, pedibus nigris. T. 4. p. 278. t. 10. f. 18.
- Sc. horticola.* L. S. N. p. 554.
751. *Sc. Chrysis*, scutello longissimo, corpore ovato convexo: supra viridi-nitente, infra viridae aeneo, pectore porrecto. T. 4. p. 319. t. 19. f. 4.
- Sc. Chrysis.* L. S. N. p. 551.
752. *Sc. lineola*, scutellatus, niger nitidus flavo-maculatus, capite thoraceque linea flava, thoracis margine flavo. T. 4. p. 320. t. 19. f. 5.
- Sc. lineola.* L. S. N. p. 552.
753. *Sc. nigrocephalus*, scutellatus, rufo-lividus, capite rufo postice nigro, corpore oblongo subtus fusco. T. 4. p. 521. t. 19. f. 6.
754. *Sc. gibbosus*, scutellatus, fusco-castaneus, corpore oblongo subtus villoso rufo, thorace tuberculato, elytris striato-punctatis. T. 4. p. 322. t. 19. f. 7.
- Fam. 3.*
755. *Sc. Smaragdus*, scutellatus, viridi-aureus, elytris glabris: lineis transversis albidis, pectore porrecto lateribus unidentatis. T. 4. p. 279. t. 11. f. 1 — 27.
- Sc. auratus.* L. S. N. p. 557.

756. *Sc. viridulus*, scutellatus aureo-viridis nitidus,
elytris rugosis, abdomine postice albedine
maculato. pectore mutico. T. 4. p. 297.
- Sc. nobilis*. L. S. N. p. 558.
757. *Sc. fasciatus*, scutellatus niger, tomentoso-fla-
vus, elytris fasciis duabus transversis luteis
coadunatis. T. 4 p. 299. t. 10. f. 19. 20.
- Sc. fasciatus*. L. S. N. p. 556.
758. *Sc. coriarius*, scutellatus aeneo-niger, nitidus,
corpo planiusculo glabro, thorace futu-
ris binis totidemque tuberculis. T. 4. p.
300. t. 10. f. 21.
759. *Sc. albo-punctatus*, scutellatus, niger albo-pun-
ctatus, corpore depresso. T. 4. p. 301. t.
10. f. 22.
- Sc. variabilis*. L. S. N. p. 558.
760. *Sc. farinosus*, scutellatus niger, squamulis gri-
feo-viridibus, corpore depresso. T. 4. p.
302. t. 10. f. 23.
- Sc. farinosus*. L. S. N. p. 555.
761. *Sc. nitidus*, scutello minimo, viridis obscurus,
thorace angulato elytrisque flavo-margina-
tis, capite spina recumbente. T. 4. p.
322. t. 19. f. 8. 9.
- Sc. nitidus*. L. S. N. p. 552.
762. *Sc. marginatus*, scutellatus niger, thorace ely-
trisque fascia marginali flavo-fulva. T. 4.
p. 324. t. 19. f. 10.
763. *Sc. punctato-marginatus*, scutellatus niger, tho-
race fascia marginali flavo-fulva; puncto ni-
gro, elytris maculis quatuor marginique
flavo-fulvis. T. 7. p. 639. t. 47. f. 20.
764. *Sc. carbonarius*, scutellatus, totus niger nitidus,
corpore depresso, elytris glaberrimis:
areis excavatis. T. 4. p. 324.

765. *Sc. bimaculatus*, scutellatus fusco-caeruleus, nitens, elytris singulis macula magna irregulari flava. T. 7. p. 639. t. 47. f. 19.
766. *Sc. rufus*, scutellatus, supra rufus, subtus niger nitidus, abdomine maculis lateralibus niveis. T. 7. p. 640. t. 48. f. 1.
767. *Sc. albo-guttatus*, scutellatus, obscure rubropurpureus, capite nigro, thorace linea alba marginali elytrisque punctis albis. T. 7. p. 640. t. 48. f. 2. *Sc. aibo-punctatus*.
- Sc. capensis*. L. S. N. p. 556.
768. *Sc. cinctus*, scutellatus flavo-griseus, thorace elytrisque flavo-cinctis, corpore subtus niger maculis albis. T. 7. p. 641. t. 48. f. 3.
769. *Sc. balteatus*, scutellatus niger, elytris medio rufis. T. 7. p. 642. t. 48. f. 4.
770. *Sc. ruficollis*, scutellatus nitidus, thorace podiceque rufo-fuscis, elytris striatis viridi-aureatis: apice puncto albo. T. 7. p. 642. t. 48. f. 5.
771. *Sc. ruber*, scutellatus nitidus, thorace elytrisque striatis rubris, capite pedibus corporeque subtus nigris. T. 7. p. 643. t. 48. f. 6.
772. *Sc. cinereo-nebulosus*, scutellatus niger, thorace elytrisque fasciis et maculis nebulosis cinereis. T. 7. p. 643. t. 48. f. 7.
773. *Sc. tomentosus*, scutellatus, hirsutus, capite thoraceque viridi-aureis, villis flavis, elytris testaceis: lineis tribus nigro-viridibus. T. 7. p. 644. t. 48. f. 8.
774. *Sc. Stigma*, scutellatus, hirsutissimus, capite thoraceque nigris, elytris abbreviatis obscure testaceis: apice macula flava, podice flavo-villoso. T. 7. p. 645. t. 48. f. 9.

775.

775. *Sc. quadratus*, scutellatus, hirsutus, thorace nigro flavo-marginato, elytris abbreviatis fulvis: intus margine flavo, corpore subtus villis albidis. — T. 7. p. 645. t. 48. f. 10. 11.
776. *Sc. obscure purpureus*, scutellatus, villosus, thorace nigro elytrisque obscure purpureis: maculis albis sparsis, abdomine subtus albo. — T. 7. p. 646. t. 48. f. 12.

48. LVCANVS.

777. *L. Cervus*, fusco-castaneus, maxillis maximis corniformibus ramosis apice bifurcatis. T. 4. p. 327. t. 12. f. 1 — 6.
L. Cervus. L. S. N. p. 559.
Foemina? T. 4. p. 331. t. 12. f. 7. 8.
L. Cervus. L. S. N. p. 560. 1. 8.
 778. *L. Parallelipedus*, niger, corpore depresso, capite tuberculis duobus laevibus. T. 4. p. 334. t. 12. f. 9. 10.
L. parallelipedus. L. S. N. p. 561.
 779. *L. Caprea*, viridi-coerulescens nitidus, depresus, maxillis magnis exsertis. T. 4. p. 335. t. 12. f. 11.
L. Caraboides. L. S. N. p. 561.
 780. *L. Capreolus*, fusco-castaneus, femoribus flavis, maxillis maximis corniformibus apice simplicibus latere unidentatis. T. 4. p. 336. t. 19. f. 11. 12.
L. Capreolus. L. S. N. p. 560.
 781. *L. interruptus*, oblongus, niger, depresso, antennis arcuatis, capite tridentato, elytris sulcatis, thorace abdominali que remotis. T. 4. p. 338. t. 19. f. 13.
L. interruptus. L. S. N. p. 560.

49. Hi-

49. HISTER.

782. *H. ater*, niger nitidus, elytris striatis. T. 4.
p. 342. t. 12. f. 12 — 16.

H. unicolor. L. S. N. p. 567.

783. *H. bimaculatus*, niger nitidus, elytris singulis
macula obscure rubra. T. 4. p. 343.

H. bimaculatus. L. S. N. p. 567.

784. *H. quadrimaculatus*, niger nitidus, elytris sin-
gulis maculis binis obscure rubris. T. 4.
p. 344,

H. quadrimaculatus. L. S. N. p. 567.

785. *H. pygmaeus*, nigro-fuscus, elytris dimidio-
striatis. T. 4. p. 344.

H. pygmaeus. L. S. N. p. 567.

786. *H. testudinarius*, ovatus, niger, glaber, pedi-
bus fuscis, elytris antice macula rubra
postice fulva. T. 4. p. 345. t. 12. f. 17
— 19.

Dermestes Scaraboides. L. S. N. p. 563.

50. ATTICLABVS.

787. *A. Fosfor*, niger nitidus, elytris sulcatis, ti-
biis anticis palmato-spinaosis. T. 4. p. 350.
t. 13. f. 1 — 3.

Tenebrio Fosfor. L. S. N. p. 675.

788. *A. glaber*, fusco-caffaneus, nitidissimus, ely-
tris glabris, maxillis magnis arcuatis. T.
4. p. 392. t. 19. f. 14 — 16.

51. GYRINVS.

789. *G. natator*, coeruleo-ater nitidus, pedibus ru-
fis. T. 4. p. 355. t. 13. f. 4 — 20.

G. natator. L. S. N. p. 567.

52. HYDROPHILUS.

790. *H. ruficornis*, niger, capitulo antennarum rufo, elytris laevibus, abdome postice acuminato. T. 4. p. 371. t. 14. f. 1 — 11.
Dytiscus piceus. L. S. N. p. 664.
791. *H. nigricornis*, niger, capitulo antennarum nigro, elytris laevibus, abdome postice rotundato. T. 4. p. 376.
Dytiscus Catabooides. L. S. N. p. 664.
792. *H. fuscipes*, niger, capitulo antennarum nigro, elytris striatis, pedibus fusco-castaneis. T. 4. p. 377.
Dytiscus fuscipes. L. S. N. p. 664.
793. *H. fuscus*, corpore convexo supra fusco subtus nigro, capitulo antennarum oblongo, elytris striatis. T. 4. p. 378. t. 15. f. 1 — 4.
Dytiscus luridus. L. S. N. p. 665.
794. *H. aeneus*, viridi-aeneus, thorace virescente sulcato, elytris punctato-striatis, antepenis pedibusque rufis. T. 4. p. 379. t. 15. f. 5. 6. 7.
Silpha aquatica. L. S. N. p. 573.

53. DYTISCUS.

795. *D. latissimus*, nigro-fuscus, thorace margine flavo, elytrorum marginibus dilatatis linea transversa flava. T. 4. p. 390.
D. latissimus. L. S. N. p. 665.
796. *D. toro-marginalis*, nigro-fuscus nitidus, thorace undique elytrorumque margine flavis, elytris foeminae sulcatis. T. 4. p. 391. t. 16. f. 1 — 8.
Mas D. marginalis. L. S. N. p. 665.
Fem. D. semistriatus. L. S. N. p. 665.

797. *D. laterali-marginalis*, supra viridi-nigra, sub-
tus rufus, capite thoracis marginibus ely-
trisque flavo-marginatis. T. 4. p. 396.
798. *D. fasciatus*, elytris fuscis, thorace fulvo fa-
sciis duabus transversis nigris latere conna-
tis, abdomine subtus fulvo lineis nigris.
T. 4. p. 397.
- Mas D. cinereus.* L. S. N. p. 666.
- Fem. D. sulcatus.* L. S. N. p. 666.
799. *D. transverse-striatus*, supra nigro-fuscus, sub-
tus niger, elytris transverse subtilissime
striatis. T. 4. p. 399. t. 15. f. 16.
- D. striatus.* L. S. N. p. 665.
800. *D. bilineatus*, elytris fuscis, corpore subtus
fulvo, thorace fulvo: litiae duplii nigra.
T. 4. p. 400.
801. *D. feminiger*, thorace elytrisque obscure fuscis
rufo-marginatis, corpore subtus toto nigro.
T. 4. p. 401.
802. *D. ater*, corpore convexo, nigro tota, pe-
dibus antennisque rufo-fuscis. T. 4. p.
401.
803. *D. sphaericus*, rufo-fuscus, corpore ovato gib-
bo. T. 4. p. 402. t. 15. f. 17 — 20.
- D. ovatus.* L. S. N. p. 667.
804. *D. clavicornis*, viridi-griseus, antennis subcla-
vatis, abdome subtus nigro-fusco. T. 4.
p. 402.
805. *D. griseo-striatus*, niger, supra inaculis striis-
que griseis, pedibus rufo-fuscis. T. 4.
p. 403.
806. *D. erythrocephalus*, ovato-oblongus niger, ca-
pite pedibusque rufo-fuscis. T. 4. p. 404.
- D. erythrocephalus.* L. S. N. p. 666.

~~132~~

807. *D. ruficollis*, rufus, elytris striatis flavo-gri-
feis: maculis nigris. T. 4. p. 404. t. 16.
f. 9 — 10.

D. minutus. L. S. N. p. 667.

808. *D. byalinus*, virescens, elytris hyalinis macu-
culis lateralibus albidis. T. 4. p. 406. t.
15. f. 21 — 23.

54. CANTHARIS.

Fam. 1.

809. *C. Proscarabaeus*, aptera, violaceo-nigra. T.
5. p. 3. t. 1. f. 1 — 8.

Meloë Proscarabaeus. L. S. N. p. 679.

Fam. 2.

810. *C. vesicatoria*, alata, viridi-aurea nitidissima,
antennis nigris. T. 5. p. 12. t. 1. f. 9
— 12.

Meloë vesicatorius. L. S. N. p. 679.

811. *C. viridis*, alata, viridi-aenea nitida, antennis
nigris, thorace tereti elongato. T. 5. p.
15. t. 1. f. 13.

C. viridissima. L. S. N. p. 650.

812. *C. Pensylvanica*, alata, nigra tota. T. 5. p.
16. t. 13. f. 1.

813. *C. Cichorei*, alata, nigra, hirsuta, elytris fa-
sciis tribus transversis flavis, antennis cla-
vatis longitudine thoracis. T. 5. p. 17. t.
13. f. 2. 3.

Meloë Cichorei. L. S. N. p. 680.

814. *C. bifasciata*, alata, nigra, hirsuta, elytris
antice macula rotunda fasciisque binis trans-
versis flavis, antennis clavatis thorace lon-
gioribus. T. 7. p. 647. t. 48. f. 12.

815

815. *C. capensis*, alata, nigra, hirsuta, elytris maculis sex flavis: prima arcuata, antennis nigris clavatis. T. 7. p. 648. t. 48. f. 14.

Meloë capensis. L. S. N. p. 680.

816. *C. undato-bifasciata*, alata, nigra, hirsuta, elytris antice macula arcuata fasciisque binis undatis flavis, antennis nigris clavatis. T. 7. p. 649. t. 48. f. 15. 16.

817. *C. fulva*; alata, nigra, elytris fulvis. T. 7. p. 650. t. 48. f. 17.

Meloë algiricus. L. S. N. p. 681.

818. *C. viridi-aurea*, alata, viridi-aurea, elytris fulvis. T. 7. p. 650. t. 48. f. 18.

55. PYROCHROA.

819. *P. rubra*, nigra, thorace orbiculato depresso, elytrisque rubris, antennis pectinatis. T. 5. p. 20. t. 1. f. 14 — 17.

Canthiaris pectinicornis. L. S. N. p. 650.

820. *P. bimaculata*, nigra, thorace orbiculato depresso, elytris fulvis puncto nigro, antennis simplicibus. T. 5. p. 23. t. 1. f. 18. 19.

Meloë bimaculatus. L. S. N. p. 680.

821. *P. rufa*, nigra, thorace angulato, elytris striatis flavo-rufis, antennis dentatis. T. 5. p. 23. t. 1. f. 20 — 22.

822. *P. nigra*, nigra nitida, corpore ovato, thorace convexo, antennis pedibusque fulcis. T. 5. p. 25. t. 1. f. 23. 24.

823. *P. somentosa*, fusca, antennis rufis, elytris punctato-striatis pilosis, oculis maximis caput tegentibus. T. 5. p. 26. t. 13. f. 4. 5.

824. *P. nitida*, fusco-caerulea nitidissima, elytris laevibus, antennis nigris pectinatis. T. 5. p. 27. t. 13. f. 6. 7.

56. MORDELLA.

825. *M. aculeata*, atra nitida, ano spina terminato.

T. 5. p. 28.

M. aculeata, L. S. N. p. 682.

57. TENEBRIO.

Fam. 1.

826. *T. acuminatus*, apterus, ater, coleopteris po-
ne acuminatis. T. 5. p. 31.

T. mortifagus. L. S. N. p. 676.

827. *T. gibbus*, apterus, niger laevissimus, thorace
orbiculato elytrisque valde elevatis conve-
xis. T. 5. p. 51. t. 13. f. 8.

T. gibbus. L. S. N. p. 676.

828. *T. reticulatus*, apterus, niger, thorace angu-
lato, corpore ovato, elytris coadunatis
nervoso-reticulatis. T. 7. p. 651. t. 48. f.
19. 20.

829. *T. striatus*, apterus, niger, pedibus antennis-
que rufis, corpore ovato, elytris coadunati-
tis faeriter punctato-striatis. *T. gibbus*. T.
7. p. 652. t. 48. f. 21.

830. *T. cristatus*, apterus, griseus, thorace bicri-
stato, elytris coadunatis cristatis: postice
angulatis. T. 7. p. 653. t. 48. f. 22. 23.

Fam. 2.

831. *T. variolosus*, alatus, ater, elytris rugosis.
T. 5. p. 32. t. 2. f. 1 — 3.

Attelabus Ceramboides. L. S. N. p. 621.

832. *T. Molitor*, alatus, nigro-fuscus; subitus ca-
staneus, corpore oblongo, elytris striatis.
T. 5. p. 34. t. 2. f. 4 — 14.

T. Molitor. L. S. N. p. 674.

833.

833. *T. agnariæ*, alatus, thorace cavitatibus duabus, elytris violaceis vel rufis, antennis pedibusque rufis. T. 5. p. 38. t. 2. f. 15 — 20.

834. *T. rugosus*, alatus, niger, corpore ovato, thorace rugoso, elytris tuberculis scabris. T. 5. p. 43. t. 2. f. 21. 22.

Obs. Huc *Silpham rugosam*, Linnei refert Ill. Ap. Etio, quam antea sub genere proprio locavit, a *Tenebrione rugoso* distinctissima.

835. *T. villosus*, alatus, villosus, niger, elytris villosis fulvis, thorace teretiusculo. T. 5. p. 44. t. 2. f. 23. 24.

Chrysomela hirta. L. S. N. p. 602.

836. *T. lardarius*, alatus, oblongus, flavo-fuscus, oculis nigris, elytris striatis punctatis. T. 5. p. 45. t. 2. f. 25 — 31.

837. *T. hirticornis*, alatus, niger, capite depresso, antennis pilosis, thorace bicarinato, elytris punctato-striatis. T. 5. p. 47. t. 3. f. 1. 2.

Hispa mutica. L. S. N. p. 604.

838. *T. Boleti*, alatus, ovatus, gibbus, niger nitidus, elytris fasciis tribus transversis fulvis undatis. T. 5. p. 49. t. 3. f. 3. 4.

Chrysomela Boleti. L. S. N. p. 591.

839. *T. maurus*, alatus, nigro-fuscus nitidus, elytris punctato-striatis, thoracis marginibus antice posticeque dente angulatis. T. 5. p. 52. t. 13. f. 9.

T. mauritanicus. L. S. N. p. 624.

840. *T. pensylvanicus*, alatus, niger, elytris laevibus, thorace quadrato, antennis apice fuscis. T. 5. p. 53. t. 12. f. 10.

~~Specimen.~~

841. *T. aeneus*, alatus, niger, elytris striato-punctatis aeneis coerulescentibus. T. 5. p. 53. t. 13. f. 11.

T. chalybeus. L. S. N. p. 674.

842. *T. Surinamensis*, alatus, elongatus, testaceo-fuscus, elytris striatis, thorace striis tribus elevatis marginibusque denticulato. T. 5. p. 54. t. 13. f. 12.

Dermestes Surinamensis. L. S. N. p. 565.

58. CERAMBYX.

Fam. I.

843. *C. Prionus*, fusco-caeruleus obscurus nitidus, thorace depresso dentato, corpore lato, antennis brevioribus. T. 5. p. 59. t. 3. f. 5 — 16.

C. coriarius. L. S. N. p. 622.

844. *C. Cervicornis*, fasciis longitudinalibus undulatis ferrugineis, thorace depresso dentato, maxillis porrectis corniformibus dentatis, antennis brevibus. T. 5. p. 95.

C. Cervicornis. L. S. N. p. 622.

845. *C. Damicornis*, castaneus, thorace depresso ferrato, maxillis porrectis intus villosis apice tridentatis, antennis brevibus. T. 5. p. 97.

C. melanopus. L. S. N. p. 623.

846. *C. Pensylvanicus*, rufo-fuscus, thorace utrinque trispinoso, pectore tomentoso fulvo, antennis mediocribus. T. 5. p. 99. t. 13. f. 13.

847. *C. spinosus*, thorace depresso rufo utrinque bidentato, fasciis longitudinalibus quinque magris, elytris bidentatis viridibus: linea lutea. T. 5. p. 100. t. 13. f. 14.

C. fe-

C. festivus. L. S. N. p. 629.

848. *C. auratus*, viridi-inauratus, thorace depresso marginato-dentato, pedibus rufo-violaceis, antennis mediocribus violaceo-nigris. T. 5. p. 101. t. 13. f. 15.

C. auratus. L. S. N. p. 635.

Fam. 2.

849. *C. odoratus*, thorace spinoso, viridi-aureo-nitidus, antennis mediocribus coeruleo-violettaeis. T. 5. p. 63.

C. moschatus. L. S. N. p. 627.

850. *C. nigro-rugosus*, thorace spinoso, niger opacus, antennis brevioribus crassis, elytris convexis. T. 5. p. 64.

C. textor. L. S. N. p. 629.

851. *C. atomarius*, thorace spinoso, niger nitidus atomis albescensibus, antennis longissimis, scutello albicante. T. 5. p. 65.

C. Sutor. L. S. N. p. 628.

852. *C. aedilis*, thorace spinoso punctis quatuor luteis, elytris griseo-cinereis fusco-maculatis, antennis longissimis. T. 5. p. 66. t. 4. f.

I — 4.

C. aedilis. L. S. N. p. 628.

853. *C. Cerdø*, niger, thorace spinoso rugoso, elytris scabris, antennis mediocribus. T. 5. p. 69.

C. Cerdø. L. S. N. p. 629.

854. *C. Fuliginator*, niger, thorace spinoso, elytris cinereis, corpore ovato, antennis brevioribus. T. 5. p. 70.

C. Fuliginator. L. S. N. p. 629.

855. *C. nebulosus*, thorace spinoso, elytris cinereis punctis fasciisque nigris, antennis mediocribus

- cribus cinereo-nigroque maculatis; T. 5.
p. 71.
- C. nebulosus.** L. S. N. p. 627.
856. *C. fasciculatus*, thorace spinoso, elytris fuscis:
fascia transversali alba fasciculisque sex ni-
gris, antennis longioribus. T. 5. p. 71.
t. 3. f. 17. 18.
- C. hispidus.** L. S. N. p. 627.
857. *C. longimanus*, thorace spinosa, pedibus anti-
cis longissimis, elytris basi unidentatis api-
ceque bidentatis, antennis longissimis. T.
5. p. 102.
- C. longimanus.** L. S. N. p. 621.
858. *C. albo-maculatus*, niger, thorace spinoso,
antennis longis aculeatis, elytris basi uniden-
tatis apiceque bidentatis: maculis quatuor
albis. T. 5. p. 106. t. 13. f. 16. *C. albo-
fasciatus.*
- C. Rubus.** L. S. N. p. 625.
859. *C. rufo-maculatus*; griseus, thorace spinoso,
antennis longis aculeatis, elytris basi uni-
dentatis: maculis sex ferrugineis. T. 5.
p. 107.
860. *C. farinosus*, niger thorace spinoso, elytris
maculis rotundatis pilosis flavo-albidis spar-
sis, abdomine bidentato. T. 5. p. 108. t.
13. f. 17. t. 14. f. 4.
- C. farinosus.** L. S. N. p. 626.
861. *C. chinensis*, niger, thorace spinoso, anten-
nis longis cinereo-maculatis, elytrorum late-
ribus maculis albis sparsis. T. 5. p. 109.
862. *C. depresso*, thorace quadrispinoso, dorso de-
presso, elytris fuso-nebulosis: antice pun-
ctis elevatis, antennis longis. T. 5. p.
110. t. 14. f. 2.
- C. de-**

C. depressus. L. S. N. p. 626.

863. *C. balteatus*, griseo-fuscus, thorace spinoso, elytris apice bidentatis fasciaque ferruginea, antennis longissimis. T. 5. p. 111. t. 14. f. 3.

864. *C. tuberculatus*, cinereus, thorace quinque spinoso, elytris spinosis postice unidentatis latere fasciaque nigra; antennis longioribus. T. 5. p. 112. t. 14. f. 4.

C. glaucus. L. S. N. p. 626.

865. *C. succinctus*; fusco-caeruleus; thorace rugoso quadrispinoso, elytris fascia transversali, flavo, antennis longioribus compressis. T. 5. p. 113. t. 14. f. 5.

C. succinctus. L. S. N. p. 627.

866. *C. tigrinus*, fusco-griseus, thorace spinoso, elytris maculis punctisque fuscis sparsis, antennis longioribus. T. 5. p. 114. t. 14. f. 6.


867. *C. fasciatus*, thorace subspinoso, elytris truncatis flavo-griseis; fasciis undulatis punctatis fuscis, antennis longioribus maculatis. T. 5. p. 114. t. 14. f. 7.

868. *C. hirsutus*, fuscos, thorace spinoso, elytris hirsutis striato, punctatis; antennis mediocribus maculatis. T. 5. p. 115. t. 14. f. 8.

869. *C. gibbus*, fuscus, dinereo-maculatus; thorace rugoso subspinoso, elytris gibbis punctis nigris hispidis, antennis mediocribus. T. 5. p. 116. t. 14. f. 9.

870. *C. ocellatus*, thorace spinoso, niger, antennis longissimis, elytris singulis maculis ocellatis quadrator albis media fuscis. T. 7. p. 654. t. 49. f. 1.

871. *C. capensis*, thorace spinoso rugoso, niger, antennis mediocribus, elytris singulis maculis



lis tribus obscure rubris. T. 7. p. 655. t. 49. f. 2.

C. capensis. L. S. N. p. 628.

872. *C. latipes*, thorace spinoso viridi-aeneo, antennis mediocribus, elytris obscure purpureis, pedibus violaceis, tibiis posticis latissimis compressis. T. 7. p. 655. t. 49. f. 3. 4.

Fam. 3.

873. *C. punctatus*, thorace mutico cylindrico, flavo-griseus nigro-punctatus, antennis mediocribus griseo nigroque maculatis. T. 5. p. 73. t. 3. f. 19.

C. Carcharias. L. S. N. p. 631.

874. *C. oculatus*; thorace mutico cylindrico rufoflavido: punctis duobus nigris, capite, antenmisque nigris; elytris cinereo-coerulecentibus. T. 5. p. 74. t. 3. f. 20.

C. oculatus. L. S. N. p. 633.

875. *C. cinereus*, coeruleo-niger, thorace mutico cylindrico linea albida, pedibus anticus flavis, antennis mediocribus. T. 5. p. 75.

C. cylindricus. L. S. N. p. 633.

876. *C. villoso-viridefens*, flavo-viridis, thorace mutico cylindrico fasciis tribus longitudinalibus flavis, antennis longioribus nigro-cinereoque maculatis. T. 5. p. 76.

877. *C. scalaris*, flavo-viridis, thorace mutico cylindrico: macula nigra, elytris nigris fascia dentata punctisque flavo-viridibus, antennis mediocribus. T. 5. p. 77.

C. scalaris. L. S. N. p. 632.

878. *C. decempunctatus*, nigro-plumbeus, thorace mutico cylindrico: lineis binis flavis, elytris

tris punctis quinque flavis, antennis mediocribus. T. 5. p. 78.

C. Populneus. L. S. N. p. 632.

879. **C. serraticornis**, thorace mutico cylindrico, griseo fuscus, oculis nigris, antennis ferratis mediocribus, tentaculis (palpis) longis pedibusque teretibus. T. 5. p. 79.

C. ferraticornis. L. S. N. p. 634.

880. **C. pygmaeus**, minutissimus, fuscus, thorace mutico cylindrico, antennis ferratis pilosis. T. 5. p. 80. t. 4. f. 5.

881. **C. hirtipes**, fuscus, thorace mutico cylindrico, elytris apice bidentatis, plantis anticis hirsutis, antennis longioribus medio macula alba. T. 5. p. 117. t. 14. f. 10.

882. **C. longicollis**, thorace mutico cylindrico elongato rufo, elytris testaceis: punctis quatuor nigris, antennis longioribus. T. 5. p. 117. t. 14. f. 11.

C. Surinamus. L. S. N. p. 632.

883. **C. grossicornis**, thorace mutico cylindrico, viridi-aureus nitidus, elytris singulis maculis luteis tribus, antennis mediocribus nigris apice grossis. T. 7. p. 656. t. 49. f. 5. 6.

884. **C. fusiformis**, thorace mutico cylindrico, violaceus nitidus, antennis longissimis nigris. T. 7. p. 657. t. 49. f. 7.

Fam. 4.

885. **C. quadrifasciatus**, niger, thorace mutico subgloboso, elytris fasciis flavo-citreis: secunda obliqua, pedibus ferrugineis, antennis brevioribus. T. 5. p. 81.

Leptura Arietis. L. S. N. p. 640.

886. *C. albo-fasciatus*, niger, thorace mutico subgloboso, elytris lineis tribus arcuatis fasciaque transversa griseis, antennis brevioribus. T. 5. p. 82.
- Leptura mystica*. L. S. N. p. 639.
887. *C. rusticus*, grifeo-fuscus, thorace mutico subrotundo depresso: punctis impressis, antennis subulatis brevioribus. T. 5. p. 83.
- C. rusticus*. L. S. N. p. 634.
888. *C. maxillosus*, niger, thorace mutico subgloboso, antennis longitudine thoracis: articulis compressis, dentibus maximis prominentibus. T. 5. p. 84. t. 3. f. 21. 22.
- Attelabus Buprestoides*. L. S. N. p. 621.
889. *C. caudatus*, fusco-obscurus, thorace mutico subrotundo depresso cinereo villoso; punctis duobus nigris glabris, antennis brevibus. T. 5. p. 87.
- C. bajulus*. L. S. N. p. 636.
890. *C. nigro-planus*, niger, corpore thoraceque mutico subrotundo depresso, femoribus clavatis, antennis mediocribus crassis. T. 5. p. 88.
891. *C. violaceus*, violaceus nitens, corpore thoraceque mutico subrotundo depresso, femoribus clavatis, antennis mediocribus nigris, T. 5. p. 88.
- C. violaceus*. L. S. N. p. 635.
892. *C. aeneus*, fusco-aeneus nitidus, thorace mutico subrotundo depresso, antennis pedibusque nigris. T. 5. p. 89.
893. *C. striatus*, niger nitidus, thorace mutico subrotundo depresso, elytris striatis, antennis brevioribus dentibusque parvis. T. 5. p. 90.

C. fri-

C. striatus. L. S. N. p. 635.

894. C. castaneus, thorace nigro mutico subrotundo subdepresso, elytris pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. T. 5. p. 90.

C. castaneus. L. S. N. p. 636.

895. C. undatus, nigro-fuscus, thorace mutico subrotundo depresso tuberculato, elytris fasciis duabus albidis undulatis, antennis submediocribus. T. 5. p. 91.

C. undatus. L. S. N. p. 636.

896. C. sanguineus, thorace mutico subrotundo depresso angulato elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. T. 5. p. 92.

C. sanguineus. L. S. N. p. 636.

897. C. testaceus, thorace mutico subrotundo glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus. T. 5. p. 93.

C. testaceus. L. S. N. p. 635.


898. C. femoratus, thorace mutico subrotundo, corpore atro, femoribus rubris, antennis mediocribus. T. 5. p. 93.

C. femoratus. L. S. N. p. 634.

899. C. pulverulentus, thorace mutico subrotundo convexo nigro-fusco, elytris castaneis griseo-villoso apice bidentatis, antennis longioribus aculeatis. T. 5. p. 118. t. 14. f. 12.

900. C. Stigma, totus niger, thorace submutico semilunari punctato, corpore depresso, elytris laevibus stigmate flavo, antennis brevibus. T. 5. p. 119. t. 14. f. 13.

C. Stigma. L. S. N. p. 635.



59. LEPTURA.

Fam. 1.

901. *L. mordax*, thorace spinoso, nigra, maculis punctisque griseis villosis, elytris fascia dupli fulva maculaque nigra, antennis brevioribus. T. 5. p. 124. t. 4. f. 6.

Cerambyx inquisitor B. L. S. N. p. 631.

902. *L. inquisitor*, thorace spinoso, fusca, maculis punctisque cinereis villosis, antennis brevioribus. T. 5. p. 126. t. 4. f. 7 — 8.

Cerambyx inquisitor. L. S. N. p. 630.

903. *L. Cursor*, thorace spinoso nigro, elytris rufis viridi-griseo-tomentosis: fasciis binis longitudinalibus nigris, antennis longis rufis. T. 5. p. 128.

C. Cursor. L. S. N. p. 630.

904. *L. pedella*, nigra, thorace spinoso, elytris testaceo-lividis: maculis durabus irregularibus nigro-fuscis. T. 5. p. 129. t. 4. f. 10.

C. Lamed. L. S. N. p. 630.

905. *L. meridiana*, fusco-cinerea, thorace spinoso, femoribus rufis apice nigris, corpore subtus nitente, abdominis apice rufo. T. 5. p. 130.

C. meridianus. L. S. N. p. 630.

906. *L. viridi-aurea*, viridi aurea nitida, thorace spinoso, elytris fasciis binis longitudinalibus nigris, femoribus rubris. T. 5. p. 145. t. 15. f. 1.


Fam. 2.

907. *L. virens*, flavo-viridis; antennis nigro luteoque variis. T. 5. p. 131.

L. virens. L. S. N. p. 638.

908.

908. *L. rubra*, nigra, thorace, elytris tibiisque obscure rubris. T. 5. p. 132.
- L. rubra*. L. S. N. p. 638.
909. *L. ottomaculata*, nigra, maculis quatuor flavis in singulo elytro. T. 5. p. 132. t. 4. f. 11 — 13.
- L. quadrifasciata*. L. S. N. p. 639.
910. *L. testaceo-fasciata*, nigra, elytris fasciis tribus transversis undulatis testaceo-flavis. T. 5. p. 133.
- L. sexmaculata*. L. S. N. p. 638.
911. *L. elongata*, nigra, corpore elongato, elytris flavis: maculis sex nigris, pedibus antennisque nigro-flavoque maculatis. T. 5. p. 134.
- L. L. Faun. Suec. 2275.
912. *L. testacea*, nigra, elytris tibiis pedibusque flavo-testaceis. T. 5. p. 135.
- L. testacea*. L. S. N. p. 638.
913. *L. nigripes*, nigra, elytris obscure flavo-testaceis, pedibus totis nigris. T. 5. p. 136.
914. *L. futua*, nigra, elytris flavo-testaceis apice nigris, pedibus posticis corpore brevioribus. T. 5. p. 136.
915. *L. variabilis*, nigra, pedibus posticis corpore longioribus, elytris Maris flavo-testaceis apice nigris, Foeiniae obscure rubris. T. 5. p. 137.
- L. melanura*. L. S. N. p. 637.
916. *L. futura nigra*, nigra, elytris rufis seu obscure testaceis apice futuraque nigris. T. 5. p. 138.
917. *L. maculicornis*, nigra, elytris testaceo-lividis, antennis flavo-maculatis. T. 5. p. 139.



918. *L. tabacicolor*, nigra, elytris fusco-testaceis apice nigris, pedibus flavis. T. 5. p. 139.
919. *L. aquatica spinosa*, viridi-deaurata l. violacea, antennis nigris, pedibus fuscis, femoribus posticis magnis dentatis. T. 5. p. 140. t. 4. f. 14 — 16.
- L. aquatica*. L. S. N. p. 637.
920. *L. aquatica mutica*, viridi-deaurata nitida, capite cinereo, pedibus rufis, femoribus posticis magnis muticis. T. 5. p. 142.
921. *L. aquatica fasciata*, viridi-deaurata nitida, elytris fascia longitudinali purpurea nitida, femoribus posticis magnis unidentatis. T. 5. p. 142.
922. *L. aquatica aenea*, aenea nitida, femoribus omnibus fere aequalibus. T. 5. p. 143.
923. *L. ruficollis*, nigra, thorace abdomineque rubris. T. 5. p. 143.
- L. collaris*. L. S. N. p. 639.
924. *L. violacea*, nigra, elytris violaceis nitidis, abdome flavo-rubo. T. 5. p. 144.
- L. virginea*. L. S. N. p. 639.
925. *L. nigra*, nigra tota. T. 5. p. 144.
- L. nigra*. L. S. N. p. 639.

60. NECYDALIS.

Fam. I.

926. *N. ichneumonea*, nigra, elytris abbreviatis rufo-fuscis, pedibus rufis, antennis corpore brevioribus. T. 5. p. 148. t. 5. f. 1. 2.
- N. major*. L. S. N. p. 641.
927. *N. corymboides*, fusca, elytris abbreviatis lineola obliqua alba, capite thoraceque nigris, antennis rufis corpore longioribus. T. 5. p. 151.

N. mi-

N. minor. L. S. N. p. 641.

Fam. 2.

928. *N. nitida*, nigra, elytris subulatis flavis nitidissimis, abdomine annulis albis, femoribus clavatis. T. 5. p. 153. t. 15. f. 2. 3.

N. glaucescens. L. S. N. p. 642.

929. *N. flavescens*, nigra, elytris testaceis subulatis, femoribus posticis clavatis. T. 5. p. 155.

N. flavescens. L. S. N. p. 642.

61. CLERVS.

930. *C. aparius*, coeruleo-violaceus, elytris rubris: fasciis tribus transversis violaceis. T. 5. p. 157. t. 5. f. 3 — 5.

Attelabus aparius. L. S. N. p. 620.

931. *C. fusc-fasciatus*, fuscus, elytris flavo-griseis: fasciis duabus transversis fuscis, abdomine rubro. T. 5. p. 159. t. 5. f. 6. 7.

Attelabus mollis. L. S. N. p. 621.

932. *C. formicarius*, niger, thorace elytris antice abdomineque rubris, elytris fasciis binis albis. T. 5. p. 160. t. 5. f. 8 — 12.


Attelabus formicarius. L. S. N. p. 620.

933. *C. coeruleus*, oblongus, nigro-coeruleus nitidus, elytris punctis excavatis. T. 5. p. 164. t. 5. f. 13 — 14.

Dermestes violaceus. L. S. N. p. 563.

934. *C. niger*, oblongus, niger. T. 5. p. 164.

935. *C. rufipes*, oblongus, nigro-coeruleus nitidus, antennarum basi pedibusque flavo-rufis. T. 5. p. 165. t. 15. f. 4.



62. CASSIDA.

936. *C. tigrina*, viridis, punctis nigris, corpore subtus nigro, thorace maculis binis albis. T. 5. p. 168. t. 5. f. 15 — 26.
937. *C. Cardui*, viridis, corpore nigro, pedibus flavescens. T. 5. p. 174.
- C. viridis*. L. S. N. p. 574.
938. *C. maculata*, supra viridis subtus nigra, elytris maculis aliquot nigris, pedibus nigris. T. 5. p. 175.
- C. maculata*. L. S. N. p. 575.
939. *C. grossa*, sanguinea, elytris disco punctis nigris sparsis, margine lineis ramosis nigris. T. 5. p. 176. t. 15. f. 5.
- C. grossa*. L. S. N. p. 577.
940. *C. variegata*, fusco-rubra, elytris scabris nigro-variegatis: lateribus bifasciatis, thorace angulato, antennis nigris. T. 5. p. 178. t. 15. f. 6.
- C. variegata*. L. S. N. p. 576.
941. *C. clatrata*, ferruginea, elytris margine omni, linea longitudinali semique transversali nigris. T. 5. p. 179. t. 15. f. 7.
- C. clatrata*. L. S. N. p. 577.
942. *C. punctata*, flavo-testacea rufa, maculis inaequalibus nitidis viridi-aeneis, corpore subtus nigro. T. 5. p. 180. t. 15. f. 8,
943. *C. cyanea*, cyaneo-aenea, elytris immaculatis excavato-punctatis. T. 5. p. 181. t. 15. f. 9.
- C. cyanea*. L. S. N. p. 577.
944. *C. bimaculata*, supra fusco-aenea, subtus viridis nitens, elytrorum disco maculis binis magnis flavis. T. 5. p. 182. t. 15. f. 10.
- C. inaequalis*. L. S. N. p. 578.

945. *C. quadrimaculata*, viridi-aenea nitida, abdome nigro, elytrorum disco maculis binis magnis flavis. T. 5. p. 183. t. 15. f. 11.
C. discoides. L. S. N. p. 578.
946. *C. lateralis*, fusco-aenea, abdomine nigro nitido, elytrorum margine exteriore macula magna flava. T. 5. p. 184. t. 15. f. 12.
C. lateralis. L. S. N. p. 578.
947. *C. flava*, pallide flava immaculata, corpore subtus pedibusque rufis. T. 5. p. 184. t. 15. f. 13.
C. flava. L. S. N. p. 576.
948. *C. marginata*, thorace violaceo-nigro, elytris testaceis: margine punctisque duobus nigris. T. 5. p. 185.
C. marginata. L. S. N. p. 578.
949. *C. tincta*, ferruginea, thorace aeneo elytris que punctatis: margine flava. T. 5. p. 186. t. 15. f. 14.
C. marginata. L. S. N. p. 576.
950. *C. cruciata*, hyalina pallide flava, elytris disco macula magna fusca cruciata. T. 5. p. 187. t. 15. f. 15.
C. cruciata. L. S. N. p. 576.
951. *C. quadrata*, pellucida albo-flavescens, elytrorum disco griseo-fusco: margine nigro. T. 5. p. 188. t. 15. f. 16.
C. reticularis, pellucida albo-flavescens, elytrorum disco nigro-reticulato. T. 5. p. 188. t. 15. f. 17.
952. *C. reticularis*. L. S. N. p. 576.
953. *C. nigro-maculata*, pellucida albo-flavescens, elytris subtus maculis quatuor nigris, abdome nigro-maculato. T. 5. p. 189. t. 15. f. 18.

K. 3

C. hi-

C. bifasciata. L. S. N. p. 576.

954. *C. purpurea*, flavo-citrea, elytrorum disco macula rotunda dorsali rubro-purpurea.. T. 5. p. 190. t. 15. f. 19.

C. purpurea. L. S. N. p. 576.

63. IPS.

955. *I. typographus*, pilosus fuscus, elytris postice oblique truncatis dentatis. T. 5. p. 193. t. 6. f. 1 — 7.

Dermestes typographus. L. S. N. p. 562.

956. *I. piniperda*, subvillosum, niger nitidus, elytris punctis excavatis, antennis plantisque rufis. T. 5. p. 194. t. 6. f. 8 — 10.

Dermestes piniperda. L. S. N. p. 563.

957. *I. fumatus*, testaceo-flavus, oculis nigris, elytris punctis excavatis. T. 5. p. 195.

Dermestes fumatus. L. S. N. p. 564.

958. *I. micrographus*, ferrugineus, pedibus flavis, elytris postice oblique truncatis dentatis. T. 5. p. 195.

Dermestes micrographus. L. S. N. p. 562.

959. *I. polygraphus*, rufo-fuscus, elytris postice rotundatis. T. 5. p. 196.

Dermestes polygraphus. L. S. N. p. 562.

960. *I. domesticus*, niger, elytris griseis margine nigra, antennis rufis. T. 5. p. 196.

Dermestes domesticus. L. S. N. p. 563.

961. *I. spinosus*, fusco-caestaneus, pedibus rufis, elytris postice sexspinosis. T. 5. p. 197.

Dermestes fenestralis. L. S. N. p. 563.

962. *I. eustatus*, niger nitidus, punctis minimis excavatis, pedibus rufo-fuscis, capite sub tho-

~~██████████~~ thorace recondito. T. 5. p. 197. t. 15. f. 20. 21.

Dermeistes euystatius. L. S. N. p. 564.

64. C V R C V L I O.

Fam. 1.

963. *C. Abietis*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro maculis griseo-flavis. T. 5. p. 204. t. 6. f. 11 — 13.

C. Abietis. L. S. N. p. 613.

964. *C. Nutum*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis rufis, corpore oblongo nigro: pilis varidi flavis. T. 5. p. 205. t. 6. f. 14 — 16.

C. Nucum. L. S. N. p. 613.

965. *C. Scrophulariae*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore subgloboso fulvo griseoave, coleopteris maculis duabus rotundis nigris dorsalibus. T. 5. p. 208. t. 6. f. 17 — 25.

C. Scrophulariae. L. S. N. p. 614.

966. *C. Fraxini*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore subgloboso griseo, coleopteris macula magna dorsalii fusca. T. 5. p. 212.

967. *C. violaceus*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro-eoeruleoente nitido, elytris striatis. T. 5. p. 213.

C. violaceus. L. S. N. p. 614.

968. *C. futus*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo flavotestaceo, oculis nigris. T. 5. p. 214.

C. tortrix. L. S. N. p. 615.



969. *C. Druparum*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo rufo-fusco, elytris obsolete fasciatis. T. 5. p. 215.

C. Druparum. L. S. N. p. 614.

970. *C. Ulmi*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo rufo-fusco, elytris inacula nigricante, proboscide nigra. T. 5. p. 215. t. 6. f. 26 — 30.

C. Pedicularius. L. S. N. p. 615?

971. *C. indus*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore nigro depresso; thoracis lateribus tuberculo villoso, elytris rugoso-sulcatis. T. 5. p. 265. t. 15. f. 22.

C. indus. L. S. N. p. 606.

972. *C. vaginalis*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore nigro, elytris sulcatis: tuberculis sparsis, juxta apicem macronatis. T. 5. p. 266. t. 15. f. 23.

C. vaginalis. L. S. N. p. 612.

973. *C. pulverulentus*, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro, elytris cinereo-maculatis. T. 5. p. 268. t. 15. f. 24.

Fam. 2.

974. *C. griseo-punctatus*, brevirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro; punctis flavescentibus sparsis. T. 5. p. 217.

975. *C. Ligustici*, brevirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro-fusco; squamulis griseis nitidis. T. 5. p. 218.

C. Ligustici. L. S. N. p. 615.

976.

976. *C. Rosae*, apterus, brevirostris, antennis fractis pedibusque rufis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro-fusco. T. 5. p. 219.
C. ovatus. L. S. N. p. 615.
977. *C. Urticae*, brevirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo viriditudo, pedibus viridiibus. T. 5. p. 219.
C. argentatus. L. S. N. p. 615.
978. *C. griseo-aeneus*, brevirostris, antennis fractis rufis, femoribus dentatis, corpore oblongo griseo-aeneo nitido. T. 5. p. 221.
C. cervinus. L. S. N. p. 615.

Fam. 3.

979. *C. piceus*, longirostris, antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore oblongo nigro piceo. T. 5. p. 221.
980. *C. Pini*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo testaceo: maculis lineisque transversis flavis, elytris gibbosis. T. 5. p. 222.
- C. Pini*. L. S. N. p. 608.
981. *C. albicaudis*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore ovato nigro: fasciculis pilosis, elytris postice albis. T. 5. p. 223. t. 6. f. 1. 2.
- C. Lapathi*. L. S. N. p. 608.
982. *C. nigro-gibbosus*, longirostris, antennis fractis; femoribus muticis; corpore ovato nigro, elytris tuberculatis postice cinereis. T. 5. p. 224.
983. *C. Phellandrii*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis corpore oblongo cylindrico griseo-viridi-flavescente, elytris acuminatis remotis. T. 5. p. 224. t. 7. f. 3 — 9.

K 5

C. pa-



C. paraplecticus. L. S. N. p. 610.

984. *C. castaneus*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo fusco-castaneo subtus nigro, elytris striato-punctatis gibbosis. T. 5. p. 231.

985. *C. Ruminis*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo griseo-fusco-nebuloso, thorace fasciis binis nigricantibus, pedibus fuscis. T. 5. p. 231. t. 7. f. 10 — 16.

C. Ruminis. L. S. N. p. 614.

986. *C. fasciatus*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis corpore oblongo nigro-fusco: fasciis longitudinalibus griseis. T. 5. p. 234.

C. L. Faun. Suec. No. 2274.

987. *C. acridulus*, arcuato-longirostris, antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore ovato nigro-fusco, tibiis pallidis. T. 5. p. 235.

C. acridulus. L. S. N. p. 607.

988. *C. Campanulae*, longirostris, antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore subglobo cinereo-nigro, elytris lineis griseis. T. 5. p. 236.

C. Campanulae. L. S. N. p. 607.

989. *C. Plantaginis*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore ovato griseo, thorace fasciis elytris macula magna punctisque fuscis. T. 5. p. 237. t. 7. f. 17 — 21.

990. *C. granarius*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo fusco-castaneo, thorace longitudine elytrorum. T. 5. p. 239.

C. gra-

C. granarius. L. S. N. p. 608.

991. *C. Palmarum*, longirostris, antennis fractis clava truncata, femoribus muticis, corpore nigro depresso, thorace ovato planiusculo, elytris abbreviatis striatis. T. 5. p. 269. t. 15. f. 26.

C. Palmarum. L. S. N. p. 606.

992. *C. rufo-fasciatus*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo rufo, thorace magno, fasciis longitudinalibus nigris. T. 5. p. 271. t. 15. f. 25.

C. hemipterus. L. S. N. p. 606.

993. *C. melanocephalus*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore subgloboso fusco, capite rostroque nigris, elytris gibbis. T. 5. p. 272. t. 15. f. 27.

994. *C. frugilegus*, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo castaneo, coleopteris maculis quatuor rufis, thorace longitudine elytrorum. T. 5. p. 273.

Fam. 4.


995. *G. fulcirostris*, brevirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo cinereo, elytris maculis fasciisque obliquis nigris. T. 5. p. 240.

C. fulcirostris. L. S. N. p. 614.

996. *C. carinatus*, carinato-brevirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo nigro maculis fasciisque albidis, elytris gibbosis. T. 5. p. 241.

C. nebulosus. L. S. N. p. 617.

997. *C. griseo-apterus*, apterus, brevirostris, antennis fractis longissimis rufis, femoribus muticis,



ticis, corpore oblongo nigro-fusco: pilis nitidis griseis. T. 5. p. 242.

C. incanus. L. S. N. p. 616.

998. *C. atro-apterus*, apterus, brevirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo nigro nitido laevi. T. 5. p. 243. t. 7. f. 22. 23.

999. *C. carinato-punctatus*, brevirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore subgloboso rufo-fusco punctis flavo-griseis, elytris carinatis. *C. griseo-punctatus.* T. 5, p. 244.

1000. *C. flavipes*, brevirostris, antennis flavis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo viridi nitido, pedibus flavis. T. 5. p. 245.

1001. *C. capitatus*, brevirostris, antennis fractis fusca, femoribus muticis, capite lato, corpore subgloboso griseo-cinereo, pedibus fusca. T. 5. p. 245.

1002. *C. tereticollis*, brevirostris, antennis fractis pedibusque rufis, femoribus muticis, capite cylindrico; corpore oblongo griseo-cinereo. T. 5. p. 246.

1003. *C. Pyri*, brevirostris, antennis fractis rufis, femoribus muticis, corpore oblongo aeneo-nitido, pedibus rufis. T. 5. p. 246.

C. Pyri. L. S. N. p. 615.


1004. *C. lineatus*, brevirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo griseo, thorace striis tribus pallidioribus. T. 5. p. 247.

C. lineatus. L. S. N. p. 616.

Fam. 5.

1005. *C. Betulae*, longirostris, antennis rectis nigris, corpore subquadrato viridi-aurato nitidif-

- tidissimo, pedibus purpureo-aeneis. T. 5.
p. 248. t. 7. f. 25. 26.
- C. Betulae. L. S. N. p. 611.
1006. *C. Populi*, longirostris, antennis rectis nigris, corpore subquadrato supra viridi-aureo nitido, subtus violaceo, pedibus violaceis. T. 5: p. 249.
- C. Populi. L. S. N. p. 611.
1007. *C. purpureus*, rostro longissimo, antennis rectis, corpore villoso subquadrato purpureo aurato-nitidissimo. T. 5. p. 250.
- C. purpureus*. L. S. N. p. 607.
1008. *C. coeruleus*, longirostris, antennis rectis, corpore obtuso villoso coeruleo-violaceo nitido. T. 5. p. 251.
- C. Alliariae. L. S. N. p. 606.
1009. *C. sanguineus*, longirostris, antennis rectis, corpore oblongo sanguineo. T. 5. p. 251.
- C. frumentarius*. L. S. N. p. 608.
1010. *C. cyaneus*, longirostris, antennis rectis, corpore oblongo nigro, elytris nigro-coeruleis nitidis. T. 5. p. 252.
- C. cyaneus*. L. S. N. p. 606.
1011. *C. rostratus*, longirostris, antennis rectis, corpore oblongo rufo, capite elytrisque viridi-coeruleis nitidis. T. 5. p. 252. t. 7. f. 27. 28.
1012. *C. Viciae*, longirostris, antennis rectis, corpore oblongo villoso cinereo-nigro, elytris fulcatis. T. 5. p. 253. t. 6. f. 31—36.
- C. Craccae*. L. S. N. p. 606.
1013. *C. longicollis*, longirostris, antennis rectis, femoribus dentatis, corpore longissimo nigre, thorace elongato cylindrico, elytris



tris flavo-striatis. T. 5. p. 174. t. 15. f. 28. 29.

C. anchoraco. L. S. N. p. 613.

Fam. 6.

1014. *C. albinus*, brevirostris, antennis longis rectis, corpore oblongo nigro hispido, capite elytrorumque apice albis, rostro planiusculo lato. T. 5. p. 255. t. 8. f. 1. 2.

C. albinus. L. S. N. p. 616.

1015. *C. flavo-cinctus*, brevirostris, antennis rectis, corpore oblongo viridi: fascia laterali flava. T. 5. p. 256.

C. viridis. L. S. N. p. 616.

1016. *C. excoriato-ruber*, brevirostris, antennis rectis, corpore brevi subquadrato nigro, elytris rubris, capite ovato postice attenuato. T. 5. p. 257. t. 8. f. 3. 4.

Attelabus Coryli. L. S. N. p. 619.

1017. *C. excoriato-niger*, brevirostris, antennis rectis, corpore brevi subquadrato nigro nitido, capite ovato postice attenuato, femoribus posticis maximis. T. 5. p. 259.

Attelabus Betulae. L. S. N. p. 620.

1018. *C. cruciatus*, apterus, carinato-brevirostris, antennis rectis, corpore ovato atro subtus maculis rubris, thorace spinoso crucigero. T. 5. p. 275. t. 16. f. 1.

C. apterus. L. S. N. p. 619.

1019. *C. tuberculatus*, apterus, niger, carinato-brevirostris, antennis rectis, thorace spinoso medio excavato, corpore globoso, elytris fusco-castaneis. T. 7. p. 658. t. 49. f. 8. 9.

1020.

1020. *C. fasciculatus*, brevirostris, antennis longis rectis, corpore ovato fuscō; fascieulis pilosis griseis. T. 5. p. 276.

Fam. 7.

1021. *C. saltator Ulmi*, saltator, longirostris, corpore ovato flavo-testaceo, oculis nigris. T. 5. p. 260. t. 8. f. 5 — 11.

1022. *C. saltator Alni*, saltator, longirostris, corpore ovato testaceo, elytris maculis binis fuscis, capite nigro. T. 5. 263.

C. Alni. L. S. N. p. 611.

1023. *C. saltator Segetis*, saltator, longirostris, corpore ovato nigro griseo-nebuloso, antennis plantisque pallide fuscis. T. 5. p. 264.

C. Segetis. L. S. N. p. 612.

1024. *C. saltator Salicis*, saltator, longirostris, corpore subgloboso atro, elytris fasciis duabus transversis albis maculisque fulva. T. 5. p. 264.

C. Salicis. L. S. N. p. 611.


64. Brvthys.

1025. *B. Pisi*, nigro-fuscus, maculis villosis sparsis, albescentibus abdominis apice albo maculis binis nigris. T. 5. p. 278. t. 16. f. 3 — 6.

B. Pisi. L. S. N. p. 604.

1026. *B. rufus*, rufo-fuscus, elytris pedibusque rufis, corpore griseo maculato, antennis serratis. T. 5. p. 281. t. 16. f. 7.

65. Ax.



65. ANTHRIBVS.

1027. *A. ruber*, ovato-oblongus, ruber nitidus, antennis elytrisque nigris nitidis. T. 5. p. 283. t. 8. f. 12 — 15.
Silpha russica. L. S. N. p. 570.

66. ANTIPVS.

1028. *A. rufus*, oblongus, capite thoraceque marginato-rufis, elytris griseo-flavis: antice puncto nigro, dentibus prominentibus, antennis ferratis. T. 7. p. 659. t. 49. f. 10. 11.

67. CHRYSOMELA.

Fam. I.

1029. *Ch. Populi*, ovata, obscure coerulea nitida, elytris flavo-rubris: puncto terminali nigro. T. 5. p. 290. t. 8. f. 16 — 23.
Ch. Populi. L. S. N. p. 590.
1030. *Ch. polita*, ovata, viridi-aurata nitida, elytris flavo-rubris. T. 5. p. 294. t. 8. f. 23.
Ch. polita. L. S. N. p. 590.
1031. *Ch. cuprea*, ovata, rubro-cuprea nitida, oculis nigris. T. 5. p. 294. t. 8. f. 24.
Ch. staphylea. L. S. N. p. 590.
1032. *Ch. rufipes*, ovata, supra rubra subtus nigra, elytris punctis subquinis nigris, pedibus rufis. T. 5. p. 295. t. 8. f. 25.
Ch. decempunctata. L. S. N. p. 590.
1033. *Ch. nigripes*, ovata, supra rubra subtus nigra, thorace macula magna nigra, elytris punctis subquinis pedibusque nigris. T. 5. p. 296.
Ch. decempunctata. B. L. S. N. p. 590.

1034.

1034. *Cb. haemorrhoidalis*, ovata, nigra l. rufa, thorace punctis duobus nigris, antennarum basi subflava. T. 5. p. 297.
- Ch. haemorrhoidalis*. L. S. N. p. 587.
- Ch. Viminalis*. L. S. N. p. 590.
1035. *Cb. rubro-marginata*, ovata, supra nigra subtus violacea nitida, elytris scabris rubro-marginatis. T. 5. p. 298. t. 8. f. 26.
- Ch. sanguinolenta*. L. S. N. p. 591.
1036. *Cb. violaceo-nigra*, ovata, violaceo-nigra, thorace corporeque convexis. T. 5. p. 298.
- Ch. göttingensis*. L. S. N. p. 586.
1037. *Cb. Tanaci*, ovata, atra opaca, punctata. T. 5. p. 299. t. 8. f. 27 — 31.
- Ch. Tanaceti*. L. S. N. p. 587.
1038. *Cb. quadrimaculata*, ovata, thorace quadrato-rubo macula nigra, elytris rubris maculis duabus nigris, capite pedibus antennisque nigris. T. 5. p. 301. t. 9. f. 1.
- Ch. coccinea*. L. S. N. p. 592.
1039. *Cb. Padi*, ovata; flavo-grisea pallida nitida, thorace magno oculis nigris, antennis brevioribus fuscis. T. 5. p. 301. t. 9. f. 2.
- Ch. Cerasi*. L. S. N. p. 588.
1040. *Cb. turbilinea*, ovata, viridi-aenea nitida, elytris fasciis curvis testaceis. T. 5. p. 302. t. 9. f. 3.
- Ch. Lapponica*. L. S. N. p. 591?
1041. *Cb. collaris*, ovata, violacea l. viridi-aenea nitida, thorace marginibus rubro: puncto nigro. T. 5. p. 302.
- Ch. collaris*. L. S. N. p. 591.
1042. *Cb. marginata*, ovata, supra viridi-aenea obscura nitida, subtus nigra, elytris margine luteo-rubris. T. 5. p. 303.

L

Ch.

- Ch. marginata. L. S. N. p. 591.
1043. *Ch. marginella Ranunculi*, oblongo-ovata, vi-ridi-aenea obscura nitida, thorace elytris-que margine luteis. T. 5. p. 304.
- Ch. marginella. L. S. N. p. 591.
1044. *Ch. Graminis*, ovata, viridi-coerulea aurata, antennis dimidio fuscis, pedibus viridibus. T. 5. p. 304.
- Ch. Graminis. L. S. N. p. 587.
1045. *Ch. ruficaudis*, ovata, viridi-aenea obscura nitida, abdominis lateribus, ano alarum-que margine rubris. T. 5. p. 305.
1046. *Ch. viridis Alni*, ovata, viridi-aurata nitida, thorace antice excavata, abdomine supra nigro apice testaceo, elytris punctis sparsis. T. 5. p. 306. t. 9. f. 4 — 12.
- Ch. aenea. L. S. N. p. 587.
1047. *Ch. viridula*, ovato-oblonga, viridis aurata nitida, thorace antice aequali, abdomine supra toto nigro. T. 5. p. 311.
- Ch. Polygoni. G. L. Faun. Suec. No. 520.
1048. *Ch. Hyperici*, ovata, subglobosa, violaceo-coerulea nitida l. viridiuscula, thorace am-
plo. T. 5. p. 312. t. 9. f. 13 — 17.
- Ch. haemaptera. L. S. N. p. 587.
1049. *Ch. Alni*, ovata, supra violacea subtus ni-
gra, punctis excavatis sparsis, thorace mi-
nuto, antennis longis nigris. T. 5. p.
314. t. 9. f. 18 — 23.
- Ch. Alni. L. S. N. p. 587.
1050. *Ch. coeruleo-violacea*, ovata, supra coeruleo-
violacea, subtus violaceo-viridis, punctis
excavatis sparsis, thorace ampio, antennis
brevioribus nigris. T. 5. p. 316.
- 1051.

1051. *Cb. coerulea Betulae*, oblongo-ovata, supra coeruleo-violacea subtus virescens; punctis excavatis striatis, thorace ampio, antennis longioribus. T. 5. p. 317.
Ch. vulgatissima. L. S. N. p. 589.
1052. *Cb. coerulea Salicis*, subglobosa, viridi-coerulea nitida obscura, punctis excavatis sparsis. T. 5. p. 318. t. 9. f. 24 — 33.
Ch. Betulae. L. S. N. p. 587.
1053. *Cb. Plantaginis*, subglobosa, supra violacea nitida subtus nigra, punctis excavatis striatis. T. 5. p. 322.
Ch. Armoraciae. L. S. N. p. 588.
1054. *Cb. Polygoni*, ovata, violacea l. viridis nitida, thorace lato pedibusque rufo-flavis. T. 5. p. 322.
Ch. Polygonij. L. S. N. p. 589.
1055. *Cb. Vitellinae*, oblongo-ovata, aenea nitida, abdomine supra nigro apice flavecente, elytris punctis striatis. T. 5. p. 323.
Ch. Vitellinae. L. S. N. p. 589.
1056. *Cb. Phellandrii*, oblonga, nigro-aenea obscura nitida, thorace marginibus flavis, elytris fasciis duabus longitudinalibus flavis. T. 5. p. 324. t. 9. f. 34.
Ch. Phellandrii. L. S. N. p. 601.
1057. *Cb. griseo-nitida*, oblonga, thorace teretiusculo, supra griseo-fusca nitida, subtus nigra, capite nigro, antennis longis. T. 5. p. 325. t. 9. f. 35.
1058. *Cb. grisea Alni*, ovata, grisea opaca, thorace angusto puncto nigro, elytris pallide flavo-marginatis: basi puncto nigro, antennis variegatis. T. 5. p. 325. t. 9. f. 36.
Ch. cuprea. L. S. N. p. 600.

1059. *Ch. Nymphaeae*, ovata, nigro-fusca, thorace angusto maculis duabus nigris, elytris marginè flavis, antennis fuscis. T. 5, p. 326. t. 10. f. 1 — 6.
- Ch. Nymphaeæ*. L. S. N. p. 600.
1060. *Ch. gigantea*, oblonga, nigra, thorace depresso, abdomine gibbo, elytris maculis subrotundis rubris numerosissimis. T. 5. p. 349. t. 16. f. 8.
- Ch. gigantea*. L. S. N. p. 586.
1061. *Ch. undata*, ovata, nigra, elytris glabris: fasciis transversalibus undulatis maculisque rubris. T. 5. p. 350. t. 16. f. 9.
1062. *Ch. rubro-punctata*, ovata, capite thoraceque viridi-aeneis obscuris, elytris nigris: maculis plurimis nigris punctis excavatis. T. 5. p. 351. t. 16. f. 10.
1063. *Ch. clavicornis*, ovata, nigra, elytris abdomeque rubris, antennis clavatis. T. 5. p. 351. t. 16. f. 11.
- Ch. clavicornis*. L. S. N. p. 590.
1064. *Ch. octoguttata*, ovata, ferruginea, thorace lato, elytris singulis maculis quatuor magnis flavis. T. 5. p. 352. t. 16. f. 12.
- Ch. aestuans*. L. S. N. p. 593.
1065. *Ch. philadelphica*, ovata, viridi-aenea obscura, elytris flavis: punctis virescenti-aeneis oblongiusculis, antennis pedibusque rufis. T. 5. p. 353. t. 16. f. 13.
- Ch. philadelphica*. L. S. N. p. 592.
1066. *Ch. occidentalis*, ovata, viridi-aurea nitidissima, punctis excavatis, antennis pedibusque flavis. T. 5. p. 353. t. 16. f. 14.
- Ch. occidentalis*. L. S. N. p. 588.

1067.

1067. *Cb. obscura*, ovata, fusca, depresso, thorace elytrisque griseo-fuscis, antennis nigris. T. 5. p. 354. t. 16. f. 15.
1068. *Cb. metallica*, ovata, cuprea nitida, elytris punctis sparsis excavatis, pedibus antennisque violaceis. T. 7. p. 661. t. 49. f. 12.
1069. *Cb. fasciata*, ovata, viridi-aenea nitida, elytris singulis lineis quinque longitudinalibus flavo-rubris. T. 7. p. 662. t. 49. f. 13. 14.
- Ch. americana. L. S. N. p. 592.
1070. *Cb. lineata*, ovata, antennis longioribus nigris, thorace femoribusque rufis, elytris nigris: fasciis binis longitudinalibus flavis. T. 7. p. 662. t. 49. f. 15.
1071. *Cb. fulva*, ovata; supra flavo-fulva, subtus nigra, antennis longioribus nigris. T. 7. p. 663. t. 49. f. 16.

Fam. 2.

1072. *Cb. quadripunctata*, cylindrica, thorace nigro, elytris rubris: maculis duabus nigris, antennis ferratis. T. 5. p. 329. t. 10. f. 7. 8.
- Ch. quadripunctata. L. S. N. p. 596.
1073. *Cb. cordigera*, cylindrica, thorace nigro maculis flavis, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis filiformibus flavis nigrisque. T. 5. p. 330.
- Ch. cordigera. L. S. N. p. 598.
1074. *Cb. sexpunctata*, cylindrica, rubra, elytris maculis tribus nigris, thorace maculis magnis binis nigris rubro cinctis. T. 5. p. 331. t. 10. f. 9.
- Ch. sexpunctata. L. S. N. p. 599.

1075. *Cb. bipunctata*, cylindrica, thorace nigro nitidissimo, elytris rubris: maculis duabus margineque nigris. T. 5. p. 332.
Ch. bipunctata. L. S. N. p. 597.
1076. *Cb. tridentata*, cylindrica, viridi-coerulea nitida, elytris testaceis, thorace angulato gibbo. T. 5. p. 333. t. 10. f. 10.
Ch. tridentata. L. S. N. p. 596.
1077. *Cb. fericea*, cylindrica, viridi-aurata, thorace gibbo; antennis longis nigris, elytris scabris dehiscentibus. T. 5. p. 334.
Ch. fericea. L. S. N. p. 598.
1078. *Cb. nitens*, cylindrica, coeruleo-violacea seu viridi-aurata nitida, capite antice pedibusque flavis. T. 5. p. 334.
Ch. nitens. L. S. N. p. 598.
1079. *Cb. bothnica*, cylindrica, nigra, pedibus testaceis, thorace linea longitudinali capite que macula irregulari flavis. T. 5. p. 335.
Ch. bothnica. L. S. N. p. 598.
1080. *Cb. nigro-quadrata*, subcylindrica, nigra, ab domine subquadrato, thorace globoso, antennis nigris. T. 5. p. 336.
Ch. obscura. L. S. N. p. 599.
1081. *Cb. chrysocephala*, cylindrica, coeruleo-nigra, capite antice pedibusque quatuor anteriores rufo-flavis. T. 5. p. 337.
Ch. chrysocephala. L. S. N. p. 594.
1082. *Cb. exoleta*, cylindrica, flavo-testacea, ab domine nigro, elytris punctatis. T. 5. p. 338.
Ch. exoleta. L. S. N. p. 594.
1083. *Cb. bifasciata*, cylindrica, nigra, elytris flavis fasciis binis transversis undatis nigris, anten-

antennis brevioribus ferratis. T. 7. p. 664.
t. 49. f. 17.

Fam. 3.

1084. *Cb. rubra Lilioram*, rubrá, thorace tereti, capite antennis pedibus abdomineque subtus nigris. T. 5. p. 339.

Ch. merdigera. L. S. N. p. 599.

1085. *Cb. cyanella*, coeruleo-violacea, thorace tereti: lateribus gibbis. T. 5. p. 340.

Ch. cyanella. L. S. N. p. 600.

1086. *Cb. Asparagi*, oblonga, thorace tereti rubro: punctis duobus nigris, elytris flavo-pallidis: maculis viridi-coeruleis nitidis. T. 5. p. 341.

Ch. Asparagi. L. S. N. p. 601.

1087. *Cb. melanopa*, oblonga, viridi-coerulea nitida, thorace tereti pedibusque flavo-rufis. T. 5. p. 342.

Ch. melanopa. L. S. N. p. 601.

1088. *Cb. sanguinea*, oblonga, rubra, thorace elytrisque teretibus; antennis nigris basi rufis. T. 5. p. 355. t. 16. f. 16.

1089. *Cb. unifasciata*, oblonga, thorace tereti pedibusque rufis, capite elytrisque nigris: medio fascia longitudinali flava. T. 7. p. 664. t. 49. f. 18. 19.

Fam. 4.

1090. *Cb. rufipes*, saltatoria, ovata, coerulea, capite thorace pedibusque rufis, antennis dimidio rufis fuscisque, elytris laevibus. T. 5. p. 343. t. 10. f. 11 — 13.

Ch. rufipes. L. S. N. p. 595.

1091. *Cb. coeruleo-striata*, saltatoria, ovata, coerulea, capite thorace antennis pedibusque rufis, elytris striatis. T. 5. p. 343.

1092. *Cb. oleracea*, saltatoria, ovata, tota viridi-coerulea, antennis nigris. T. 5. p. 344.
Ch. oleracea. L. S. N. p. 593.
1093. *Cb. violaceo-punctata*, saltatoria, ovata, thorace punctato virescenti-coeruleo, elytris violaceis punctato-striatis, pedibus rufis. T. 5. p. 344.
1094. *Cb. Hyoscyami*, saltatoria, ovata, viridi-coeruleo-resenti-aenea, elytris punctatis, pedibus rufis, femoribus posticis viridi-aeneis. T. 5. p. 345.
Ch. Hyoscyami. L. S. N. p. 594.
1095. *Cb. viridi-aurata*, saltatoria, ovata, viridi-aurata nitidissima, pedibus antennisque rufis, elytris punctatis. T. 5. p. 345.
Ch. Helixines. L. S. N. p. 594.
1096. *Cb. viridi-coerulea*, saltatoria, ovata, viridi-coerulea nitidissima, thorace laevi, antennae pedibusque rufis, femoribus posticis nigris. T. 5. p. 346.
1097. *Cb. nitidula*, saltatoria, ovata, elytris coeruleis seu viridibus, thorace aureo, antennae pedibusque rufis, femoribus posticis nigris. T. 5. p. 347.
Ch. nitidula. L. S. N. p. 594.
1098. *Cb. lineata*, saltatoria, ovata, nigra nitida, elytris fascia flava longitudinali. *Cb. fastigata*. T. 5. p. 347.
Ch. nemorum. L. S. N. p. 595.
1099. *Cb. fusca*, saltatoria, subglobosa, obscure fusca nitida. T. 5. p. 348.
Ch. hemisphaerica. L. S. N. p. 595.
1100. *Cb. melanocerphala*, saltatoria, pallide flava, capite ab domine femoribusque posticis nigris. T. 5. p. 348.

1101.

1101. *Ch. Surinamensis*, saltatoria, thorace rubro-pallido, elytris rufis: fascia transversali coccinea, antennis pedibusque griseis. T. 5. p. 355. t. 16. f. 17. 18.

Ch. Surinameensis. L. S. N. p. 595.

1102. *Ch. aequinoctialis*, saltatoria, thorace carneo, elytris violaceis nitidis: singulo maculis quatuor albi. T. 5. p. 356. t. 16. f. 19.

Ch. aequinoctialis. L. S. N. p. 596.

1103. *Ch. bicolor*, saltatoria, rubra, elytris coeruleis nitidissimis. T. 5. p. 357. t. 16. f. 20.

Ch. bicolor. L. S. N. p. 593.

1104. *Ch. S. litera*, saltatoria, griseo-flava, elytris fuscis: fascia longitudinali flexuosa albida. T. 5. p. 357. t. 16. f. 21.

Ch. S. litera. L. S. N. p. 595.

69. CECINELLA.

Fam. I.

1105. *C. impunctata*, coleopteris rubris: puncta nulle. T. 5. p. 369.

C. impunctata. L. S. N. p. 579.

1106. *C. bipunctata*, coleopteris rubris: punctis nigris duobus. T. 5. p. 369.

C. bipunctata. L. S. N. p. 580.

1107. *C. quinquepunctata*, coleopteris rubris: punctis tribus magnis duobusque minimis. T. 5. p. 370.

C. quinquepunctata. L. S. N. p. 580.

1108. *C. septempunctata*, coleopteris rubris: punctis nigris septem. T. 5. p. 370. t. 10. f. 14 — 20.

- C. septempunctata.* L. S. N. p. 581.
1109. *C. septemmaculata*, rubra seu flava, coleopteris maculis tribus magnis irregularibus, quatuor rotundis nigris. T. 5. p. 373.
- C. Lin. Faun. Suec. No. 2271.*
1110. *C. novempunctata*, coleopteris rubris: punctis nigris novem. T. 5. p. 373.
- C. novempunctata.* L. S. N. p. 581.
1111. *C. decempunctata*, coleopteris flavo-rubris: punctis nigris decem in cruce directis. T. 5. p. 374.
- C. decempunctata.* L. S. N. p. 581.
1112. *C. undecimpunctata*, coleopteris rubris: punctis nigris undecim. T. 5. p. 375.
- C. undecimpunctata.* L. S. N. p. 581.
1113. *C. tredecimpunctata*, coleopteris rubris: punctis nigris tredecim. T. 5. p. 375.
- C. tredecimpunctata.* L. S. N. p. 582.
1114. *C. quindecimpunctata*, coleopteris rubris: punctis quindecim nigris flavo-marginatis. T. 5. p. 376. t. 10. f. 1 — 16.
- C. ocellata.* L. S. N. p. 582.
1115. *C. rosea*; coleopteris rubris roseis: punctis sedecim nigris, quibusdam connexis, thorace flavo: punctis nigris. T. 5. p. 378.
- C. conglobata.* L. S. N. p. 583.
1116. *C. vigintiduopunctata*, coleopteris flavo-citri: punctis viginti duobus thoracisque quinque nigris. T. 5. p. 379.
- C. vigintiduopunctata.* L. S. N. p. 583.
1117. *C. vigintiduopunctata obscura*, coleopteris obscure rubris: punctis viginti duobus nigris connexis. T. 5. p. 380.
- C. vigintiquinquepunctata.* L. S. N. p. 583.
- 1118.

1118. *C. vigintiquatuorpunctata*, coleopteris rufo-fuscis: maculis quatuordecim; quibusdam connexis punctisque decem nigris. T. 5. p. 381.

C. vigintiquatuorpunctata. L. S. N. p. 583.

1119. *C. hieroglyphica*, coleopteris flavo-rubris: fasciis irregularibus sinuatis nigris. T. 5. p. 382.

C. hieroglyphica. L. S. N. p. 580.

1120. *C. obliterata*, coleopteris flavis: punctis sex nigris pallidis, thorace flavo-albicante punctis nigris. T. 5. p. 382.

C. obliterata. L. S. N. p. 584.

1121. *C. tessellata*, coleopteris pallide flavis: maculis plurimis quadratis nigris connexis. T. 5. p. 383.

C. conglomerata. L. S. N. p. 583.

1122. *C. livida*, coleopteris griseo-lividis: postice maculis binis oblongis fuscis. T. 5. p. 383.

1123. *C. maculata*, ovata, coleopteris rubris: maculis magnis novem nigris, intermediis tribus in futuram positis. T. 5. p. 392. t. 16. f. 23.

Fam. 2.

1124. *C. oblongo-guttata*, coleopteris flavo-rubris: lineis maculisque oblongis sordide albidis. T. 5. p. 384.

C. oblongo-guttata. L. S. N. p. 584.

1125. *C. quatuordecimguttata*, coleopteris rufis: punctis quatuordecim albis. T. 5. p. 385.

C. quatuordecimguttata. L. S. N. p. 583.

1126. *C. sedecimguttata*, coleopteris luteis: punctis albis sedecim. T. 5. p. 385.

C. se-

~~██████████~~
C. sedecimguttata. L. S. N. p. 584.

1127. *C. vigintiguttata*, flavo-rubra seu nigra, coleopteris maculis magnis albis viginti. T. 5. p. 386.

C. vigintiguttata. L. S. N. p. 584.

C. tigrina. L. S. N. p. 586.

Fam. 3.

1128. *C. bipustulata*, coleopteris nigris: maculis duabus ovatis rubris, abdomine sanguineo. T. 5. p. 387. t. 10. f. 21 — 25.

C. bipustulata. L. S. N. p. 585.

1129. *C. quadripustulata*, coleopteris nigris: maculis quatuor rubris, anterioribus lunatis, posterioribus rotundis. T. 5. p. 389.

C. quadripustulata. L. S. N. p. 585.

1130. *C. sexpustulata*, coleopteris nigris: maculis duabus magnis, quatuor minoribus rubris. T. 5. p. 390.

C. sexpustulata. L. S. N. p. 585.

1131. *C. decempustulata*, coleopteris nigris, maculis decem fulvis, anterioribus saepe connexis. T. 5. p. 390.

C. decempustulata. L. S. N. p. 585.

1132. *C. quatuordecimpustulata*, coleopteris nigris: maculis quatuordecim aequalibus flavis. T. 5. p. 391.

C. quatuordecimpustulata. L. S. N. p. 585.

1133. *C. pantberina*, coleopteris nigro-fuscis: maculis decem albo-flavescens. T. 5. p. 392.

C. pantherina. L. S. N. p. 585.

1134. *C. tripustulata*, coleopteris nigris: maculis tribus oblongis rubris. T. 5. p. 393. t. 16. f. 23.

1135.

1135. *C. flavo-maculata*, nigra, maculis fasciisque undatis coadunatis flavis. T. 7. p. 665. t. 48. f. 24.
1136. *C. sphaeroidea*, nigra, elytris singulis circulo elongatissimo flavo. T. 7. p. 665. t. 48. f. 25.

70. MUSCAE.

Fam. I.

1137. *M. grossa*, antennis setariis, pilosa nigra, capite flavo, oculis fuscis, alis basi ferrugineis. T. 6. p. 21. t. 1. f. 1. 2.
- M. grossa*. L. S. N. p. 991.
1138. *M. capitata*, antennis setariis, pilosa, capite magno pallide flavo nitido, thorace griseo, abdomine rufo fascia dorsali nigra. T. 6. p. 23. t. 1. f. 3 — 5.
1139. *M. major Larvarum*, antennis setariis, pilosa nigra, thorace lineis longitudinalibus atris, abdomine maculis cinereis; major. T. 6. p. 24. t. 1. f. 6 — 8. T. 1. p. 196. t. 11. f. 22 — 24.
- M. Larvarum*. L. S. N. p. 992.
1140. *M. minor Larvarum*, antennis setariis, pilosa nigra, thorace lineis longitudinalibus atris, abdomine maculis cinereis; minor. T. 6. p. 25.
1141. *M. minor domestica*, antennis setariis, pilosa nigra, abdomine maris fasciis transversis atris, lateribus flavo-rufis. T. 6. p. 26.
1142. *M. pluvialis*, antennis setariis, pilosa cinerea, thorace maculis rotundatis abdomenque



que maculis novem trigonis nigris. T. 6.

p. 27.

M. pluvialis. L. S. N. p. 992.

1143. *M. rufo-maculata*, antennis setariis, pilosa nigra, abdomine lateribus macula magna ferruginea, alis fuscis postice hyalinis. T. 6. p. 28. t. 1. f. 9. 10.

1144. *M. rotundata*, antennis setariis, subglabra, capite magno albido, thorace nigro lateribus albido, abdomine subrotundo rufo: maculis quatuor nigris. T. 6. p. 29. t. 1. f. 11.

M. rotundata. L. S. N. p. 991.

1145. *M. cylindrica*, antennis setariis, pilosa, cinereo-nigra, abdomine elongato cylindrico: medio rufo. T. 6. p. 30. t. 1. f. 12

— 14.

1146. *M. latrinarum*, antennis setariis, pilosa cinerea, abdomine elongato conico rufo, pedibus griseo-flavis, alis-abdomine duplo longioribus. T. 6. p. 31. t. 1. f. 15 — 18.

M. ferrata. L. S. N. p. 993.

1147. *M. vibrans*, antennis setariis, pilosa, coeruleo-nigra nitida capite rubro, alarum apice punto fusco. T. 6. p. 32. t. 1. f. 19. 20.

M. vibrans. L. S. N. p. 995.

1148. *M. cynipsea*, antennis setariis, pilosa, nigro-aenea nitidissima, capite nigro, alis versus apicem puncto nigro. T. 6. p. 33.

M. cynipsea. L. S. N. p. 997.

1149. *M. flava*, antennis setariis, pilosa, tota flava, oculis viridi-aureis. T. 6. p. 34.

M. flava. L. S. N. p. 997.

1150.

1150. *M. gibbosa*, antennis setariis, pilosa nigro-cinerea, oculis rubris, thorace lineis quatuor abdomineque punctis nigris. T. 6. p. 35. t. 2. f. 1 — 5.
1151. *M. geniculata*, antennis setariis, pilosa grisea, occipite abdome pedibusque rufo-flavis, rostro retro-geniculato. T. 6. p. 38. t. 2. f. 19 — 22.
- ** alis maculatis, foeminae ano elongato.
1152. *M. Arctii*, antennis setariis, pilosa, viridi-flava, oculis aureis, alis fasciis quaternis transversalibus pallide fuscis. T. 6. p. 42. t. 6 — 14.
- M. folstitalis*. L. S. N. p. 999.
1153. *M. Leontodontis*, antennis setariis, pilosa, vi-ridi-grisea, oculis viridibus, antennis pedibusque flavo-testaceis, alis albis fusco-maculatis. T. 6. p. 46. t. 2. f. 15 — 18.
- M. Hyoseyami*. L. S. N. p. 998.
1154. *M. Cardui*; antennis setariis, pilosa nigra, capite antennisque rufis, alis albis: fascia flexuosa fusca. T. 6. p. 49.
- M. Cardui*. L. S. N. p. 998.
1155. *M. Cerasi*, antennis setariis, pilosa rufa, pedibus flavo-testaceis, oculis viridibus, scutello luteo, alis albis: fasciis inaequalibus flexuosis fuscis. T. 6. p. 50.
- M. Cerasi*. L. S. N. p. 998.
1156. *M. Arnicae*, antennis setariis, pilosa, flavo-testacea, oculis viridibus, alis albis fusco-maculatis venisque flavis. T. 6. p. 51.
- M. Arnicae*. L. S. N. p. 997.
- .. Fam. 2.
1157. *M. pellucens*, antennis plumatis, pilosa nigra, fronte flava, abdominis segmento se-
conde

cundo albo pellueido, alis macula venis-
que fuscis. T. 6. p. 53. t. 3. f. 1 — 3.

M. pellucens. L. S. N. p. 989.

1158. *M. meridiana*, antennis plumatis, pilosa ni-
gra, fronte flava, alis basi flavo-testaceis.
T. 6. p. 55.

M. meridiana. L. S. N. p. 989.

1159. *M. apivora*, antennis plumatis, pilosa, ca-
pite flavo, thorace nigro, abdomine fasciis
flavis nigrisque, alis flavescentibus fulco-
maculatis. T. 6. p. 56. t. 3. f. 4.

1160. *M. carnaria coerulea*, antennis plumatis, pi-
losa, thorace nigro, abdomine coeruleo ni-
tente fasciis nigris. T. 6. p. 57.

M. vomitoria. L. S. N. p. 989.

1161. *M. corysocephala*, antennis plumatis, pilosa,
capite aureo-flavo, thorace nigro-violaceo,
abdomine viridi-coeruleo nitente. T. 6.
p. 60.

M. mortuorum. L. S. N. p. 989.

1162. *M. Caesar*, antennis plumatis, pilosa, vi-
ridi-nitens, pedibus nigris. T. 6. p. 61.

M. Caesar. L. S. N. p. 989.

1163. *M. viridi-coerulea*, antennis plumatis, pilo-
sa, thorace viridi-coeruleo nitente, abdo-
mene coeruleo-violaceo, pedibus nigris.
T. 6. p. 62.

M. cadaverina. L. S. N. p. 989.

1164. *M. vivipara major*, antennis plumatis, pi-
losa cinerea, oculis rubris, thorace lineis
tribus nigris, abdomine maeulis nigris ci-
nerisque tessellato; major. T. 6. p. 63. t.
3. f. 5 — 18.

M. carnaria. L. S. N. p. 990.

1165.

1165. *M. vivipara minor*, antennis plumatis, pilosa cinerea, oculis rubris, thorace lineis tribus nigris, abdomine maculis nigris cinereisque tessellato; minor. T. 6. p. 70.
1166. *M. domestica major*, antennis plumatis, pilosa, thorace cinereo-nigro lineis obscuris, abdomine nigro-fusco maculis nigris: subtus pallide flavo-fusco, alarum basi fulva. T. 6. p. 72. t. 4. f. 1 — 11.
- M. domestica*. L. S. N. p. 990.
1167. *M. prangens*, antennis plumatis, pilosa, griseo-cinerea nigro-maculata, rostro longo corneo porrecto. T. 6. p. 78. t. 4. f. 12 — 18,
- Conops calcitrans*. L. S. N. p. 1004.
1168. *M. autumnalis*, antennis plumatis, pilosa nigra, abdomine flavo-testaceo: fascia longitudinali dorsali nigra. T. 6. p. 83.
1169. *M. maculata*, antennis plumatis, pilosa, nigro-cinerea maculis nigris, thorace lineis quatuor nigris. T. 6. p. 84. t. 3. f. 19 — 22.
- M. maculata*. L. S. N. p. 990.
1170. *M. vaccarum*, antennis plumatis, pilosa, thorace nigro, abdomine griseo hirsutissimo, alis basi fusca. T. 6. p. 85. t. 5. f. 1.
- M. meteorica*. L. S. N. p. 993.
1171. *M. tentaculata*, antennis plumatis, pilosa nigra, abdomine maculis nigris cinereisque, rostro tentaculis magnis flavescenibus ovatis depresso. T. 6. p. 86.
1172. *M. testacea*, antennis plumatis, pilosa, tota flavo-testacea, pilis nigris, oculis brunneis. T. 6. p. 87.

1173. *M. ftercoraria*, antennis plumatis, pilosa, hirsutissima, griseo-flava, fronte rufa, alis puncto fusco. T. 6. p. 88.

M. ftercoraria. L. S. N. p. 996.

1174. *M. Fungorum*, antennis oblongis plumatis, pilosa, corpore ovato brevi, thorace griseo cinereo, abdomine pedibusque flavo-rufis. T. 6. p. 89. t. 5. f. 2 — 16.

1175. *M. rufa*, antennis plumatis, pilosa flavo-rufa, oculis viridi-nigris. T. 6. p. 96. t. 5. f. 17.

1176. *M. variegata*, antennis plumatis, pilosa, griseo-fulva, thorace punctis fuscis, oculis obscuris, alis fusco-maculatis. T. 6. p. 96, t. 6. f. 1.

1177. *M. erythrocephala*, antennis plumatis, pilosa, corpore brevi depresso viridi-aeneo, capite testaceo, oculis fuscis. T. 6. p. 146. t. 29. f. 2.

Fam. 3.

1178. *M. porcina*, antennis setariis, tomentosa, fulca, capite linea nigra nitida, thorace griseo, abdomine antice maculis fulvis. T. 6. p. 99.

M. tenax. L. S. N. p. 984.

1179. *M. florea*, antennis setariis, tomentosa, nigra, capite thoraceque pilis viridi-flavis, abdomine fasciis quatuor luteis: prima maijore interrupta. T. 6. p. 100. t. 6. f. 2.

M. florea. L. S. N. p. 984.

1180. *M. pendula*, antennis setariis, tomentosa, nigra, capite flavo fascia nigra, thorace lineis quatuor longitudinalibus abdomine-que

que fasciis tribus interruptis flavis. T. 6.
p. 102.

M. pendula. L. S. N. p. 984.

1181. *M. Ribesii*, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo pilis flavescensibus, abdomine nigro: fasciis quatuor transversis flavis: prima interrupta. T. 6. p. 103. t. 6. f. 3 — 19.

M. Ribesii. L. S. N. p. 987.

1182. *M. Rosae*, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo, abdomine nigro: tribus paribus lunularum albicantum. T. 6. p. 108. t. 6. f. 14 — 21.

M. Pyrastris. L. S. N. p. 987.

1183. *M. Pinastris*, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo, abdomine nigro: quatuor paribus macularum transversarum flavarum. T. 6. p. 113. t. 7. f. 1 — 7.

1184. *M. balteata*, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo, abdomine nigro: alternatim fasciis lineisque transversis flavo-testaceis: prima interrupta. T. 6. p. 116.

1185. *M. mellina*, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo, abdomine nigro: maculis octo tetragonis flavo-testaceis. T. 6. p. 117.

M. mellina. L. S. N. p. 986.

1186. *M. citreo-fasciata*; antennis setariis, tomentosa nigra, thorace lineis binis lateralibus scutelloque luteis, abdomine cingulis quatuor luteis interruptis. T. 6. p. 118.

M. festiva. L. S. N. p. 986.

1189. *M. Menthastris*, antennis setariis, tomentosa nigra, corpore elongato depresso, thorace luteo maculato, abdomine cingulis qua-

M a tuor,



tuor, scutello pedibusque flavis. T. 6.
p. 119.

M. Menthastri. L. S. N. p. 987.

1188. *M. pipiens*, antennis setariis, tomentosa nigra, corpore elongato cylindrico, abdome maculis sex albidis, femoribus posticis clavatis dentatis. T. 6. p. 120. t. 7.
f. 8. 9.

M. pipiens. L. S. N. p. 988.

1189. *M. segnis*, antennis setariis, tomentosa, corpore elongato depresso, thorace aeneo, abdome rufo extremitatibus nigro, femoribus posticis clavatis spinosis. T. 6. p. 121.
t. 7. f. 10 — 12.

M. segnis. L. S. N. p. 988.

1190. *M. Vespiformis*, antennis setariis, tomentosa nigra, pedibus antennisque flavis, alis fulvo-variegatis, abdomine cingulis luteis alternatim latis. T. 6. p. 123. t. 7. f. 13.

M. Vespiformis. L. S. N. p. 986.

1191. *M. fasciolata*, antennis setariis elongatis, tomentosa nigra, pedibus flavis, thorace maculis lateralibus, abdomine cingulis quatuor interruptis duobusque integris flavis. T. 6. p. 124. t. 7. f. 14. 15.

1192. *M. arcuata*, antennis setariis elongatis, tomentosa nigra, pedibus flavis, thorace maculis lateralibus, abdomine cingulis quatuor interruptis arcuatis flavis. T. 6.
p. 125.

M. arcuata. L. S. N. p. 985.

1193. *M. bicincta*, antennis setariis elongatis, tomentosa nigra, abdomine cingulis duobus flavis,

flavis, alis macula nigricante. T. 6. p. 126.
t. 7. f. 16. 17.

M. bicincta. L. S. N. p. 985.

1194. *M. ruficandis*, antennis setariis, tomentosa nigra, fronte flava, abdominis apice villo-
sissimo fulvo. T. 6. p. 127.

M. fallax. L. S. N. p. 985.

1195. *M. Apiformis*, antennis setariis elongatis, to-
mentosa, capite thoraceque aeneis: villis
rufis, abdomine nigro: villis aureis, pedi-
bus dilatatis flavo-rufis. T. 6. p. 128. t. 7.
f. 18 — 20.

1196. *M. rostrata*, antennis setariis, tomentosa,
abdomine ovato brevi flavo, thorace nigro,
capite rostrato conico. T. 6. p. 130. t. 7.
f. 21 — 23.

Conops rostrata. L. S. N. p. 1004.

1197. *M. surinamensis*, antennis setariis, tomen-
tosa, fusca, scutello rufo, abdomine ma-
culis binis magnis cingulisque tribus flave-
testaceis. T. 6. p. 145. t. 29. f. 1.

Fam. 4.

1198. *M. Bombylina*, antennis plumatis, tomentosa
nigra, thorace abdominisque apice rufis,
alarum basi fulva. T. 6. p. 133. t. 8. f.
1 — 3.

M. mystacea. L. S. N. p. 983.

1199. *M. plumata*, antennis plumatis elongatis, to-
mentosa nigra, fronte flava, thorace villosa
viridi-flavis, abdominis apice villoso rufo
l. griseo. T. 6. p. 134. t. 8. f. 4 — 9.

M. mystacea. β. Lin. Faun. Suec. No. 1793.

1200. *M. intricaria*, antennis plumatis lenticularibus, tomentosa nigra, capite thoraceque villis rufis, abdominis apice villoso griseo. T. 6. p. 138. t. 8. f. 10. 11.

M. intricaria. L. S. N. p. 985.

1201. *M. oestracea*, antennis plumatis, tomentosa nigra, scutello albido, capite antice thoraceque postice villis albis, abdominis apice villoso rufo, tarsis flavis. T. 6. p. 139.

M. Oestracea. L. S. N. p. 985.

1202. *M. berticola*, antennis plumatis, tomentosa, abdomine nigro; maculis binis lateralibus magnis cingulisque tribus flavo-testaceis. T. 6. p. 140. t. 8. f. 12. 13.

M. nemorum. L. S. N. p. 984.

1203. *M. Lappona*, antennis plumatis nigris, tomentosa nigra, fronte flava: linea nigra, abdomine cingulis tribus flavis apice rufo. T. 6. p. 142. t. 8. f. 14.

M. Lappona. L. S. N. p. 983.

1204. *M. Mantis*, antennis plumatis, glabra nigra, abdomine depresso aeneo, femoribus anticis grossis, tibiis antice unguiculatis. T. 6. p. 143. t. 8. f. 15 — 17.

71. STRATIOMYS.

1205. *St. Chamaeleon*, nigra, scutello luteo, abdome supra maculis sex lateralibus citro-luteis. T. 6. p. 151.

Musca Chamaeleon. L. S. N. p. 979.

1206. *Microlooon*, thorace scutelloque aeneis, abdome supra nigro: lineis sex lateralibus flavis. T. 6. p. 152. t. 9. f. 1 — 3.

Musca

Musca Microleon. L. S. N. p. 980.

1207. *St. Hydroleon*, thorace aeneo, abdomine viridi: fascia lata longitudinali undata nigra, pedibus flavis. T. 6. p. 154. t. 9. f. 4. 5.

Musca Hydroleon. L. S. N. p. 980.

72. **NEMOTELVS.**

Fam. 1.

1208. *N. scolopaceus*, antennis filatis setigeris, thorace nigro, abdomine flavescente supra nigro-punctata, pedibus flavis, alis fusco-maculatis. T. 6. p. 162. t. 9. f. 6 — 9.

Musca scolopacea. L. S. N. p. 982.

1209. *N. annulatus*, griseus, antennis filatis setigeris, abdomine annulis flavo-testaceis, pedibus flavis, alis immaculatis. T. 6. p. 164.

1210. *N. maculatus*, griseo-niger, antennis filatis setigeris, abdomine annulis flavo-testaceis, pedibus flavis nigro-maculatis, alis macula flava apicibus fusca. T. 6. p. 165.

1211. *N. rufus*, antennis filatis setigeris, abdomine rufo-flavo: foeminae nigro-maculato, pedibus rufis, alis maculatis. T. 6. p. 166. t. 9. f. 11 — 18.


1212. *N. Vermileo*, flavus, antennis filatis setigeris, thorace striis quatuor abdomineque quinquefariam nigro-punctato, alis immaculatis. T. 6. p. 168. t. 10. f. 1 — 10.

Musca Vermileo. L. S. N. p. 982.

1213. *N. fulvus*, antennis filatis setigeris, abdomine flavo-fulvo, pedibus flavescentibus, alis immaculatis. T. 6. p. 203. t. 29. f. 3 — 5.

M 4

Fam.



Fam. 2.

1214. *N. cinctus*, antennis cylindricis muticis, abdome elongato conico nigro: annulis tribus femoribusque rufis. T. 6. p. 183. t. 9. f. 19 — 21.
1215. *N. flavipes*, antennis cylindricis muticis, abdome elongato conico atro nitido, pedibus rufo-flavis, alis maculatis basi flavis. T. 6. p. 185. t. 9. f. 22, 23.
1216. *N. fasciatus*, griseus, antennis cylindricis muticis, abdomine elongato conico nigro: fasciis griseis, capite subtus lanigerò albido. T. 6. p. 186. t. 11. f. 1 — 4.
1217. *N. hirtus*, flavo-fuscus, antennis cylindricis muticis, oculis aeneis, corpore elongato conico villis rufis fasciisque fulvis. T. 6. p. 187.
1218. *N. niger*, aterrimus, antennis cylindricis muticis, corpore oblongo, tarsis fuscis, alis nigris. T. 6. p. 188. t. 11. f. 5. 6.
1219. *N. fenestralis*, niger, antennis cylindricis muticis, abdomine oblongo: fasciis quatuor albis, alis nigro-fuscis. T. 6. p. 189.
Musca fenestralis. L. S. N. p. 981.
1220. *N. Afloides*, niger, antennis cylindricis muticis, abdomine longo cylindrico; segmento secundo rufo-flavo, alis fuscis. T. 6. p. 204. t. 29. f. 6. 7.
1221. *N. illucens*, niger, antennis cylindricis muticis, abdomine oblongo depresso: segmento secundo flavo pellucido, alis fusco-violaceis. T. 6. p. 205. t. 29. f. 8. 9.
Musca illucens. L. S. N. p. 979.

Fam.

Fam. 3.

1222. *N. Hottentottus*, antennis acutis, corpore lato nigro hirsutissimo: villis viridi-flavis, alis hyalinis costa exteriore fuscis. T. 6. p. 190. t. 11. f. 7 — 10.

Musca Hottentotta. L. S. N. p. 981.

1223. *N. Maurus*, antennis acutis, corpore lato nigro hirsuto, thorace lateribus villis flavo-albidis, abdomine fasciis villosis albis, alis dimidiato-nigris albisque. T. 6. p. 191. t. 11. f. 11. 12.

Musca Maura. L. S. N. p. 981.

1224. *N. Morio*, antennis acutis, corpore lato nigro hirsuto: lateribus villis nigris, ano fasciculis binis albis, alis dimidiato-nigris albisque. T. 6. p. 192. t. 11. f. 13.

Musca Merio. L. S. N. p. 981.

1225. *N. tigrinus*, antennis acutis, corpore lato hirto rufescenti-atro albo-maculato, alis albis nigro-maculatis. T. 6. p. 206. t. 29. f. 11 — 17.

Fam. 4.

1226. *N. aeneus*, antennis clavatis apice setigeris, corpore brevi conico viridi-aeneo, oculis aureis, pedibus pallide flavis. T. 6. p. 194. t. 11. f. 14 — 22. t. 12. f. 1 — 3.

1227. *N. cuprarius*, antennis clavatis apice setigeris, abdomine oblongo depresso violaceo-cupreo, thorace viridi-aurato, alis macula fusca. T. 6. p. 200. t. 12. f. 4, 5.

Musca cupraria. L. S. N. p. 994.

1228. *N. flavo-geniculatus*, antennis clavatis apice setigeris, capite hirsutissimo, abdomine oblongo depresso viridi-aureo, pedibus nigris: geniculis flavis, alis flavo-fuscis. T. 6. p. 201.
1229. *N. auratus*, antennis clavatis apice setigeris, capite nudo, abdomine ovato brevi viridi-aureo-nitido, femoribus nigris, tibiis testaceis aliquae hyalinis. T. 6. p. 202.
1230. *N. aequinoctialis*, glaber niger, antennis clavatis apice setigeris, corpore tereti longo, capite fulvo oculis rubris, alis fuscis pedibusque longissimis violaceis. T. 6. p. 207. t. 29. f. 14. 15.

Musca aequinoctialis. L. S. N. p. 995.

73. TABANVS.

Fam. I.

1231. *T. bovinus*, fuscus, antennis lunulatis, oculis viridibus, tibiis flavis, abdomine lineis transversis maculisque trigonis pallide flavis. T. 6. p. 219. t. 12. f. 6 — 14.
T. bovinus. L. S. N. p. 1000.
1232. *T. tropicus*, fuscus, antennis lunulatis, oculis viridibus: fasciis ternis purpureis, pedibus fuscis, abdominis lateribus macula magna rufa. T. 6. p. 220. t. 12. f. 15 — 22.
T. tropicus. L. S. N. p. 1001.
1233. *T. maculatus*, antennis lunulatis, oculis viridibus: fascia purpurescente unica, corpore griseo-cinereo-nigroque variegato. T. 6. p. 221.
T. Bromius. L. S. N. p. 1001.

1234.

1234. *T. fasciatus*, niger, antennis lunulatis, oculis viridibus: fasciis ternis purpureis, abdominis incisuris griseis. T. 6. p. 222.

1235. *T. giganteus*, fuscus, antennis lunulatis rufis, oculis virescentibus, scutello rufo macula nigra, pedibus ferrugineis. T. 6. p. 226. t. 30. f. 1.

T. calens. L. S. N. p. 1000.

1236. *T. nebulosus*, rufo-fuscus nebulosus, antennis lunulatis pedibusque rufis apice nigris, alis hyalinis vitreis. T. 6. p. 227. t. 30. f. 2.

1237. *T. occidentalis*, fuscus, antennis lunulatis, abdome lineis tribus fulvis, pedibus anticis nigris macula albida, reliquis antennis que fulvis. T. 6. p. 228. t. 30. f. 3.

T. occidentalis. L. S. N. p. 1001.

1238. *T. fervens*, capite antennisque lunulatis flavis, thorace fusco lateribus flavo, abdome flavo: apice alisque fuscis. T. 6. p. 228. t. 30. f. 4.

T. fervens. L. S. N. p. 1000.

1239. *T. exaestuans*, fuscus, antennis lunulatis, thorace griseo, abdome lineis transversis griseis, tibiis albis apice nigris, alis hyalinis. T. 6. p. 229. t. 30. f. 5.

T. exaestuans. L. S. N. p. 1000.

1240. *T. olivaceus*, viridi-olivaceus, antennis lunulatis, oculis flavo-aureis, pedibus viridiibus, alis virescentibus: punctis cestiarum fuscis. T. 6. p. 230. t. 30. f. 6.

T. mexicanus. L. S. N. p. 1000.

Fam.

Fam. 2.

1241. *T. pluvialis*, antennis subulatis, oculis viridibus: fasciis quinis undulatis purpureis, corpore fusco-cinereo, alis fusco-maculatis. T. 6. p. 223. t. 13. f. 4. 2.

T. pluvialis. L. S. N. p. 1001.

1242. *T. coecutiens*, antennis subulatis, oculis aureis purpureo-punctatis, abdomine maculis trigonis flavis, alis maculis tribus fuscis. T. 6. p. 224. t. 13. f. 3 — 5.

T. coecutiens. L. S. N. p. 1001.

1243. *T. variegatus*, flavo-testaceus, antennis subulatis, thorace abdomineque fasciis longitudinalibus fuscis, alis fusco-fasciatiss. T. 6. p. 230. t. 30. f. 7. 8.

74. ASILVS.

Fam. 1.

1244. *A. Bombilius*, hirsutus niger, antennis muticis, abdomine postice albido-griseo, capite villis griseis. T. 6. p. 238. t. 13. f. 6 — 8.

A. gibbosus. L. S. N. p. 1007.

1245. *A. dorsalis*, hirsutus niger, antennis muticis, thorace postice villis viridi-flavis. T. 6. p. 239. t. 13. f. 9.

1246. *A. flavus*, hirsutus niger, antennis muticis, thorace villis albidis, abdomine oyato villis flavo-rufis splendentibus. T. 6. p. 240. t. 13. f. 10 — 13.

A. flavus. L. S. N. p. 1007.

1247. *A. rufus*, hirsutus niger, antennis muticis, alis nigricantibus, abdomine supra villis rufis

rufis splendeatibus. T. 6. p. 241. t. 13.
f. 15 — 18.

A. gilvus. L. S. N. p. 1007.

1248. *A. marginatus*, subhirsutus niger, antennis muticis, alis fuscis, halteribus flavis, abdominis incisuris villoso-flavescentibus. T. 6. p. 242. t. 14. f. 1.

A. marginatus. L. S. N. p. 1008.

1249. *A. rufipes*, niger glaber nitidus, antennis muticis, fronte alba, halteribus flavis, pedibus quatuor anticis fulvis. T. 6. p. 243. t. 14. f. 2.

Fam. 2.

1250. *A. crabroniformis*, subhirsutus, antennis setigeris, abdome antice nigro, postice flavo-fulvo. T. 6. p. 244. t. 74. f. 3.

A. crabroniformis. L. S. N. p. 1007.

1251. *A. cinereus*, subhirsutus, griseo-fusco-nigricans, antennis setigeris, thorace fascia longitudinali nigra, pedibus fuscis, abdome elongato cylindrico. T. 6. p. 246. t. 14. f. 5 — 9.


B. americanus. T. 6. p. 248. t. 14. f. 10, 11.

A. forcipatus. L. S. N. p. 1008.

1252. *A. niger*, subhirsutus, niger, antennis setigeris, tibiis halteribusque rufis. T. 6. p. 249. t. 14. f. 12.

1253. *A. cylindricus*, glaber, niger, antennis setigeris, abdome elongato cylindrico, apice clavato, pedibus flavis, alis corpore brevioribus. T. 6. p. 249. t. 14. f. 13.

A. Oelandicus. L. S. N. p. 1008.



75. EMPIS.

1254. *E. livida*, griseo-fusca, thorace lineis tribus longitudinalibus nigris, pedibus rufis, alis hyalinis. T. 6. p. 254. t. 14. f. 14 — 16.

E. livida. L. S. N. p. 1003.

1255. *E. borealis*, nigra, alis maximis ovatis obscure fuscis, pedibus rufis nigrisque. T. 6. p. 255. t. 14. f. 17 — 19.

E. borealis. L. S. N. p. 1003.

76. CONOPS.

1256. *C. quadriasciata*, nigra, atenannis nigris, abdome fasciis quatuor transversis apiceque flavis, pedibus rufis. T. 6. p. 261. t. 15. f. 1 — 6.

C. aculeata. L. S. N. p. 1005.

1257. *C. trifasciata*, nigra, antennis nigris, abdome fasciis tribus transversis flavis, pedibus flavis nigrisque, alis margine fuscis. T. 6. p. 262. t. 15. f. 7. 8.

1258. *C. macrocephala*, rufa, antennis pedibusque ferrugineis, abdomine fasciis fuscis flavisque, alis fusco-maculatis. T. 6. p. 264.

C. macrocephala. L. S. N. p. 1005.

1259. *C. nigra*, nigra fronte flava, antennis pedibusque ferrugineis, abdomine antice petiolata, alis dimidiato fuscis. T. 6. p. 265. t. 15. f. 9.

77. BOMBYLIVS.

1260. *B. variegatus*, niger, villis griseis, alis dimidiato-fuscis et hyalinis. T. 6. p. 268. t. 15. f. 10. 11.

B. ma-

B. major. L. S. N. p. 1009.

1261. *B. punctatus*, niger, villis fulvis, alis fusco-punctatis. T. 6. p. 269. t. 15. f. 12.

B. medius. L. S. N. p. 1009.

1262. *B. tabaniformis griseus*, griseo-niger, fronte conica grisea, rostro longitudine corporis, abdomine fasciis griseis. T. 6. p. 270. t. 30. f. 9. 10.

Tabanus rostratus. L. S. N. p. 999.

1263. *B. tabaniformis rufus*, fronte conica grisea, rostro longitudine thoracis, abdomine rufo: fasciis binis albis apiceque nigro. T. 6. d. 272. t. 30. f. 11.

Tabanus barbatus. L. S. N. p. 999.

78. HIPPOBOSCA.

1264. *H. equina*, fusca, alis magnis fuscis, unguibus simplicibus. T. 6. p. 275. t. 16. f. 8 — 20.

H. equina. L. S. N. p. 1010.

1265. *H. avicularis*, viridis, alis magnis hyalinis, unguibus appendiculatis. T. 6. p. 285. t. 16. f. 21 — 27.

H. avicularis. L. S. N. p. 1010.

79. OESTRVS.

1266. *Oe. intestinalis*, fulvo-griseus, thorace fascia transversa nigra, alis maculatis, pedibus fulvis. T. 6. p. 292. t. 15. f. 13 — 21. et 23.

Oe. Bovis. L. S. N. p. 969.

1267.

- ~~1266.~~ 1267. *Oë Bovis*, niger, alis immaculatis, thorace antice posticeque villis griseis apiceque flavo-fulvis. T. 6. p. 297. t. 15. f. 22.

Oë haemorrhoidalis. L. S. N. p. 970.

80. Culex.

1268. *C. communis*, nigro-fuscus, abdomine annulis cinereis. T. 6. p. 316. t. 17. f. 1 — 7.

C. pipiens. L. S. N. p. 1002.

81. Tipula.

Fam. 1.

1269. *T. pratensis*, griseo-fusca, antennis filiformibus, alis pallide fuscis immaculatis: costa marginali fusca. T. 6. p. 339. t. 18. f. 12 — 18.

1270. *T. rivoſa*, griseo-fusca carneo mixta, antennis fetaceis brevioribus, alis albis: rivulis longitudinalibus fuscis. T. 6. p. 340. t. 19. f. 1.

1271. *T. lunata*, flavo-grisea, antennis filiformibus, alis pallide fuscis: puncto fusco fasciaque obliqua alba. T. 6. p. 341.

T. lunata. L. S. N. p. 972.

1272. *T. fulvipennis*, grisea, antennis filiformibus, abdomine subtus thoracisque lateribus flavo-fulvis, alis fulvis medio puncto nigro. T. 6. p. 343.

1273. *T. quadrimaculata*, flavo-fulva nigro-maculata, antennis filiformibus, pedibus rufis, femori-

moribus maculis birtis nigris, alis fusco-maculatis. T. 6. p. 344.

T. quadrimaculata. L. S. N. p. 971.

1274. *T. hortorum*, griseo-fusca, antennis filiformibus rufis, alis fusco-alboque maculatis. T. 6. p. 344.

T. hortorum. L. S. N. p. 971.

1275. *T. maculata*, griseo-fusca, antennis filiformibus nigris, abdominis segmentis flavo-marginaliatis, alis fusco-alboque maculatis. T. 6. p. 345.

1276. *T. variegata*, nigra, antennis filiformibus, thorace abdominalisque lateribus luteo-maculatis, alis puncto venisque latiſ fuscis. T. 6. p. 346.

T. variegata. L. S. N. p. 971.

1277. *T. flavo-maculata*, antennis filiformibus, excepte thoraceque citreo-nigro-maculato, abdome flavo-testaceo: lineis nigro-punctatis. T. 6. p. 347. t. 19. f. 2 — 9.

T. eornicina. L. S. N. p. 972.

1278. *T. flavo-fasciata*, aterrima, abdome fasciis transversis flavis, antennis filiformibus, pedibus punctisque alarum fuscis. T. 6. p. 349.

T. crocata. L. S. N. p. 971.

1279. *T. ibicumonea*, atra, antennis filiformibus, abdome antice pedibusque rufis, alis puncto nigro. T. 6. p. 350. t. 19. f. 10 — 11.

N

T. atra

T. atrata. L. S. N. p. 973.

1280. *T. replicata*, fusca, antennis filiformibus, alis pallide fuscis: margine tenuiore recurvato. T. 6. p. 351. t. 20. f. 1 — 16.

T. replicata. L. S. N. p. 973.

1281. *T. biemalis*, nigro-fusca, antennis longis setaceis, alis amplissimis, pedibus longissimis. T. 6. p. 360. t. 21. f. 1 — 5.

1282. *T. fungorum*, rufo-fusca, antennis filiformibus simplicibus, abdome ovato, coxis longissimis, tibiis spinosis. T. 6. p. 361. t. 22. f. 1 — 13.

1283. *T. Agarici seticornis*, nigra, antennis filiformibus simplicibus, thorace rufo, pedibus flavis, coxis longissimis tibiis spinosis. T. 6. p. 367. t. 21. f. 6 — 13.

1284. *T. culiciformis*, fusca, antennis filiformibus maris plumosis, abdome pedibusque griseis, costis alarum hirtis. T. 6. p. 372. t. 23. f. 3 — 12.

1285. *T. pedella*, nigra, antennis filiformibus plumosis, abdome viridi apice nigro, alis hyalinis, pedibus griseis nigro-maculatis. T. 6. p. 378. t. 19. f. 12. 13.

1286. *T. annularis*, griseo-fusca, antennis filiformibus: maris plumosis, abdome fasciis nigris, alis hyalinis puncto nigro. T. 6. p. 379. t. 19. f. 14. 15.

T. plumosa. L. S. N. p. 974.

1287.

1287. *T. amphibia*, nigra, antennis filiformibus simplicibus, costis alarum villoso-fusco. T. 6. p. 380. t. 24. f. 1 — 14.
1288. *T. crystallina*, griseo-cinerea, antennis filiformibus: maris plumatis, corpore villoso, thoracis lateribus fascia pallide grisea. T. 6. p. 386.
1289. *T. nigra aquatica*, nigra, antennis filiformibus: maris plumatis, alis albis ab domine brevioribus: puncto nigro, pedibus anticis longioribus. T. 6. p. 387.
1290. *T. saceraria*, nigra, antennis filiformibus: maris plumatis, alis niveis totis. T. 6. p. 388. t. 22. f. 14 — 20. t. 23. f. 1. 2.
1291. *T. clavata maculata*, cinerea nigro-maculata, antennis clavatis: maris plumatis, alis albidis: maculis pallide nigris. T. 6. p. 394. t. 24. f. 15 — 19.

Fam. 2.

1292. *T. nigro-crecea*, flavo-drocea, antennis pectinatis, capite thoraceque supra nigris, ab domine maculis nigris, alis puncto fusco. T. 6. p. 400. t. 25. f. 1 — 6.

T. pectinicornis. L. S. N. p. 970.

1293. *T. bimaculata*, nigra, antennis pectinatis, abdominis lateribus, pedibusque flavis, alis maculis duabus fuscis. T. 6. p. 402.

T. bimaculata. L. S. N. p. 972.

~~+~~
Fam. 3.

1294. *T. juniperina*, fusca, antennis nodosis, alis ovatis hirsutis: costis tribus. T. 6. p. 404. t. 25. f. 7 — 21.

T. juniperina. L. S. N. p. 977.

β. T. 6. p. 412. t. 26. f. 1 — 7. an varietas?

1295. *T. Pini*, nigro-fusca, antennis longis villosis nodosis, collaris rubro, pedibus argenteis, alis ovatis hirsutis: costis tribus. T. 6. p. 417. t. 26. f. 8 — 19.

1296. *T. Loti*, nigra, antennis longis nodosis, alis ovatis hirsutis: costis tribus. T. 6. p. 420. t. 27. f. 1 — 5.

1297. *T. Phalaenoides*, hirsutissima cinerea, antennis nodosis, alis deflexis ovato-lanceolatis hirsutissimis ciliatis immaculatis. T. 6. p. 422. t. 27. f. 6 — 9.

T. Phalaenoides. L. S. N. p. 977.

1298. *T. hirta*, hirsutissima nigro-cinerea, antennis nodosis; alis deflexis ovatis hirsutissimis ciliatis nigro-maculatis. T. 6. p. 424. t. 27. f. 10. 11.

T. hirta. L. S. N. p. 977.

1299. *T. atomaria*, aptera, elongata, griseo-fusca, antennis longis filiformibus nodosis. T. 7. p. 600. t. 44. f. 27. 28.

Fam. 4.

1300. *T. Iohannis*, atra, antennis brevibus subulatis, pedibus foeminae rufis, alis puncto nigro,

gro, tibiis anticis spina terminatis. T. 6.
p. 425. t. 27. f. 12 — 20.

T. Iohannis. L. S. N. p. 976.

1301. *T. Marci nigra*, atra tota, antennis brevibus subulatis, alis margine exteriore nigris, tibiis anticis spina terminatis. T. 6.
p. 428.

T. Marci. L. S. N. p. 976.

1302. *T. Marci fulvipes*, nigra, antennis brevibus subulatis, femoribus rufis, alis albis, tibiis anticis spina terminatis. T. 6.
p. 429.

1303. *T. flavicaudis*, nigra, antennis brevibus subulatis; abdome foeminae flavo, alis obscuris, tibiis anticis spina terminatis. T. 6.
p. 429.

T. brevicornis. L. S. N. p. 976.

1304. *T. latrinarum*, nigra, antennis brevibus subulatis, abdome ovato, alis albis: costis duabus nigris, tibiis muticis. T. 6. p. 430. t. 28. f. 1 — 4.

1305. *T. erythrocephala*, nigra cinereo-albido-maculata, antennis brevibus subulatis, corpore brevi, capite magno rubro. T. 6. p. 431.
t. 28. f. 5. 6.

82. Coccoys.

1306. *C. ovatus Ulmi*, ovatus, albus fusco-transverse striatus, Ulmi. T. 6. p. 436. t. 28.
f. 7 — 12.

N 3

C. UL

C. Ulmi eampestris. L. S. N. p. 740.

1307. C. rotundus Salicis, subrotundus, fuscus, linea dorsali nigra, Salicis. T. 6. p. 440. t. 28.
f. 13 — 15.

C. Capreæ. L. S. N. p. 741.

1308. C. farinosus Alni, ovatus, tomentosus, pale
lido fuscus, albo-farinosus, Alni. T. 6. p.
442. t. 28. f. 16 — 22.

1309. C. Gatti, Caëti coccinelliferi. T. 6. p. 447.
t. 30. f. 12 — 18.

C. Caëti. L. S. N. p. 742.

1310. C. floccosus, testaceus, tomentosus, lamellis
candidis margine imbricatis. T. 7, p. 604.
t. 44. f. 26.

83. PvLEX.

1311. P. vulgaris, fusco-castaneus nitidus, probo-
scide corpore breviore. T. 7. p. 8. t. 1. f.
1 — 5.

P. irritans. L. S. N. p. 1021.

84. LZPISMA.

1312. L. semicylindrica, argentea, corpore semicy-
lindrico squamoso, abdomine apice setis
tribus. T. 7. p. 14.

L. saccharina. L. S. N. p. 1022.

85. Po-

85. PODVRA.

Fam. I.

1313. *P. arborea nigra*, oblonga, nigra, antennis quatuor-nodiis, pedibus furcaque pallide fuscis. T. 7. p. 18. t. 2. f. 1 — 7.

P. arborea. L. S. N. p. 1014.

1314. *P. arborea grisea*, oblonga, griseo-cinerea signaturis nigris, antennis longis quatuor-nodiis. T. 7. p. 21. t. 2. f. 8 — 10.

P. nivalis. L. S. N. p. 1013.

1315. *P. aquatica nigra*, aquatica, tota nigra, antennis quatuor-nodiis. T. 7. p. 23. t. 2. f. 11 — 17.

P. aquatica. L. S. N. p. 1014.

1316. *P. aquatica grisea*, aquatica, grisea, lineis dorsalibus nigris, antennis quatuor-nodiis. T. 7. p. 28. t. 2. f. 18 — 21.

1317. *P. plumbea*, corpore tereti nigro-cœruleo plumbeo nitido, antennis quatuor-nodiis, capite pedibusque griseis. T. 7. p. 31. t. 3. f. 1 — 4.

1318. *P. ambulatoria*, terrestris nivea, antennis quatuor-nodiis, cauda bifida brevi extensa. T. 7. p. 33. t. 3. f. 5. 6.

P. ambulatoria. L. S. N. p. 1041.

Fam. 2.

1319. *P. globosa fusca*, globofa, fusca, nitida, antennis longis fractis: articulis plurimis. T. 7. p. 35. t. 3. f. 7 — 14.

P. atra. L. S. N. p. 1013,

86. TERMES.

1320. *T. lignarium*, albidum, oculis maculisque abdominalibus rufis. T. 7. p. 41. t. 4. f. 1.

T. pulfatorium. L. S. N. p. 1015,

♂. T. 7. p. 43. t. 4. f. 2.

♀. T. 7. p. 44. t. 4. f. 3. 4.

Obs. Var. ♀. alarum rudimenta gerere videtur, forte diversa species. Hymenopteris propinquum genus.

1321. *T. capense*, lacteum, antennis filiformibus, dentibus porrectis nigris, interdum alatum: alis diaphanis fusco-marginatis. T. 7. p. 47. t. 38. f. 1 — 4.

Obs. Conf. *Perilam fuscam* et *nastram*, Generofissimique Auctoris de illis sententiam. T. 7. p. 50.

1322. *T. destructor*, albidum, capite luteo, antennis filiformibus, alternis maxillis longitudo antennarum. T. 7. p. 50. t. 37. f. 1 — 8.

T. fatale. L. S. N. p. 1015,

87. PEDIEVULVS.

3323. *P. humanus*, T. 7. p. 62. t. 1. f. 6 — 10.

a. capitidis, cinereus, thorace abdomineque fascia interrupta nigra marginatis. T. 7. p. 67. t. 1. f. 6.

b. corporis, albidus totus immaculatus. T. 7. p. 67. t. 1. f. 7.

P. humanus, L. S. N. p. 1061.

3324. *P. Bufali*, flavescentia, striis fuscis obscuris, abdomine tuberculis decein conicis marginalibus. T. 7. p. 68. t. 1. f. 11, 12.

88. RICINVS.

3325. *R. Fringillae*, pallide fuscus, corpore oblongo margine nigro, capite magno: corniculis duobus obtusis flexilibus. T. 7. p. 71. t. 4. f. 5 — 8.

3326. *R. Emberizae*, pallide fuscus, abdomine albescente: maculis lateralibus fuscis, capite magno triangulari. T. 7. p. 74. t. 4. f. 9. 10.

E. T. 7. p. 79. t. 4. f. 14.

3327. *R. Cornicis*, albidus, fasciis dorsalibus transversis fuscis, antennis brevissimis ad apicem capitis. T. 7. p. 76. t. 4. f. 11.

P. Corvi Cornicis. L. S. N. p. 1018.

3328. *R. Lari*, griseo-albidus, oculis maculisque capitatis nigris, pedibus crassioribus. T. 7. p. 77. t. 4. f. 12.

N. §

P. Ster-

P. Sternae Hirundinis. L. S. N. p. 1019.

- 1329. *R. Mergi ferrati*, albidus, capite flavescente, corpore elongato. T. 7. p. 78. t. 4. f. 13.
- 1330. *R. Gallinae*, albidus, abdōmine ovato, capite semiorbiculato: postice satis quatuor longioribus. T. 7. p. 79. t. 4. f. 15.
- 1331. *R. Canis*, capite angulato flavescente fusco-punctato, abdomen ovato albido marginibus ferrato; thorace brevissimo. T. 7. p. 81. t. 4. f. 16.

89. ACARVS.

Fam. 1.

- 1332. *A. domesticus*, albus, maculis binis fuscis, corpore ovato medio coarctato: pilis longissimis, pedibus aequalibus. T. 7. p. 89. t. 5. f. 1 — 11.

Obs. Hunc et binos sequentes sub *A. Sirone* comprehendit Ill. à Linné.

Fam. 2.

- 1333. *A. Scabiei*, subrotundus, albus, pedibus rufescientibus brevibus: posticis quatuor seta longissima, plantis quatuor anticis fistulatis capitulo terminatis. T. 7. p. 94. t. 5. f. 12 — 14.

A. exulcerans. L. S. N. p. 1024?

- 1334. *A. farinac*, oblongus, albus, capite rufescente, pedibus conicis crassioribus aequalibus. T. 7. p. 97. t. 5. f. 15.

1335.

1335. *A. ricinoides*, violaceo-niger, capite pedibusque fuscis, corpore globoso-ovato. T. 7. p. 98. t. 5. f. 16 — 19.

A. Ricinus. L. S. N. p. 1023.

1336. *A. Reduvius*; obovatus planus, corpore ante clypeo nigro rotundo, pedibus nigris. T. 7. p. 101. t. 6. f. 1 — 8.

A. Reduvius. L. S. N. p. 1022.

1337. *A. Nigua*, ovatus planus, ruber macula dorsali alba, geniculis pedum albidis. T. 7. p. 153. t. 37. f. 9 — 13.

A. Americanus. L. S. N. p. 1023.

1338. *A. Rhinocerotis*, subrotundus planus, fuscus maculis testaceis fusco-punctatis. T. 7. p. 160. t. 38. f. 5. 6.

1339. *A. sylvaticus*, ovatus, thorace flavò fascijs punctisque nigris, abdōmine rufo. T. 7. p. 162. t. 38. f. 7.

Fam. 3.

1340. *A. avicularum*, elongatus; albus, abdomine fetis quatuor longissimis, pedibus quatuor posticis renotis. T. 7. p. 107. t. 6. f. 9 — 11.

1341. *A. Passerinus*, pedibus tertii parisi magnis et crassissimis. T. 7. p. 109. t. 6. f. 12.

A. Passerinus. L. S. N. p. 1023.

1342. *A. Gallinae*, ovatus, laevis, griseus violaceo-mar-



marginatus, pedibus anticis longioribus,
T. 7. p. 111. t. 6. f. 13. 14.

Fam. 4.

1343. *A. Fucorum*, pallide fuscus flavescens, macula dorsali triangulari obscura, pedibus anticis longioribus. T. 7. p. 112. t. 6. f. 15. 16.

A. coleoptratorum. L. S. N. p. 1026.

1344. *A. Muscarum*, abdomine rufo, pedibus posticis longissimis filiformibus. T. 7. p. 114. t. 7. f. 1 — 3.

A. Muscarum. L. S. N. p. 1025.

1345. *A. squamosus*, rubicundus, corpore pedibusque, squamis albidis testis. T. 7. p. 116. t. 7. f. 4.

1346. *A. Phalangii*, ovatus ruber, rostro porrecto, pedibus longioribus. T. 7. p. 117. t. 7. f. 5. 6.

1347. *A. parasiticus*, oblongus ruber, rostro brevissimo sub capite pedibusque brevioribus. T. 7. p. 118. t. 7. f. 7. 8.

1348. *A. Libellulae*, globosus ruber, pedibus brevissimis; stigmate dorsali concavo. T. 7. p. 119. t. 7. f. 9 — 11.

A. gymnopteronorum. L. S. N. p. 1026.

1349. *A. Culicis*, globosus ruber, capite porrecto lateribus inflato, pedibus longioribus. T. 7. p. 120. t. 7. f. 12.

1350.

1350. *A. Aphidis*, ovatus ruber, oculis nigris, pedibus anticis extremo clavatis. T. 7. p. 122. t. 7. f. 13. 14.

1351. *A. vegetans*, crustaceus, rufus, abdomine ovato supra convexo, subtus plano. T. 7. p. 123. t. 7. f. 15 — 19.

A. vegetans. L. S. N. Tom. 3. p. 226.

Fam. 5.

1352. *A. telarius*, oblongus, albo-virescens seu flavescens, pedibus omnibus aequalibus. T. 7. p. 128. t. 7. f. 20 — 24.

A. telarius. L. S. N. p. 1023.

1353. *A. corticalis*, subrotundus, crustaceus, nitidus, pedibus pallide fuscis. T. 7. p. 131. t. 8. f. 1 — 4.

B. T. 7. p. 133. t. 8. f. 5.

1354. *A. marginatus*, ovatus, crustaceus, fusco-caftaneus nitidus, corporis lateribus margine plano-angulato. T. 7. p. 133. t. 8. f. 6.

A. coleoptratus. L. S. N. p. 1023.

Fam. 6.

1355. *A. Phalangoides*, ovatus, obscure ruber, macula dorsali oblonga flavo-aurantia, pedibus longissimis. T. 7. p. 134. t. 8. f. 7 — 11.

1356. *A. bolosericeus*, terrestris, ruber, ovatus depresso rugoso-tomentosus, pedibus posticis

sticis remotis. T. 7. p. 136. t. 8. f. 12
— 18.

A. holofericeus. L. S. N. p. 1025.

Fam. 7.

1357. *A. caudatus*, aquaticus, subrotundus; fuscus rufo-maculatus, abdomine caudato cylindrico. T. 7. p. 139. t. 9. f. 1. 2.

1358. *A. aquaticus ruber*, aquaticus, ruber, corpore subgloboso, tentaculis longis, pedibus approximatis. T. 7. p. 141. t. 9. f. 4 — 6.

B. T. 7. p. 144. t. 9. f. 7 — 10. an?

A. aquaticus. L. S. N. p. 1025.

1359. *A. aquaticus globosus*, aquaticus, rubro-fuscus, corpore globoso, tentaculis brevioribus, pedibus rubris, approximatis. T. 7. p. 146. t. 9. f. 11. 12.

1360. *A. aquaticus maculatus*, aquaticus, fuscus macula rubra, corpore globoſo, tentaculis brevioribus crassis, pedibus viridi-griseis approximatis. T. 7. p. 147. t. 9. f. 13. 14.

1361. *A. aquaticus holofericeus*, aquaticus, ruber, ovatus depresso rugosus, capite conico producto, pedibus posticis remotis. T. 7. p. 149. t. 9. f. 15 — 20.

1362. *A. aquaticus marginatus*, aquaticus, subrotundus crustaceus niger, pedibus rufis, corporis lateribus marginatis. T. 7. p. 152. t. 11. f. 1.

90. РИД-

90. PHALANGIVM.

1363. *Pb. parietinum*, corpore ovato, supra griseo-fusco, subtus albido, pedibus maculatis.
T. 7. p. 166. t. 10. f. 1 — 13.

Ph. Opilio. L. S. N. p. 1027.

1364. *Pb. cornutum*, corpore ovato, supra griseo-fusco fascia nigra, subtus albo, tentaculis longissimis, chelis cornutis. T. 7. p. 173.
t. 10. f. 12 — 15.

Ph. cornutum. L. S. N. p. 1028.

91. ARANEA.

Fam. I.

1365. *A. crucigera*, retiaria, abdōmine subgloboso fusco seu rufo: tuberculis duobus, cruce dorsali triplici albo-punctata. T. 7. p. 218.
t. 11. f. 3 — 8.

A. Diadema. L. S. N. p. 1030.

1366. *A. angulata*, retiaria, abdōmine ovato nigro:
supra tuberculis binis magnis conicis. T.
7. p. 221. t. 12. f. 1 — 15.

A. angulata. L. S. N. p. 1031.

1367. *A. aurantio-maculata*, retiaria, abdōmine globo-flavo: venis fuscis maculisque aurantiis magnis foliaceis repadnis. T. 7. p.
222. t. 12. f. 16. 17.

1368. *A. quadrimaculata*, retiaria, abdōmine globo-virescente s. rufo, dorso maculis quatuor



tuor magnis pluriinisque minoribus niveis.
T. 7. p. 223. t. 12. f. 18.

1369. *A. cicatricosa*, retiaria, abdomine globoſo nigro-fusco punctis griseis, dorſo maculatis excavatis griseis. T. 7. p. 226. t. 12. f. 19.

1370. *A. tuberculata*, retiaria, abdomine fusco: nigro-alboque variegato, tuberculis binis dorſalibus convexis. T. 7. p. 226. t. 13. f. 1 — 15.

1371. *A. conica*, retiaria, grisea, thorace nigro, abdomine postice conico: maculis binis laciatiſ fuscis. T. 7. p. 231. t. 13. f. 16 — 20.

1372. *A. viridis punctata*, retiaria, abdomine subgloboso viridi: punctis aliquot nigris, postice macula rufa. T. 7. p. 233. t. 14. f. 1 — 3.

A. cucurbitina. L. S. N. p. 1030.

1373. *A. fusca*, retiaria, fusca maculis nebulosofnigris, abdomine ovato, pedibus longitudinaliter maculatis. T. 7. p. 235. t. 11. f. 9 — 12.

1374. *A. extensa*, retiaria, abdomine elongato griseo-fusco, pedibus longitudinaliter extensis. T. 7. p. 236. t. 19. f. 1.

A. extensa. L. S. N. p. 1033.

1375. *A. fasciculata*, retiaria, abdomine oblongo antice gibbo, thoracis medio spinis duabus erectis

erectis nigris, tibiis extremitate villosa.
T. 7. p. 316. t. 39. f. 1 — 4.

A. clavipes. L. S. N. p. 1034.

1376. *A. maminata*, retiaria, rufo-fusca, abdōmine supra griseo: tuberculis lateralibus mollibus, subtus fusca: fascia transversa albida. T. 7. p. 318. t. 39. f. 5.

1377. *A. triangulari-spinosa*, retiaria, abdōmine triangulari: spinis octonis, binis anticis horizontalibus, posticis duabus magnis divergentibus. T. 7. p. 321. t. 39. f. 9. 10.

1378. *A. elongato-spinosa*, retiaria, abdōmine oblongo supra rugoso: spinis octonis magnis, anticis sex erectis, posticis binis patentibus divergentibus. T. 7. p. 323. t. 39. f. 11. 12.

Fam. 2.

1379. *A. coronata*, textoria, abdōmine oblongo-ovato albō: annulo dorsali rubro. T. 7. p. 242. t. 14. f. 4 — 12.

A. redimita. L. S. N. p. 1032.

1380. *A. resupina sylvestris*, textoria, abdōmine ovato: maculis fasciisque angulatis fuscis albisque, pedibus immaeulatis. T. 7. p. 245. t. 14. f. 13 — 22.

1381. *A. resupina domestica*, textoria, abdōmine ovato: maculis lateralibus flavo-albidis, pedibus nigro-maculatis. T. 7. p. 251.

A. montana. L. S. N. p. 1032.

- ◆◆◆◆◆
1382. *A. viridissima*, textoria, viridis; abdomine oblongo flavescente. T. 7. p. 252. t. 18. f. 6 — 16.
1383. *A. atrox*, textoria, abdomine ovato fusco: supra macula nigra oblonga flavedine cincta. T. 7. p. 253. t. 14. f. 24. 25.
1384. *A. punctata*, textoria, nigro-fusca nitida, abdomine globofo: punctis excavatis anterius fascia grisea. T. 7. p. 255. t. 15. f. 1.
A. bipunctata. L. S. N. p. 1031.
1385. *A. albo-maculata*, textoria, nigro-fusca, abdomine globofo: fascia angulata maculisque octo albis. T. 7. p. 257. t. 15. f. 2 — 4.
1386. *A. senoculata*, textoria, abdomine ovato-oblongo griseo; fascia longitudinali laciniosa fusca, thorace fusco. T. 7. p. 258. t. 15. f. 4 — 10.
A. senoculata. L. S. N. p. 1034.

Fam. 3.

1387. *A. domestica*, vestiaria, griseo-fusca, abdomine ovato tomentoso: maculis nigris marmorato. T. 7. p. 264 t. 15. f. 11. 12.
A. domestica. L. S. N. p. 1031.
1388. *A. holofericea*, vestiaria, griseo-murina, abdomine ovato-oblongo villoso: basi subtus maculis binis flavescentibus. T. 7. p. 266. t. 15. f. 13 — 16.
A. holofericea. L. S. N. p. 1034.

1389.

1389. *A. avicularia*, vestiaria, hirsutissima, nigro-fusca s. rufescens, plantis amplis tomentosis. T. 7. p. 313. t. 38. f. 8 — 10.

A. avicularia. L. S. N. p. 1034.

1390. *A. rufa*, vestiaria, ferruginea, abdomen ovato flavo-griseo: cinereo-nebuloso, pedibus maculatis. T. 7. p. 319. t. 39. f. 6. 7.

Fam. 4.

1391. *A. (lupus) rufo-fasciata*, abdomen elongato griseo-fusco: fascia longitudinali undata rufa, pedibus longissimis. T. 7. p. 269. t. 16. f. 1 — 8.

1392. *A. (lupus) littoralis*, abdomen ovato nigro pedibusque griseo-maculatis. T. 7. p. 274. t. 15. f. 17 — 24.

1393. *A. (lupus) paludosa*, corpore oblongo fusco, thorace abdomineque fascia utrinque laterali alba, pedibus fuscis. T. 7. p. 278. t. 16. f. 9 — 12.

A. fimbriata. L. S. N. p. 1033

1394. *A. (lupus) marginata*, corpore oblongo fusco, pedibus viridibus thorace abdomineque fascia utrinque laterali alba. T. 7. p. 281. t. 16. f. 13 — 15.

1395. *A. (lupus) ruricola*, corpore ovato griseo-fusco obscuro, thorace abdomineque antice fascia longitudinali rufescente. T. 7. p. 282. t. 17. f. 1. 2. t. 11. f. 13. 14.

Fam. 5.

3396. *A. (phalangium) Pini*, griseo-nigra, abdome punctis duobus albis, pedibus fuscis nigro-maculatis. T. 7. p. 285. t. 17. f. 9 — 7.

3397. *A. (phalangium) albo-fasciata*, nigra, abdome oblongo: fasciis tribus albis transversis semi-circularibus. T. 7. p. 287. t. 17. f. 8 — 10.

A. scenica. L. S. N. p. 1035.

3398. *A. (phalangium) grossipes*, nigra, capite antice lineis transversis albidi pilosis, pedibus anticis crassioribus. T. 7. p. 290. t. 17. f. 11 — 14.

3399. *A. (phalangium) formicaria*, rufa, capite magno nigro: abdome oblongo rufo: fasciis nigris maculisque binis albis. T. 7. p. 293. t. 18. f. 1 — 5.

3400. *A. (phalangium) undata*, nigro-fusca, thorace margine griseo, abdome oblongo: fascia lata longitudinali undata cinerea, pedibus anticis crassioribus. T. 7. p. 320. t. 39. f. 8.

Fam. 6.

3401. *A. (cancroides) citrea*, lutea, abdome subrotundo piano; fascia utrinque rubra, pedibus quatuor posticis brevissimis. T. 7. p. 298. t. 18. f. 17 — 22.

3402. *A. (cancroides) fusco-marginata*, grisea f. fusca, abdome ovato piano; fascia laterali nigro-

~~238~~
nigro-fusca lineaque albida. T. 7. p. 301.
t. 18. f. 23. 24.

A. viatica. L. S. N. p. 1036.

1403. A. (*cancroides*) *tigrina*, abdomine obtuso plano albido: maculis nigris, pedibus quatuor posticis brevioribus. T. 7. p. 302. t. 18. f. 25.

A. laevipes. L. S. N. p. 1037.

Fam. 7.

1404. A. *aquatica*, nigra s. nigro-fusca. T. 7. p. 303. t. 19. f. 5 — 13.

A. *aquatica*. L. S. N. p. 1036.

92. SCORPIO.

Fam. 1.

1405. S. *maurus*, senoculus, pectinibus octo-dentatis, manibus ovatis, cauda corpore breviore: aculeo simplici. T. 7. p. 337. t. 40. f. 1 — 8.

S. *maurus*. L. S. N. p. 1037.

1406. S. *flavicaudis*, senoculus, pectinibus novem-dentatis, manibus ovatis angulatis striato-punctatis, cauda longitudine corporis, aculeo simplici pedibusque flavis. T. 7. p. 339. t. 40. f. 11 — 13.

Fam. 2.

1407. S. *indus*, octonculus, pectinibus tredecim-dentatis, manibus ovatis sebris, cauda

O 3

cor-



corporis fere longitudine, aculeo simplici.
T. 7. p. 341.

S. afer. L. S. N. p. 1038.

1408. *S. punctatus*, octonoculus, pectinibus sedecim-dentatis, manibus elongatis: digitis filiformibus, cauda corporis longitudine: aculeo basi mucronato. T. 7. p. 343. t. 41. f. 1 — 4.

1409. *S. europaeus*, octonoculus, fuscus, pectinibus octodecim-dentatis, manibus elongatis: digitis filiformibus, cauda corpore longiore: aculeo basi mucronato. T. 7. p. 344. t. 41. f. 5 — 8.

S. europaeus. L. S. N. p. 1038.

1410. *S. maculatus*, octonoculus, fusco-maculatus, pectinibus octodecim-dentatis, brachiis manibusque longissimis subulatis: digitis filiformibus, cauda longissima: aculeo basi mucronato. T. 7. p. 346. t. 41. f. 9. 10.

S. americanus. L. S. N. p. 1038.

1411. *S. testaceus*, octonoculus, testaceo-flavus, pectinibus vigintiocto-dentatis, manibus oblongis: digitis filiformibus, cauda corpore longiore: aculeo simplici. T. 7. p. 347. t. 41. f. 11.

1412. *S. australis*, octonoculus, fuscus, pedibus rufis, pectinibus triginta-dentatis, manibus elongatis rufis: digitis filiformibus, cauda corpore longiore: aculeo basi mucronato. T. 7. p. 348. t. 41. f. 5.

S. australis. L. S. N. p. 1038.

93. Che-

93. CHELIFER.

1413. *Ch. americanus*, corpore cylindrico flavescente, thorace chelisque obovatis fusco-caeruleis. T. 7. p. 353. t. 42. f. 1 — 5.

Phalangium acaroides. L. S. N. p. 1028.

1414. *Ch. europeus*, obscure fuscus, corpore ovato depresso, chelis elongatis. T. 7. p. 355. t. 19. f. 14. 15.

Phalangium cancroides. L. S. N. p. 1028.

94. ASTACUS.

Fam. 1.

1415. *A. fluviatilis*, thorace laevi, rostro supra dentato: basi utrinque dente unico, chelis maximis papilloso-scabris. T. 7. p. 365. t. 21. 22.

Cancer Astacus. L. S. N. p. 1051.

Fam. 2.

1416. *A. strigosus*, thorace depresso rugoso laterali-ter aculeato, rostro acuto septemdentato, chelis spinosissimis, pedibus posticis filiformibus. T. 7. p. 393. t. 23. f. 1 — 4.

Cancer strigosus. L. S. N. p. 1052.

1417. *A. Norvegicus*, thorace convexo, capite aculeato, chelis prismaticis elongatis: seriebus quaternis spinosis. T. 7. p. 398. t. 24.

Cancer norvegicus. L. S. N. p. 1053.

Fam. 3.

1418. *A. Bernhardus*, cauda molli recurvata, thorace laevi, pedibus chelisque muricatis scabris: dextra majore. T. 7. p. 405. t. 23. f. 5 — 13.

Cancer Bernhardus. L. S. N. p. 1049.

95. CANCER.

Fam. 1.

1419. *C. ruricola*, thorace laevi antice bidentato, pedibus depresso: articulis tribus ultimis spinosis: setis nigris. T. 7. p. 417. t. 25. f. 1 — 11. t. 26. f. 1 — 3.

C. ruricola. L. S. N. p. 1040.

1420. *C. latipes*, thorace orbiculato antice dentato: lateribus utrinque unispinoso, manibus ovatis muricatis, pedibus dilatato-foliaceis. T. 7. p. 425. t. 26. f. 4 — 7.

1421. *C. vocans*, thorace late quadrato mutico laevi, chela altera corpore majore, altera minima. T. 7. p. 430. t. 26. f. 12.

C. vocans. L. S. N. p. 1041.

Fam. 2.

1422. *C. pelagicus*, thorace late utrinque unispinoso, lateribus utrinque ostodontatis, fronte dentata, manibus elongatis multangulis, pedibus

dibus posticis dilatato-foliaceis. T. 7. p.
427. t. 26. f. 8 — 11.

C. pelagicus. L. S. N. p. 1042.

96. MONOCVVLVS.

Fam. 1.

1423. *M. Pulex ramosus*, brachiis dichotomis, cauda appendiculata inflexa, testa postice unispinosa. T. 7. p. 442. t. 27. f. 1 — 8.

M. Pulex. L. S. N. p. 1058.

1424. *M. exspinofus*, brachiis dichotomis, cauda simplici inflexa, testa postice rotundata non spinosa. T. 7. p. 457. t. 27. f. 9 — 13. t. 28. f. 3 — 8.

1425. *M. bispinosus*, brachiis dichotomis, capite rostrato, cauda inflexa, testa postice bispinosa. T. 7. p. 463. t. 28. f. 3 — 8.

1426. *M. Pediculus ramosus*, brachiis dichotomis, cauda bifida rectiuscula exserta, pedibus nudis. T. 7. p. 467. t. 28. f. 9 — 13.

M. Pediculus. L. S. N. p. 1058.

1427. *M. elongatus*, corpore elongato, brachiis dichotomis; setis plurimis, cauda lateraliter exserta, T. 7. p. 470. t. 29. f. 1 — 4.

Fam. 2.

1428. *M. ovato-conchaceus*, testa ovata bivalvi, brachiis apice capillaceis multiplicibus intra testam. T. 7. p. 476. t. 29. f. 5 — 10.

M. conchaceus. L. S. N. p. 1059.

Fam.

O 3

Fam. 3.

1429. *M. quadricornis*, cornubus quafernisi mobili-
bus setaceis, corpore ovato, cauda longa
recta cylindrica bifida. T. 7. p. 483. t.
29. f. 11. 12. t. 30. f. 1 — 9. *Vorticella*
berberina p. 437.

M. quadricornis. L. S. N. p. 1058.

97. SQILLA.

1430. *S. Asellus*, aquatica, cauda rotundata: stylis
binis bifurcatis. T. 7. p. 496. t. 31. f. 1
— 20.

Oniseus aquaticus. L. S. N. p. 1061.

1431. *S. Entomon*, marina, cauda longa subulata
crustacea. T. 7. p. 514. t. 32. f. 1 — 10.

Oniscus Entomon. L. S. N. p. 1060.

1432. *S. marina*, corpore elongato semicylindrico,
cauda oblonga aequali: apice truncata. T.
7. p. 523. t. 32. f. 11 — 14.

Oniscus marinus. L. S. N. p. 1060.

1433. *S. Pulex*, aquatica, corpore compresso, pe-
dibus quatuor anticis chelatis, cauda setis
sex bifurcatis terminata. T. 7. p. 525. t. 33.
f. 1 — 10.

Cancer Pulex. L. S. N. p. 1055.

1434. *S. Mantis*, marina, corpore elongato, tho-
race angulato, cauda lata depressa spinosa,
pedibus anticis chelatis dentatis. T. 7. p.
533. t. 34. f. 1 — 10.

Can-

Cancer Mantis. L. S. N. p. 1054.

1435. *S. Balaenae*, corpore ovali depresso: segmentis distinctis, pedibus cheliferis: tertii quartique parisi linearibus muticis. T. 7. p. 541. t. 42. f. 6 — 10.

Oniscus Ceti. L. S. N. p. 1060.

98. ONISCVS.

1436. *O. Armadillo*. T. 7. p. 546. t. 35. f. 1. 2.
L. S. N. p. 1062.

1437. *O. Afellus*, ovalis subdepressus flavo-maculatus, cauda stylis duobus conicis articulatis. T. 7. p. 547. t. 35. f. 3 — 10.

O. Afellus. L. S. N. p. 1061.

1438. *O. convexus*, ovalis convexus immaculatus, cauda stylis duobus conicis articulatis. T. 7. p. 553. t. 35. f. 11.

An praecedentis varietas?

99. SCOLOPENDRA.

1439. *S. forcipata*, rufo-fusca, pedibus utrinque quindecim. T. 7. p. 557. t. 35. f. 12 — 16.

S. forcipata. L. S. N. p. 1062.

1440. *S. flava*, flava, capite pedibusque utrinque LIV. rufis. T. 7. p. 561. t. 35. f. 17 — 20.

S. electrica. L. S. N. p. 1063.

1441. *S. morfitans*, pedibus utrinque XXI. posterioribus spinosis. T. 7. p. 565. t. 43. f. 1 — 5.
S. mor-



S. morsitans. L. S. N. p. 1063.

1442. *S. ferruginea*, pedibus utrinque XXII, posterioribus longissimis bispinosis. T. 7. p. 568. t. 43. f. 6.

S. ferruginea. L. S. N. p. 1063.

100. IVLVS.

1443. *I. penicillatus*, corpore oblongo: fasciculis squamosis, cauda penicillo albo, pedibus utrinque XII. T. 7. p. 572. t. 36. f. 1 — 8.

Scolopendra lagura. L. S. N. p. 1062.

1444. *I. fasciatus*, nigro-fuscus, lineis binis longitudinalibus rufis, pedibus utrinque C. T. 7. p. 578. t. 36. f. 9 — 22.

I. terrestris. L. S. N. p. 1065.

1445. *I. complanatus*, fuscus, pedibus utrinque XXXI, segmentis corporis elypeolis planisculis marginatis. T. 7. p. 586. t. 36. f. 23 — 26.

I. complanatus. L. S. N. p. 1065.

1446. *I. indus*, cylindricus, fuscus, pedibus rufis utrinque CX. T. 7. p. 588. t. 43. f. 7 — 9.

I. indus. L. S. N. p. 1065.



