

Fam X=FORMICIDES, p. 584, ADD. 224.

Après le genre. *Tapinoma*, Latr. 237, ajoutez le suivant.

Gen. DOLICHDERE. *Dolichoderus*, Lund.

♀—Tête ovale. Epistome triangulaire, déprimé en avant, s'avancant légèrement entre les antennes. Arêtes frontale à peine distincte. Mandibules assez larges, dentées. Palpes maxillaires de 6 articles, les labiaux de 4. Antennes de 12 articles; le scape de longueur moyenne, funicule s'épaississant insensiblement vers l'extrémité. Point d'ocelles. Thorax avec un étranglement entre le mésonotum et le métanotum, celui-ci à face dorsale égale et à face postérieure concave, séparées l'une de l'autre par une arrête vive. Pétiole avec une écaille robuste, fortement inclinée en avant. Abdomen ne s'avancant pas sur l'écaille.

♀—Comme chez l'ouvrière, mais avec des ocelles. Ailes avec deux cellules cubitales. Taille plus grande que chez l'ouvrière.

♂—Comme chez l'ouvrière. Antennes de 13 articles. Pétiole épaissi, sans écaille. Valvules génitales externes arrondies.

Une seule espèce rencontrée.

**Dolichodère du nord.** *Dolichoderus borealis*, n. sp.

♀—Long. 15 pce. La tête, le pavillon des antennes avec l'extrémité de l'abdomen, noir, le reste d'un roussâtre sale. La tête et le corps finement ponctués, les mandibules et le scape des antennes avec les premiers articles du funicule, roussâtres. Pronotum séparé du mésonotum par un petit sillon, et celui-ci du métanotum par un étranglement bien prononcé. La face dorsale du métanotum plus fortement ponctuée que le reste, et la face postérieure excavée, concave. Pétiole avec une écaille épaisse et dirigée en avant, le reste de l'abdomen en ovale triangulaire, poli, brillant, roussâtre à la base et noir dans le reste, le noir de l'extrémité s'avance sur le milieu du dos jusqu'au premier segment, sans toutefois déterminer des taches distinctes sur les côtés comme dans le 4 *punctatus*, Lin.—CapRouge.

Capturé un seul spécimen ♀ sur le sol ou lac Sergent sans pouvoir rencontrer les autres sexes malgré de longues recherches.